

В.И.Арнольд
ЛЕКЦИИ ОБ УРАВНЕНИЯХ С ЧАСТНЫМИ ПРОИЗВОДНЫМИ

Оглавление

Предисловие ко второму изданию

1. Общая теория для одного уравнения первого порядка	1
2. Общая теория для одного уравнения первого порядка (продолжение)	13
3. Принцип Гюйгенса в теории распространения волн	25
4. Струна (метод Даламбера)	33
1. Общее решение	33
2. Краевые задачи и задача Коши	34
3. Задача Коши для неограниченной струны. Формула Даламбера	36
4. Полуограниченная струна	37
5. Ограниченнная струна (резонанс)	38
6. Метод Фурье	39
5. Метод Фурье (для струны)	43
1. Решение задачи в пространстве тригонометрических многочленов	43
2. Отступление	44
3. Формулы для решения задачи пункта 1	44
4. Общий случай	45
5. Ряды Фурье	45
6. Сходимость рядов Фурье	46
7. Явление Гиббса	47
6. Теория колебаний. Вариационный принцип	49
7. Теория колебаний. Вариационный принцип (продолжение)	61
8. Свойства гармонических функций	77
9. Фундаментальное решение оператора Лапласа. Потенциалы	89
10. Потенциал двойного слоя	107
11. Сферические функции. Теорема Максвелла. Теорема об устранимой особенности	119
12. Краевые задачи для уравнения Лапласа. Теория линейных уравнений и систем	135
Приложение 1. Топологическое содержание теоремы Максвелла о мультипольном представлении сферических функций	151
1. Основные пространства и группы	152
2. Некоторые теоремы вещественной алгебраической геометрии	154
3. От алгебраической геометрии к сферическим функциям	156
4. Явные формулы	158
5. Теорема Максвелла и $CP^2 / \text{conj} \approx S^4$	162
6. История теоремы Максвелла	164
Приложение 2. Задачи	167
1. Материалы семинаров	167
2. Задачи письменного экзамена	174

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Теория уравнений с частными производными считалась в середине этого века вершиной математики — как вследствие трудности и значения решаемых ею задач, так и потому, что она сформировалась позже большинства математических дисциплин.

Сегодня многие склонны пренебрежительно рассматривать эту замечательную область математики как старомодное искусство жонглирования неравенствами или как полигон для приложений функционального анализа. Соответствующий курс даже исключен из обязательной программы ряда университетов (например, в Париже). Более того, такие замечательные учебники, как классический трехтомник Гурса, были выкинуты библиотекой университета Париж-7 за ненадобностью (и только благодаря моему вмешательству удалось спасти их, наряду с курсами лекций Клейна, Пикара, Эрмита, Дарбу, Жордана, ...).

Причина вырождения важной общематематической теории в бесконечный поток работ «Об одном свойстве одного решения одной краевой задачи для одного уравнения» состоит, вероятно, в попытке создать единую всеобъемлющую сверхабстрактную «теорию всего».

Основным источником уравнений с частными производными являются модели сплошных сред математической и теоретической физики. Попытки распространить замечательные достижения математической физики на сходные с ее моделями лишь формально системы приводят к сложным и труднообозримым теориям, подобно тому, как попытки распространить геометрию поверхностей второго порядка и алгебру квадратичных форм на объекты более высоких степеней быстро заводят в дебри алгебраической геометрии с ее обескураживающей иерархией сложных вырождений и вычислимыми лишь принципиально ответами.

В теории уравнений с частными производными положение еще хуже: трудности коммутативной алгебраической геометрии соединяются

здесь с некоммутативной дифференциальной алгеброй совершенно неразделимым образом, и вдобавок возникающие вопросы топологии и анализа глубоко нетривиальны.

В то же время общефизические принципы и такие общие понятия, как энергия, вариационный принцип, принцип Гюйгенса, лагранжиан, преобразование Лежандра, гамильтониан, собственные числа и собственные функции, двойственность волна–частица, дисперсионные соотношения, фундаментальные решения, прекрасно работают в многочисленных важнейших задачах математической физики. Их исследование стимулировало развитие больших отделов математики, таких, как теория рядов и интегралов Фурье, функциональный анализ, алгебраическая геометрия, симплектическая и контактная топология, теория асимптотик интегралов, микролокальный анализ, теория индекса (псевдо)дифференциальных операторов и т. д.

Знакомство с этими фундаментальными математическими идеями является, на мой взгляд, абсолютно необходимым для каждого работающего математика. Их исключение из университетского преподавания математики, совершившееся или совершающееся во многих западных университетах под влиянием схоластов-аксиоматизаторов (не знакомых ни с какими приложениями и не желающих знать ничего, кроме «абстрактной чепухи» алгебраистов), представляется мне крайне опасным последствием бурбакизации математики, и ее преподавания. Стремление уничтожить ненужную схоластическую псевдонауку является естественной и законной реакцией общества (в том числе научного) на безответственную и самоубийственную агрессивность «сверхчестых» математиков, воспитанных в духе Харди и Бурбаки.

Автор этого очень короткого курса лекций старался познакомить с калейдоскопом фундаментальных идей математики и физики студентов-математиков с минимальными познаниями (линейная алгебра и основы анализа, включая обыкновенные дифференциальные уравнения). Вместо обычного в математических книгах принципа наибольшей общности автор старался придерживаться принципа минимальной общности, согласно которому каждая идея должна быть вначале ясно понята в простейшей ситуации, и только затем развитый метод может переноситься на более сложные случаи.

Хотя доказательство общего факта обычно бывает проще, чем доказательство его многочисленных частных случаев, содержание математической теории для обучающегося не больше, чем набор хорошо и

до конца понятых им примеров. Поэтому именно примеры и идеи, а не общие теоремы и аксиомы, составляют основу этой книги. Экзаменационные задачи в конце курса составляют существенную его часть.

Особое внимание было уделено взаимодействию предмета с другими областями математики: геометрией многообразий, симплектической и контактной геометрией, комплексным анализом, вариационным исчислением, топологией. Автор рассчитывал на любознательного студента, но надеется, что даже профессиональные математики других специальностей смогут познакомиться по этой книжке с основными и потому простыми идеями математической физики и теории уравнений с частными производными.

Настоящий курс был прочитан студентам третьего курса Математического Колледжа Независимого Московского Университета в осенном семестре 1994/1995 учебного года, причем лекции 4 и 5 были прочитаны Ю. С. Ильяшенко, лекция 8 — А. Г. Хованским. Все лекции были записаны В. М. Имайкиным (составленный им конспект был затем переработан автором). Автор выражает всем им глубокую благодарность.

Первое издание этого курса вышло в 1995 году в Издательстве Математического Колледжа Независимого Московского Университета. В настоящем издании сделан ряд добавлений и исправлений.

Лекция 1

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ДЛЯ ОДНОГО УРАВНЕНИЯ ПЕРВОГО ПОРЯДКА

В отличие от обыкновенных дифференциальных уравнений, нет единой теории уравнений с частными производными. Некоторые уравнения имеют свои теории, для других теории нет вообще. Это связано с более сложной геометрией. В случае обыкновенного уравнения на многообразии задано векторное поле, которое локально интегрируемо (имеет интегральные кривые). В случае уравнения с частными производными в каждой точке многообразия задано подпространство касательного пространства размерности больше 1. Как известно, уже поле двумерных плоскостей в трехмерном пространстве в общем случае не интегрируемо.

Пример. В пространстве с координатами x, y, z рассмотрим поле плоскостей, заданное уравнением $dz = y dx$ (в каждой точке это однолинейное уравнение на координаты касательного вектора, задающее плоскость).

Задача 1. Нарисуйте это поле плоскостей и докажите, что у него нет интегральной поверхности, т. е. такой поверхности, у которой в каждой точке касательная плоскость совпадает с плоскостью поля.

Таким образом, интегрируемые поля плоскостей — исключительное явление.

Интегральным подмногообразием поля касательных подпространств на многообразии называется подмногообразие, касательная плоскость которого в каждой точке принадлежит подпространству поля. Если удается провести интегральное подмногообразие, его размерность обычно не совпадает с размерностью плоскостей поля.

В этой лекции мы рассмотрим случай, в котором есть полная теория, а именно случай одного уравнения первого порядка. С физической точки зрения этот случай представляет собой двойственность описания явлений при помощи волн и при помощи частиц. Поле удовлетворяет некоторому уравнению в частных производных первого порядка, эволюция частиц описывается системой ОДУ, имеется прием сведения

УРЧП к системе ОДУ; тем самым можно свести изучение распространения волн к изучению эволюции частиц.

Запишем все в локальной системе координат: $x = (x_1, \dots, x_n)$ — координаты (независимые переменные), $y = u(x)$ — неизвестная функция координат, сама буква y обозначает координату на оси значений, частные производные обозначим p , $p_i = \frac{\partial u}{\partial x_i} = u_{x_i}$.

Общее уравнение с частными производными первого порядка имеет вид: $F(x_1, \dots, x_n, y, p_1, \dots, p_n) = 0$.

Примеры.

$$\frac{\partial u}{\partial x_1} = 0; \quad (1.1)$$

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x_1}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial x_2}\right)^2 = 1 \quad (1.2)$$

(уравнение эйконала в геометрической оптике);

$$u_t + uu_x = 0 \quad (1.3)$$

(уравнение Эйлера).

Рассмотрим выпуклую замкнутую кривую на плоскости с координатами x_1, x_2 . Вне области, ограниченной кривой, рассмотрим функцию u расстояния до этой кривой. Тогда u — гладкая функция.

Теорема 1. *Функция u удовлетворяет уравнению (1.2).*

Доказательство. В уравнении (1.2) написано, что квадрат градиента функции u равен 1. Напомним геометрический смысл градиента: это вектор, в направлении которого скорость изменения функции наибольшая, а его длина равна абсолютной величине этой скорости. Теперь утверждение теоремы очевидно.

Задача 2. а) Докажите, что любое решение уравнения (1.2) локально является суммой расстояния до некоторой кривой и постоянной.

б) Поймите, где тут двойственность описания при помощи волн и частиц (в случае затруднений ср. ниже с. 16, рис. 2.2).

Рассмотрим поле $u(t, x)$ скоростей свободно двигающихся по прямой частиц, рис. 1.1. Закон свободного движения частицы имеет вид $x = \varphi(t) = x_0 + vt$, где v — скорость частицы. Функция φ удовлетворяет уравнению Ньютона $\frac{d^2\varphi}{dt^2} = 0$. Дадим теперь описание движения




Рис. 1.1. Частица на прямой

через поле u и скоростей: по определению, $\frac{d\varphi}{dt} = u(t, \varphi(t))$. Дифференцируем по t и получаем уравнение Эйлера:

$$\frac{d^2\varphi}{dt^2} = u_t + u_x u = 0.$$

Обратно, из уравнения Эйлера можно вывести уравнение Ньютона, т. е. эти описания движения при помощи уравнения Эйлера для поля и при помощи уравнения Ньютона для частиц эквивалентны. Мы и в общем случае построим процедуру, позволяющую свести уравнения для волн к уравнениям эволюции частиц. Но сначала рассмотрим более простые примеры линейных уравнений.

1. Пусть $v = v(x)$ — векторное поле на многообразии или в области евклидова пространства. Рассмотрим уравнение $L_v(u) = 0$, где оператор L_v обозначает производную по направлению векторного поля (производную Ли).

В координатах это уравнение имеет вид $v_1 \frac{\partial u}{\partial x_1} + \dots + v_n \frac{\partial u}{\partial x_n} = 0$; оно называется *линейным однородным уравнением в частных производных первого порядка*.

Чтобы функция u была его решением, необходимо и достаточно, чтобы u была постоянна вдоль фазовых кривых поля v . Таким образом, *решения нашего уравнения — первые интегралы поля*.

Например, рассмотрим поле $v = \sum_{i=1}^n x_i \frac{\partial}{\partial x_i}$,

рис. 1.2. Решим уравнение $L_v(u) = 0$ для этого поля v . Фазовые кривые — лучи $x = e^t x_0$, выходящие из начала координат. Решение должно быть постоянно на каждом таком луче. Если наложить условие непрерывности в начале координат, то получим, что решения — константы и только они. Константы образуют одномерное линейное пространство (решения линейного уравнения должны образовывать линейное пространство).




Рис. 1.2. Эйлерово поле

В отличие от этого примера, в общем случае решения линейного УРЧП образуют бесконечномерное линейное пространство. Например,

для уравнения $\frac{\partial u}{\partial x_1} = 0$ пространство решений совпадает с пространством функций от $n - 1$ переменной:

$$u = \varphi(x_2, \dots, x_n).$$

Оказывается, то же самое верно для уравнения общего положения в окрестности регулярной точки.

Задача Коши. Рассмотрим гладкую гиперповерхность Γ^{n-1} в x -пространстве. Задачей Коши называется задача: найти решение уравнения $L_v(u) = 0$, совпадающее на гиперповерхности с заданной функцией, рис. 1.3.




Рис. 1.3. Задача Коши

Точка гиперповерхности называется *некарактеристической*, если поле v в ней трансверсально поверхности.

Теорема 2. Задача Коши однозначно разрешима в окрестности каждой некарактеристической точки.

Доказательство. При помощи гладкой замены переменных выпрямим векторное поле, а Γ превратим в гиперплоскость $x_1 = 0$. Тогда в малой окрестности некарактеристической точки получим задачу:

$$\frac{\partial u}{\partial x_1} = 0, \quad u|_{0, x_2, \dots, x_n} = u_0(x_2, \dots, x_n),$$

которая решается однозначно.

2. Рассмотрим задачу Коши для более общего — *линейного неоднородного уравнения*:

$$L_v(u) = f, \quad u|_{\Gamma^{n-1}} = u_0.$$

Решения такой задачи образуют *аффинное* пространство (общее решение неоднородного уравнения есть сумма общего решения однородного и частного решения неоднородного).

Гладкой заменой переменной задача приводится к виду:

$$\frac{\partial u}{\partial x_1} = f(x_1, x_2, \dots, x_n), \quad u|_{0,x_2,\dots,x_n} = u_0(x_2, \dots, x_n).$$

Эта задача решается однозначно:

$$u(x_1, \dots) = u_0(\dots) + \int_0^{x_1} f(\xi, \dots) d\xi.$$

3. *Квазилинейным* называется уравнение, линейное по производным. В координатах квазилинейное уравнение первого порядка имеет вид:

$$a_1(x, u) \frac{\partial u}{\partial x_1} + \dots + a_n(x, u) \frac{\partial u}{\partial x_n} = f(x, u). \quad (*)$$

Заметим, что в первых двух случаях поле v связано с дифференциальным оператором инвариантно (независимо от координат). Как инвариантно связать геометрический объект с квазилинейным уравнением?

Рассмотрим пространство с координатами (x_1, \dots, x_n, y) — пространство 0-струй функций от (x_1, \dots, x_n) , обозначаемое $J^0(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ или, короче, J^0 .

Напомню, что *пространством k -струй* функций от (x_1, \dots, x_n) называется пространство многочленов Тейлора степени k .

Заметим, что аргумент $(x_1, \dots, x_n, y, p_1, \dots, p_n)$ в уравнении 1-го порядка является 1-струей функции. Таким образом, уравнение 1-го порядка можно понимать как гиперповерхность в пространстве 1-струй функций $J^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$. Пространство 1-струй вещественнозначных функций от n переменных можно отождествить с $(2n+1)$ -мерным пространством: $J^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}) \approx \mathbb{R}^{2n+1}$. Например, для функций на плоскости получаем пятимерное пространство 1-струй.

Решение уравнения $(*)$ строится при помощи его характеристик (кривых специального вида в J^0). Слово «характеристический» в математике всегда означает «инвариантно связанный». Например, характеристический многочлен матрицы оператора инвариантно связан с оператором и не зависит от базиса, при помощи которого составлена матрица. Характеристические подгруппы группы — это подгруппы,




Рис. 1.4. Характеристики квазилинейного уравнения, проходящие через начальное многообразие $\hat{\Gamma}^{n-1}$

инвариантные относительно автоморфизмов группы. Характеристические классы в топологии инвариантны относительно соответствующих отображений.

Векторное поле v (в пространстве независимых переменных) называется *характеристическим полем* линейного уравнения $L_v(u) = f$.

Определение. *Характеристическим полем квазилинейного уравнения* (*) называется векторное поле A в J^0 с компонентами (a_1, \dots, a_n, f) .

Утверждение. *Направление этого поля является характеристическим.*

Действительно, пусть u — решение. График его — некоторая гиперповерхность в J^0 . Эта гиперповерхность касается поля A , что выражено в уравнении. Верно и обратное: если график функции всюду касается поля A , то она — решение.

Отсюда становится ясным способ решения квазилинейного уравнения. Проведем в J^0 фазовые кривые характеристического поля. Они называются *характеристиками*. Если характеристика имеет общую точку с графиком решения, то она вся лежит на нем. Так что график составлен из характеристик.

Задача Коши для квазилинейного уравнения ставится аналогично предыдущим случаям. А именно, пусть в x -пространстве задана гладкая гиперповерхность Γ^{n-1} , а на ней — начальная функция u_0 . График этой функции есть поверхность $\hat{\Gamma}$ в J^0 , которую мы рассматриваем в качестве начального подмногообразия, рис. 1.4.

Если характеристики не касаются начальной гиперповерхности $\hat{\Gamma}$, то локально из них составляется график решения.

Нехарактеристичность точки в данном случае складывается из двух условий: поле A не должно касаться $\hat{\Gamma}^{n-1}$ и, чтобы получился

действительно график, вектор поля должен быть не вертикален, т. е. компонента $a \neq 0$.

Точки, где $a = 0$, — особые; в них дифференциальное уравнение исчезает, превращаясь в алгебраическое.

Пример. Для уравнения Эйлера $u_t + uu_x = 0$ уравнение характеристик эквивалентно уравнению Ньютона: $t = 1$, $\dot{x} = u$, $\dot{u} = 0$.

Теперь перейдем к общему уравнению первого порядка.

Рассмотрим пространство 1-струй $J^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$, вместо \mathbb{R}^n можно рассмотреть n -мерное многообразие B^n , тогда получим пространство $J^1(B^n, \mathbb{R})$; пусть (x, y, p) — локальные координаты в нем.

Уравнением с частными производными первого порядка будем называть гладкую гиперповерхность в $J^1: \Gamma^{2n} \subset J^1$.

Например, при $n = 1$ получим неявное (неразрешенное относительно производной) ОДУ.

Оказывается, в нашем пространстве J^1 имеется замечательная геометрическая структура — инвариантно заданное распределение $2n$ -мерных гиперплоскостей. Например, при $n = 1$ получаем поле плоскостей в трехмерном пространстве. Структура появляется только в результате того, что пространство есть пространство 1-струй. Аналогичная структура возникает и в пространствах струй более высокого порядка, там она называется распределением Картана.

Каждая функция в пространстве k -струй имеет k -график. В случае 0-струй это обычный график — множество 0-струй функции: $\Gamma_u = \{j_x^0 u: x \in \mathbb{R}^n\} = \{(x, y): y = u(x)\}$. В случае 1-струй точка 1-графика состоит из аргумента, значения функции и значений частных производных первого порядка: $\{j_x^1 u: x \in \mathbb{R}^n\} = \{(x, y, p): y = u(x), p = \frac{\partial u}{\partial x}\}$, см. рис. 1.5 для $n = 1$. Заметим, что 1-график является сечением расслоения над областью определения.




Рис. 1.5. Точка пространства 1-струй

Замечание. Поверхность 1-графика диффеоморфна области определения функции, x — n -мерная координата на этой поверхности; гладкость поверхности меньше гладкости функции на 1, но в случае бесконечно гладкой или аналитической функции гладкость сохраняется.

Рассмотрим касательную плоскость к 1-графику. Это n -мерная плоскость в $(2n + 1)$ -мерном пространстве.

Теорема 3. Все касательные плоскости всех 1-графиков в данной точке лежат в одной и той же гиперплоскости.

Доказательство. Вдоль любой касательной плоскости имеем $dy = \sum \frac{\partial u}{\partial x_i} dx_i = \sum p_i dx_i$, или $dy = p dx$. Поскольку в данной точке пространства 1-струй p фиксировано, получаем уравнение на компоненты касательного вектора, задающее гиперплоскость. Поэтому касательная плоскость к любому 1-графику лежит в этой гиперплоскости.

Например, при $n = 1$ уравнение $dy = p dx$ задает вертикальную плоскость в пространстве с координатами x, y, p . Касательными к 1-графикам являются все прямые, кроме вертикальной, лежащие в этой плоскости, рис. 1.6.




Рис. 1.6. Контактная плоскость в пространстве 1-струй

В этом случае видно, что сама гиперплоскость есть замыкание объединения касательных ко всем 1-графикам, проходящим через данную точку.

Задача 3. Доказать, что это верно для любой размерности.

Следствие. Построенное поле гиперплоскостей $dy = p dx$ задано инвариантно, т. е. и в других координатах будет задано уравнением $d\tilde{y} = \tilde{p} d\tilde{x}$.

Определение. Указанное поле гиперплоскостей в J^1 называется *распределением Картина* или *стандартной контактной структурой*.

Задача 4. Какой размерности бывают интегральные многообразия у поля контактных плоскостей? (Многообразие называется интегральным, если в каждой точке его касательная плоскость есть подпространство контактной плоскости.)

1-график всегда является интегральным многообразием, т. е. n -мерное интегральное многообразие существует. А есть ли большей размерности?

Ответ. Интегральных подмногообразий, размерности которых больше половины размерности контактной плоскости, поле контактных плоскостей не имеет.

Определение. Интегральное подмногообразие поля контактных плоскостей, размерность которого максимальна (т. е. равна половине размерности контактной плоскости), называется *лежандровым*.

Например, 1-графики лежандровы.

Теперь вернемся к дифференциальному уравнению.

Уравнение — это $2n$ -мерное подмногообразие Γ^{2n} в J^1 .

В каждой регулярной точке этой поверхности удается выделить характеристическое направление, определяемое поверхностью и контактной структурой. Мы построим характеристики (интегральные кривые этого поля направлений), а затем из них составим интегральные многообразия.

Рассмотрим в точке поверхности Γ^{2n} пересечение касательной и контактной плоскостей. Эти плоскости либо совпадают, либо имеют $(2n - 1)$ -мерное пересечение. В первом случае точка *особая*, во втором — *регулярная*.

Заметим, что для поверхности Γ общего положения особые точки изолированы. Действительно, на Γ имеется $2n$ координат. Рассмотрим нормаль к касательной и нормаль к контактной плоскости. Точка особая, если эти нормали имеют одинаковое направление. Это значит, что $2n$ функций от $2n$ переменных одновременно обращаются в 0. В общем положении это случается лишь в изолированных точках.

Итак, в регулярных точках имеются $(2n - 1)$ -мерные пересечения касательной и контактной плоскостей. При $n = 1$ это прямые. При $n > 1$ — нет. Как выделить одномерное направление?

В локальных координатах контактное поле задается нулями 1-формы $\alpha = dy - p dx$, причем эту форму можно умножать на функцию, не обращающуюся в 0, — поле (контактная структура) при этом не меняется.

2-форма $\omega^2 = d\alpha$ — внешний дифференциал формы α — уже не определяется инвариантно контактной структурой, однако, верно следующее

Предложение 1. Форма $\omega|_{\alpha=0}$ определена инвариантно с точностью до умножения на ненулевое число в каждой точке.

Доказательство. Пусть $\tilde{\alpha} = f\alpha$. Тогда $d\tilde{\alpha} = df \wedge \alpha + f d\alpha$.

$$d\tilde{\alpha}|_{\alpha=0} = fd\alpha|_{\alpha=0},$$

т. е. $\tilde{\omega}^2$ отличается от ω^2 умножением на число в каждой точке (говорят, что *конформный тип* формы ω^2 определен инвариантно). Заметим, что, где $\alpha = 0$, там и $\tilde{\alpha} = 0$.

Предложение 2. $\omega|_{\alpha=0}$ является симплектической структурой.

Напомню, что *симплектической структурой* называется невырожденная кососимметрическая билинейная форма в четномерном пространстве.

Невырожденность формы ω означает, что $\forall \xi \neq 0 \exists \eta \omega(\xi, \eta) \neq 0$.

Доказательство предложения 2. В локальных координатах наша форма имеет вид: $d\alpha = -\sum dp_i \wedge dx_i$, где p_i, x_i — координаты в плоскости $\alpha = 0$.

Упражнение. Выпишите матрицу формы $\sum dp_i \wedge dx_i$ и убедитесь, что форма невырождена.

Эта форма называется *кососкалярным произведением*. Выясним его геометрический смысл.

Пусть $n = 1$. Тогда $\omega = dx \wedge dp$. Значение этой формы на паре векторов есть ориентированная площадь параллелограмма, натянутого на эти векторы, рис. 1.7. В случае большей размерности $\omega(\xi, \eta)$ есть сумма ориентированных площадей проекций параллелограмма со сторонами ξ, η на плоскости с координатами (x_i, p_i) .




Рис. 1.7. Симплектическая структура

Вспомним, что в евклидовом пространстве имеется понятие ортогонального дополнения. В n -мерном пространстве ортогональное дополнение к k -мерному подпространству является $(n - k)$ -мерным подпространством. Для доказательства этого факта нужна только били-



Рис. 1.8. Характеристическое направление
для общего уравнения первого порядка

нейность и невырожденность скалярного произведения, а симметричность не нужна, значит, то же самое верно и в случае кососкалярного произведения.

Итак, косоортогональным дополнением к $(2n - 1)$ -мерной плоскости в $2n$ -мерном симплектическом пространстве является прямая. Но в отличие от евклидова случая она лежит в этой плоскости!

Лемма. *Косоортогональное дополнение к гиперплоскости в симплектическом пространстве есть прямая, лежащая в этой гиперплоскости.*

Доказательство. Пусть прямая натянута на вектор ξ . Косоортогональное дополнение к ней есть гиперплоскость $\{\eta: \omega(\xi, \eta) = 0\}$. Вектор ξ лежит в этой гиперплоскости, так как $\omega(\xi, \xi) = -\omega(\xi, \xi) = 0$.

Определение. *Характеристическим направлением* в контактной плоскости называется косоортогональное дополнение к пересечению контактной и касательной к Γ плоскостей в регулярной точке.

Это косоортогональное дополнение — прямая. Итак, имеется инвариантная контактная структура и инвариантное отношение косоортогональности в каждой контактной плоскости. Тем самым в каждой регулярной точке инвариантно выделяется характеристическое направление, рис. 1.8.

Характеристиками называются интегральные кривые этого поля направлений.

Задача 5. Вычислите характеристическое поле направлений в координатах x, y, p , т. е. задайте его системой дифференциальных уравнений $\dot{x} = ?, \dot{y} = ?, \dot{p} = ?$

ЛИТЕРАТУРА

1. Арнольд В. И. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 3-е изд.— М.: Наука, 1984. С. 105–112.
2. Арнольд В. И. Дополнительные главы теории обыкновенных дифференциальных уравнений.— М.: Наука, 1978. Гл. 2.

Лекция 2

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ДЛЯ ОДНОГО УРАВНЕНИЯ ПЕРВОГО ПОРЯДКА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Мы рассматриваем общее дифференциальное уравнение в частных производных первого порядка $F(x, y, p) = 0$, где $x = (x_1, \dots, x_n)$, $p = (p_1, \dots, p_n)$, $p_i = \frac{\partial u}{\partial x_i}$, $y = u(x)$ — неизвестная функция. Уравнение задает $2n$ -мерную гиперповерхность V^{2n} в пространстве J^1 1-струй функций от (x_1, \dots, x_n) . Каждая функция имеет 1-график в J^1 ; она является решением уравнения, если ее 1-график Γ^n есть подмногообразие в V^{2n} .

В каждой точке из J^1 имеется контактная плоскость K^{2n} , заданная в локальных координатах уравнением $dy = p dx$; геометрически она представляет собой замыкание объединения касательных плоскостей ко всем 1-графикам, проходящим через данную точку.

В точках поверхности V^{2n} касательная плоскость к V^{2n} пересекается с контактной плоскостью. Если пересечение $(2n - 1)$ -мерно, то точка регулярная, иначе — особая. В общем положении особые точки изолированы. В регулярных точках z получаем распределение $(2n - 1)$ -мерных плоскостей $(T_z V^{2n}) \cap K_z^{2n}$, которые являются подпространствами контактных плоскостей K_z^{2n} .

Каждая контактная плоскость является симплектическим пространством, симплектическая структура задается дифференциальной 2-формой $\omega^2 = d\alpha|_{K^{2n}}$, где $\alpha = dy - p dx$.

В координатах имеем $\omega^2 = dx \wedge dp := \sum_{i=1}^n dx_i \wedge dp_i$; (x, p) служат координатами в контактной плоскости.

Лемма. *Форма ω^2 невырождена.*

Доказательство. Ее матрица в координатах $x_1, p_1, x_2, p_2, \dots$ имеет вид —

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & & 0 \\ -1 & 0 & & \\ & & 0 & 1 \\ & & -1 & 0 \\ 0 & & & \ddots \end{pmatrix}$$

Итак, форма ω^2 задает в K^{2n} кососкалярное произведение, к каждому подпространству в K^{2n} определено косоортогональное дополнение, которое имеет дополнительную размерность. В частности, косоортогональное дополнение к $(2n - 1)$ -мерному пересечению $(T_z V^{2n}) \cap K_z^{2n}$ одномерно. Это направление называется *характеристическим для уравнения*.

Задача 1. Докажите, что характеристическая прямая лежит в $(T_z V^{2n}) \cap K_z^{2n}$.

Вычислим явно в терминах уравнения компоненты характеристического вектора. Пусть (x, y, p) — координаты в $T_z J^1$. Характеристический вектор должен быть касательным к V^{2n} : дифференцируя уравнение, получаем первое условие

$$F_x \dot{x} + F_y \dot{y} + F_p \dot{p} = 0. \quad (2.1)$$

Далее, вектор должен лежать в контактной плоскости, отсюда второе условие

$$\dot{y} = p \dot{x}. \quad (2.2)$$

Исключив \dot{y} из этих двух уравнений, получим уравнение $(2n - 1)$ -мерного пересечения K^{2n-1} касательной и контактной плоскостей:

$$(F_x + F_y p) \dot{x} + F_p \dot{p} = 0. \quad (2.3)$$


Это уравнение записано в координатах (x, p) , которые мы можем считать координатами в контактной плоскости, поскольку она взимно однозначно проектируется на гиперплоскость (x, p) в J^1 , рис. 2.1.

Нам осталось найти косоортогональное дополнение к K^{2n-1} . Задачу в принципе можно решить алгоритмически, записав соответствующую систему линейных уравнений, но мы воспользуемся одним полезным наблюдением.

Для примера рассмотрим случай $n = 1$, тогда значение кососкалярного произведения $dx \wedge dp$ на паре касательных векторов $(\dot{x}, \dot{p}), (x', p')$ есть просто определитель из их координат:

$$dx \wedge dp ((\dot{x}, \dot{p}), (x', p')) = \begin{vmatrix} \dot{x} & \dot{p} \\ x' & p' \end{vmatrix} = \dot{x}p' - x'\dot{p}.$$

Оказывается, то же самое верно в общем случае, если под x, p понимать векторы, а произведение рассматривать как скалярное.

Рис. 2.1. x, p служат координатами в контактной плоскости

Задача 2. Докажите, что

$$\omega^2((\dot{x}, \dot{p}), (x', p')) = \dot{x}p' - x'\dot{p}. \quad (2.4)$$

Но посмотрим внимательно на уравнение (2.3). Оно само имеет вид (2.4), т. е. выражает факт, что кососкалярное произведение равно 0. Так что прямо из него мы выпишем вектор косоортогонального дополнения к K^{2n-1} : $p' = F_x + pF_y$, $x' = -F_p$. Правда, по традиции характеристическим называют противоположно направленный вектор. В итоге мы доказали следующую теорему.

Теорема 1. Характеристическим является поле направлений следующего векторного поля: $x' = F_p$, $p' = -(F_x + pF_y)$, $y' = pF_p$ (последняя компонента находится из (2.2)).

Заметим, что поле определяется самой функцией F , а не только ее нулевой поверхностью уровня, а значит, задано во всем пространстве J^1 .

Пример 1. Пусть F не зависит от y . Соответствующее уравнение называется *уравнением Гамильтона - Якоби*. Традиционное обозначение $F = H(x, p)$. Уравнение Гамильтона - Якоби — это уравнение вида $H(x, \partial u/\partial x) = 0$. Уравнения характеристик имеют вид

$$x' = \frac{\partial H}{\partial p}, \quad p' = -\frac{\partial H}{\partial x}, \quad y' = p \frac{\partial H}{\partial p}. \quad (2.5)$$

Первые два уравнения — это обычные канонические уравнения Гамильтона (этим и диктуется выбор знака характеристического поля, указанный выше: для гамильтониана свободной частицы массы 1

$H = p^2/2$; при выбранном знаке получаем $x' = p$, т. е. импульс равен скорости).

Спроектировав систему (2.5) на подпространство с координатами (x, p) , получим отдельную систему уравнений в этом пространстве. Тем самым мы осуществили факторизацию или расщепление исходного уравнения (2.5). Это векторное поле в пространстве (x, p) можно задать и инвариантно, не прибегая к координатам. Поверхность исходного уравнения в J^1 была цилиндрической, не менялась в зависимости от y , такая поверхность хорошо проектируется в пространство (x, p) . Гамильтоново поле задано не только на нулевой поверхности уровня H , а всюду. Функция H обычно имеет физический смысл энергии.




Рис. 2.2. Характеристики уравнения эйконала

Пусть, например, $H = (p^2 - 1)/2$, тогда уравнение имеет вид $p^2 = 1$ или $\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 = 1$, т. е. это уравнение эйконала геометрической оптики.

Система уравнений характеристик $x' = p$, $p' = 0$ описывает движение частиц по прямолинейным лучам с постоянной скоростью, рис. 2.2.

Если на многообразии задана риманова метрика, то характеристики уравнения эйконала оказываются геодезическими этой метрики.

Пример 2. Рассмотрим уравнение Эйлера $u_t + uu_x = 0$. При $n = 2$ пространство 1-струй J^1 пятимерно, $F(t, x, y, p_t, p_x) = p_t + yp_x$. Запишем систему уравнений характеристик:

$$\begin{aligned} p'_t &= -p_x p_t, & t' &= 1, & y' &= p_t + p_x y = 0. \\ p'_x &= -p_x^2, & x' &= y, \end{aligned}$$

Первые два уравнения есть так называемые сопряженные уравнения эволюции производных, пока мы ими заниматься не будем. Займемся оставшимися. Переменная t имеет смысл времени, остальные уравнения перепишем в виде $dx/dt = y$, $dy/dt = 0$, откуда $d^2x/dt^2 = 0$, т. е. уравнение характеристик оказалось уравнением Ньютона, см. предыдущую лекцию.

Теперь применим характеристики к решению уравнения в общем случае.

Теорема 2. Пусть Γ^n — 1-график решения, пусть характеристика проходит через точку графика. Тогда она вся лежит на Γ^n , т. е. график решения можно расслоить на характеристики.

Доказательство. Рассмотрим регулярную точку z , пусть ξ — вектор характеристического направления в точке z . Очевидно следующее:

1. $T_z\Gamma^n \subset T_zV^{2n}$, поскольку Γ — подмногообразие в V^{2n} .
2. $T_z\Gamma^n \subset K_z^{2n}$ по определению K_z^{2n} , поэтому $T_z\Gamma^n \subset (T_zV^{2n}) \cap \cap (K_z^{2n})$. Заметим, что само пространство $T_z\Gamma^n$ n -мерно.
3. Все векторы из $T_z\Gamma^n$ попарно косоортогональны. Действительно, $\alpha|_{\Gamma^n} = 0$, так как Γ^n — 1-график, поэтому $d\alpha|_{\Gamma^n} = 0$, т. е. $\omega^2|_{\Gamma^n} = 0$.

Упражнение. Убедитесь, что в координатной записи равенство формы $\omega^2|_{\Gamma^n}$ нулю вытекает из симметричности смешанных частных производных.

Определение. Подпространство симплектического пространства, все векторы которого попарно косоортогональны, называется *изотропным* (по Ли — «сумасшедшем»).

Например, на симплектической плоскости всякая прямая изотропна.

Лемма. В $2n$ -мерном симплектическом пространстве размерность изотропного подпространства не превосходит n .

(Изотропные подпространства максимальной размерности существуют и называются *лагранжевыми* подпространствами. Пример лагранжева подпространства — прямая на симплектической плоскости.)

Доказательство леммы. Пусть изотропное подпространство m -мерно. Как изотропное, оно содержится в своем косоортогональном дополнении, значит, размерность косоортогонального дополнения не меньше m . Имеем: $2n - m \geq m$, $m \leq n$. Лемма доказана.

Теперь вернемся к характеристическому вектору ξ в точке z .

Утверждение. Вектор ξ лежит в $T_z\Gamma^n$.

Допустим противное. Тогда, будучи характеристическим, ξ косоортогонален $T_zV^{2n} \cap K_z^{2n}$. В силу 2, ξ косоортогонален $T_z\Gamma^n$. Но тогда линейная оболочка ξ и $T_z\Gamma^n$ $(n+1)$ -мерна и изотропна ввиду 3, все это противоречит лемме.

Итак, характеристическое направление в каждой точке касается 1-графика решения, а значит вся характеристика лежит на графике. Теорема доказана.

Отсюда вытекает рецепт построения 1-графиков решений (заметим, что существование хотя бы одного решения пока не доказано). Надо взять $(n - 1)$ -мерное изотропное подмногообразие поверхности V^{2n} , не касательное к характеристике, и провести через его точки характеристики, получив локально 1-график решения. Чтобы получился действительно график, нужно, чтобы плоскость, натянутая на касательную плоскость к изотропному подмногообразию и характеристическое направление, взаимно однозначно проектировалась на x -пространство.

Имеется стандартный способ построения начальных изотропных многообразий. Рассмотрим в x -пространстве $(n - 1)$ -поверхность γ^{n-1} . Пусть на ней задана начальная функция u_0 . Подставим эти данные в уравнение и рассмотрим его как уравнение относительно p . Производные по касательным к γ^{n-1} направлениям нам уже заданы. Производную по трансверсальному направлению можно найти из уравнения по теореме о неявной функции, если F'_p в рассматриваемой точке не касается начальной гиперповерхности γ^{n-1} . Таким образом получим $(n - 1)$ -мерное изотропное начальное подмногообразие; данные такого типа называются данными Коши, подробности см. в [1, § 8, пп. К, М].

Теорема 3. *Рассмотрим начальное $(n - 1)$ -мерное подмногообразие $V^{n-1} \subset V^{2n}$, не касательное к характеристике; пусть n -мерная плоскость, натянутая на его касательную плоскость и характеристическое направление, изоморфно проектируется на x -пространство. Проведем через его точки характеристики. Тогда локально получим 1-график решения (см. рис. 2.3).*




Рис. 2.3. Построение 1-графика решения

Доказательство. Подмногообразие V^{n-1} изотропно: $d\alpha|_{T_z V^{n-1}} = 0$. Проведя через все его точки в окрестности регулярной точки z характеристики, получим n -мерное подмногообразие Γ^n в V^{2n} . Докажем, что $d\alpha|_{\Gamma^n} = 0$. Пусть v — векторное поле характеристических направлений. По формуле гомотопий




Рис. 2.4. Интегральная поверхность как 1-график

$L_v \alpha = i_v d\alpha + d(i_v \alpha)$, где $i_v d\alpha(\xi) := d\alpha(v, \xi)$, а $i_v \alpha = \alpha(v)$. Очевидно, $i_v \alpha = 0$, а $i_v d\alpha(\xi) = d\alpha(v, \xi) = 0$ для всякого вектора ξ , касательного к V^{2n} , по определению характеристического направления. Итак, производная формы по направлению поля v на V^{2n} равна 0, поэтому фазовый поток характеристического поля переводит форму в себя. Это значит, что значение формы на любом векторе равно значению этой же формы на векторе, перенесенном назад на начальное многообразие.

Отсюда следует, что $d\alpha$ тоже переводится полем v в себя. В начальной точке пространство $T_z \Gamma^n$ изотропно (V^{n-1} изотропно, а v — характеристический). Фазовым потоком поля v это свойство переносится в любую точку z' многообразия Γ^n : пространство $T_{z'} \Gamma^n$ изотропно. Итак, $\alpha|_{\Gamma^n} = 0$. Значит, Γ^n — интегральное подмногообразие контактной структуры. Таким образом, Γ^n — лежандрово подмногообразие. И по построению Γ^n — подмногообразие уравнения. Остается доказать, что локально это 1-график. Это вытекает из следующей общей теоремы.

Теорема 4. Пусть n -мерная поверхность Γ^n в пространстве 1-струй является лежандровой (интегральной для контактной структуры) и локально взаимно однозначно проектируется на x -пространство. Тогда локально это 1-график. (См. рис. 2.4.)

Доказательство. Запишем условие лежандровости $\alpha|_{\Gamma^n} = 0$ (поверхность — интегральная для контактной структуры):

$$\left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i - \sum_{i=1}^n g_i dx_i = 0 \right) \Rightarrow \left(g_i = \frac{\partial f}{\partial x_i} \right),$$

поскольку x_i — локальные координаты на Γ^n . Но это и означает, что Γ^n — 1-график.




Рис. 2.5. Начальное условие для уравнения Эйлера




Рис. 2.6. Характеристики квазилинейного уравнения в J^0 суть проекции характеристик из J^1




Рис. 2.7. Графики решения уравнения Эйлера в последовательные моменты времени

Пример. Решим задачу Коши для уравнения Эйлера $u_t + uu_x = 0$. Обычно в качестве начальной кривой на плоскости (x, t) выбирают прямую $t = 0$. Зададим начальную функцию $y = u_0(x)$, рис. 2.5.

Уравнения характеристик: $t' = 1, y' = 0, x' = y$; условия трансверсальности выполнены. Заметим, что для квазилинейного уравнения все можно рассматривать в пространстве J^0 , поскольку характеристики квазилинейного уравнения в J^0 являются проекциями «настоящих» характеристик из J^1 , рис. 2.6.

Итак, будем рассматривать 0-график в J^0 . Нарисуем на плоскости (x, y) серию сечений графиков при $t = \text{const}$, рис. 2.7. Значения решения в последующие моменты получаются переносом начальных значений вдоль характеристик.

Мы видим, что начиная с некоторого момента кривая перестает быть графиком. Интегральная поверхность уравнения перестает взаимно однозначно проектироваться на плоскость (x, t) . Кривая критических значений проектирования имеет точку возврата, рис. 2.8.

Физически уравнение Эйлера описывает эволюцию поля скоростей невзаимодействующих частиц. Эта модель хороша, например, для описания звездных потоков, нарушение единственности решения можно трактовать как свободное прохождение разных потоков друг сквозь друга.




Рис. 2.8. а) Интегральная поверхность перестает быть графиком.
б) Кривая критических значений проектирования

С другой стороны, при больших плотностях частицы начинают сталкиваться, и после некоторого времени уравнение Эйлера перестает выполняться. Его заменяют на другое уравнение, учитывающее взаимодействие, например, на уравнение Бюргерса $u_t + uu_x = \varepsilon u_{xx}$. При малых ε его решения приближают решения уравнения Эйлера до критического времени, а при больших значениях времени имеют тип ударных волн: график u почти вертикален в малой (порядка ε) окрестности движущейся точки, рис. 2.9.




Рис. 2.9. Решения типа ударной волны

Справа и слева от этой точки решения также близки к решениям уравнения Эйлера. Замечательно, что уравнение Бюргерса явно решается — оно сводится к уравнению теплопроводности, которое мы рассмотрим позже.

Замечание. 1-график решения уравнения первого порядка состоит из характеристик гиперповерхности, задающей уравнение в пространстве 1-струй, рис. 2.10.




Рис. 2.10. 1-график решения в пространстве 1-струй

Таким образом, мы свели уравнение поля к уравнениям движения частиц. Но, как заметил Якоби, можно применить теорему в обратном направлении: свести уравнения движения частиц к уравнению поля. Это бывает полезно, поскольку системы уравнений движения частиц, как правило, явно не решаются.

Если мы найдем хотя бы одно решение уравнения поля (УРЧП), мы будем знать лежандрово подмногообразие, составленное из характеристик. Если найдем еще решение уравнения поля, то наложим еще условие на характеристики, размерность интегрального многообразия — пересечения понизится на 1. Если удастся найти достаточно много решений, будем понижать размерность интегрального многообразия. Если известно достаточно большое (но конечнопараметрическое) семейство решений УРЧП, то все характеристики можно получить, пересекая соответствующие лежандровы многообразия до тех пор, пока не выделим саму (одномерную) характеристику.

Это метод Якоби интегрирования обыкновенных уравнений путем их представления как уравнений характеристик некоторого УРЧП.

Якоби применил его к решению гамильтоновых систем — систем уравнений характеристик для уравнения Гамильтона — Якоби (F не зависит явно от y). Результатом явилась, например, знаменитая теорема Лиувилля об интегрировании гамильтоновых систем, для которых известна полная система интегралов в инволюции.

Замечательно, что этот метод удалось «поднять» для интегрирования уже уравнений с частными производными! Для этого их надо рассматривать как бесконечномерные гамильтоновы системы. Таким образом удалось проинтегрировать известные уравнения Sine Gordon, Кортевега — де Фриза и др., см. [2, Добавление 16].

Но из нашего замечания следует, что метод Якоби можно применять к более широкому классу систем, чем гамильтоновы, а именно к тем, которые суть уравнения характеристик некоторого УРЧП. Правда, про конкретное векторное поле трудно бывает узнать, является ли оно характеристическим для какого-либо уравнения. Соответствующая теория, по-видимому, до сих пор не развита, во всяком случае я не знаю ее приложений к физически интересным задачам.

ЛИТЕРАТУРА

1. Арнольд В. И. Дополнительные главы теории обыкновенных дифференциальных уравнений.— М.: Наука, 1978.
2. Арнольд В. И. Математические методы классической механики.— М.: Наука, 1989.

Лекция 3

ПРИНЦИП ГЮЙГЕНСА В ТЕОРИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЛН

Рассмотрим пространство-время $M^{n+1} = B^n \times \mathbb{R}$, где B^n — «физическое пространство», а \mathbb{R} — «ось времени». [Большая часть дальнейшего буквально переносится на случай расслоения $M^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}$ над осью времени, а многое — также на случай, когда роль времени играет слоение на «изохроны» или даже нули незамкнутой дифференциальной формы $\langle dt \rangle$ на M].

В геометрической оптике (а также в вариационном исчислении и в теории оптимального управления) в каждой точке многообразия M задан *конус возможных скоростей движения*.

Пример. Пусть B — риманово многообразие. Графики всевозможных «движений» $q: \mathbb{R} \rightarrow B$ со скоростью единица в каждой точке касаются квадратичного конуса (который и задает риманову метрику) $\|dq\| = |dt|$. Таким образом, M снабжено полем лоренцевских квадратичных конусов.

Касательные плоскости конуса возможных направлений в точке t , являющейся его вершиной, принадлежат проективизации кокасательного пространства к M в этой точке, $PT_m^*M \approx \mathbb{R}P^n$.

Часто полезно снабжать эти касательные плоскости коориентациями (указывающими направление распространения возмущения). Ориентированные касательные плоскости конуса возможных скоростей принадлежат сферизации ST_m^*M кокасательного пространства пространства-времени M . Эта сферизация диффеоморфна сфере S^n .

Некоординированные (координированные) гиперплоскости в касательном пространстве многообразия называются *контактными элементами* (координированными контактными элементами) многообразия. Они образуют многообразие расслоения контактных элементов (координированных контактных элементов) $PT^*M \rightarrow M$ ($ST^*M \rightarrow M$) со слоем $\mathbb{R}P^n$ (S^n), где $n = \dim M - 1$.

Таким образом, поле конусов возможных скоростей определяет гиперповерхность в многообразии контактных элементов простран-

ства-времени (быть может, коориентированных). Эта гиперповерхность в геометрической оптике называется гиперповерхностью Френеля. Она является основным геометрическим объектом геометрической оптики, вариационного исчисления и теории оптимального управления.

Замечание. Векторы пространства, двойственного к пространству скоростей, в теории распространения волн часто называют медлительностями.

Построенная выше гиперповерхность может быть описана как поле конусов в пространстве T^*M медлительностей на пространстве-времени.

На многообразиях контактных элементов любого многообразия (коориентированных или нет) имеется замечательная геометрическая структура — контактная структура. Это поле гиперплоскостей в касательных пространствах многообразия контактных элементов, инвариантно определенное расслоением многообразия контактных элементов над исходным многообразием M .

Такое поле существует и единственно; оно называется *тавтологическим* и определяется следующей конструкцией. Каждая точка пространства расслоения контактных элементов на M является гиперплоскостью в касательном пространстве исходного многообразия M . Прообраз этой плоскости при проектировании пространства расслоения на M и есть гиперплоскость тавтологического поля в исходной точке.

Замечание. Тавтологическая контактная структура задает одно условие на скорость движения контактного элемента. Это условие называется *условием конька*. Смысл этого условия состоит в том, что конек (контактный элемент на плоскости катка) может свободно вращаться на месте и может двигаться в заданном им самим направлении, но сопротивляется при попытке сдвигать его в трансверсальных направлениях.

Рассмотрим интегральные многообразия тавтологической контактной структуры.

Пример 1. Для любой гиперповерхности в M все касающиеся ее контактные элементы образуют интегральное многообразие тавтологической контактной структуры в PT^*M (или в ST^*M , если они коориентированы). Размерность этого интегрального многообразия чуть-

чуть (на $1/2$) меньше половины размерности многообразия контактных элементов.

Пример 2. Все контактные элементы, приложенные в одной точке многообразия M , образуют интегральное многообразие тавтологической контактной структуры в PT^*M (или в ST^*M). Размерность этого интегрального многообразия такая же, как размерность интегрального многообразия примера 1.

Пример 3. Для любого подмногообразия (любой размерности) в M все касающиеся его контактные элементы на M образуют интегральное подмногообразие тавтологической контактной структуры в PT^*M (или в ST^*M) такой же размерности, как в примерах 1 и 2.

Задача 1. Докажите, что интегральных подмногообразий большей n размерности многообразие контактных элементов на M^{n+1} с его тавтологической структурой не имеет.

Задача 2. Существуют ли гладкие интегральные подмногообразия размерности n тавтологической контактной структуры на многообразии контактных элементов в M^{n+1} , не получающееся конструкцией примера 3?

Указание. Рассмотрите контактные элементы, касающиеся полукубической параболы $x^2 = y^3$ на плоскости ($n = 1$).

Определение. Интегральные многообразия максимально возможной размерности (n в контактном многообразии размерности $2n + 1$) называются *лежандровыми*.

Теорема 1 (теория опорных функций). *Многообразие 1-струй функций на сфере S^{n-1} в \mathbb{R}^n (с его естественной контактной структурой) контактно диффеоморфно многообразию коориентированных контактных элементов в \mathbb{R}^n (с его тавтологической контактной структурой).*

Доказательство. Обозначим через $q \in S^{n-1} \subset \mathbb{R}^n$ точку единичной сферы в евклидовом пространстве. Касательные векторы к сфере в точке q можно считать ортогональными q векторами пространства. Их можно также считать кокасательными, так как евклидова структура отождествляет вектор p с линейной функцией (p, \cdot) . Таким образом, 1-струя функции f на S^{n-1} задается тройкой $(q \in S^{n-1}, p = df|_q \in \mathbb{R}^n, z = f(q))$.

Искомый диффеоморфизм задается формулой

$$Q = q + pz, \quad P = q,$$

где Q — точка приложения контактного элемента \mathbb{R}^n , коориентированного нормальным ему вектором P .

Задача. Докажите, что: 1) это действительно диффеоморфизм $J^1(S^{n-1}, \mathbb{R}) \approx ST^*\mathbb{R}^n (\approx S^{n-1} \times \mathbb{R}^n)$; 2) он переводит естественную контактную структуру в J^1 в тавтологическую контактную структуру ST^* .

Указание. Посмотрите, во что переходят лежандровы многообразия.

Замечание. Расстояние от начала координат до ортогональной q касательной плоскости выпуклой гиперповерхности в \mathbb{R}^n называется *значением опорной функции* заданной гиперповерхности в точке $q \in S^{n-1}$. Опорная функция задана на сфере (внешних) нормалей и определяет гиперповерхность.

Функция, заданная на сфере, определяет гиперповерхность в пространстве (огибающую соответствующего функции семейства гиперповерхностей). Эта гиперповерхность, однако, может иметь особенности.

Задача. Рассмотрите кривые, заданные функциями $x^2 + 2y^2 + t$ (где t — параметр) на окружности $x^2 + y^2 = 1$.

Вернемся к гиперповерхности Френеля медлительности фронтов, лежащей в многообразии ST^*M^{n+1} коориентированных контактных элементов пространства-времени.

Определение. *Лучами* (на этой гиперповерхности) называются ее характеристики (т. е. интегральные кривые поля характеристических направлений гиперповерхности).

Напомню, что характеристическое направление гиперповерхности в точке многообразия с контактной структурой (заданной как поле нулей дифференциальной 1-формы α) есть косоортогональное дополнение (в смысле симплектической структуры $d\alpha$ на плоскости $\alpha = 0$ в каждой точке) к пересечению касательной гиперплоскости гиперповерхности с гиперплоскостью контактной структуры.

Пример. Пусть (q_1, \dots, q_n) — координаты в «физическом пространстве» B^n , $q_0 = t$ — время, (p_0, p_1, \dots, p_n) — соответствующие

компоненты момента. Тавтологическая контактная структура локально задается 1-формой $\alpha = p_0 dq_0 + p_1 dq_1 + \dots + p_n dq_n$, где $[p_0 : p_1 : \dots : p_n]$ — однородные координаты в $\mathbb{R}P^n$, $q_0 = t$. В аффинных координатах, для которых $p_0 = -1$, $\alpha = -dt + p_1 dq_1 + \dots + p_n dq_n$. Гиперповерхность медлительностей задается уравнением

$$p_0 = H(p_1, \dots, p_n; q_1, \dots, q_n, t),$$

где H — однородная функция первой степени по переменным p_i . Уравнение характеристик имеет вид

$$\frac{dp_i}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial q_i}, \quad \frac{dq_i}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p_i} \quad (i = 1, \dots, n).$$

Таким образом, лучи определяются уравнениями Гамильтона, причем функция Гамильтона задается гиперповерхностью медлительностей.

Рассмотрим теперь геометрию распространения волн в среде, в которой локальная скорость распространения возмущений определяется этой гиперповерхностью медлительностей в пространстве контактных элементов пространства-времени.

Типичным примером является семейство эквидистант подмногообразия риманова многообразия. Гиперповерхность медлительностей определяет гиперповерхность второго порядка в каждом проектизированном кокасательном пространстве пространства-времени. Семейство эквидистант (гиперповерхностей, отстоящих на расстояние t от заданной начальной гиперповерхности в физическом пространстве) можно рассматривать как одну гиперповерхность в пространстве-времени (сечения которой различными изохронами $t = \text{const}$ и дают все семейство эквидистант). Аналогичным образом определяется *большой фронт*, описывающий распространение фронтов возмущений единой гиперповерхностью в пространстве-времени с более общей гиперповерхностью медлительностей в многообразии контактных элементов пространства-времени.

Рассмотрим контактные элементы пространства-времени, касающиеся большого фронта. Все они принадлежат гиперповерхности медлительностей (в этом и состоит локальный закон распространения возмущений). Очевидно

Предложение. Контактные элементы, касающиеся большого фронта, образуют лежандрово подмногообразие тавтологической

контактной структуры пространства контактных элементов пространства-времени, проектирующееся на большой фронт и лежащее в гиперповерхности медлительностей.

Рассмотрим теперь начальное условие, заданное мгновенным фронтом возмущения в момент $t = 0$. Этот фронт определяет подмногообразие коразмерности один в большом фронте, которое также является интегральным для тавтологической контактной структуры многообразия контактных элементов пространства-времени, но которое не лежандрово, так как имеет размерность на 1 меньшую, чем лежандровы подмногообразия.

Это начальное интегральное подмногообразие состоит из контактных элементов пространства-времени, касающихся начального фронта и в добавок принадлежащих гиперповерхности медлительностей. Именно последнее условие позволяет (при надлежащих условиях невырожденности) выбрать из однопараметрического семейства контактных элементов пространства-времени, содержащих касательное пространство к начальному фронту в данной точке, тот контактный элемент пространства-времени, который касается конуса возможных скоростей.

Основу всей теории распространения возмущений составляет следующий простой и общий факт контактной геометрии (в сущности, открытый Гюйгенсом и заслуживающий поэтому наименования «принцип Гюйгенса»):

Теорема 2. *Лежандрово подмногообразие гиперповерхности в контактном пространстве содержит вместе с каждой точкой всю характеристику этой поверхности, проведенную через эту точку.*

Здесь предполагается, что касательная плоскость к гиперповерхности нигде не совпадает с контактной плоскостью $\alpha = 0$.

Доказательство. Вдоль лежандрова многообразия $\alpha = 0$, поэтому на его касательной плоскости $d\alpha = 0$. Если бы вектор ξ характеристического направления не лежал в этой плоскости, он был бы ей косоортогонален в смысле формы $d\alpha$, и мы получили бы, присоединив ξ к касательной плоскости лежандрова многообразия, косоортогональную себе плоскость в симплектическом линейном пространстве $\alpha = 0$, размерность которой больше половины размерности пространства. Это невозможно, поэтому характеристические направления касаются лежандрова многообразия, что и утверждалось.

Следствие. Лежандрово многообразие, соответствующее большому фронту, получается из начального условия следующей конструкцией. Начальный фронт поднимается в интегральное многообразие пространства контактных элементов пространства-времени, лежащее в гиперповерхности медлительностей. Затем рассматриваются характеристики этой гиперповерхности, проходящие через точки построенного интегрального многообразия. Они образуют лежандрово многообразие. Его проекция в пространство-время — это большой фронт. Сечения большого фронта изохронами $t = \text{const}$ — это мгновенные фронты.

В этом состоит описание распространения возмущений при помощи волн (фронтов) и лучей (характеристик).

Поскольку характеристики определяются обыкновенными дифференциальными уравнениями, каждая из них определяется одной своей точкой. При совершенно разных начальных условиях, для которых совпадают лишь касательные гиперплоскости начальных фронтов в одной точке в начальный момент времени, характеристики будут одинаковыми. Физически это означает, что бесконечно малые кусочки волнового фронта распространяются (вдоль характеристик) независимо друг от друга. Это и позволяет привлечь для описания распространения фронта (волн, определяемых уравнениями с частными производными) частицы (движение которых определяется обыкновенными дифференциальными уравнениями — уравнениями Гамильтона для характеристик гиперповерхности медлительностей).

В частности, в качестве начального условия можно даже взять точечный фронт (соответствующий лежандрову многообразию, составляющему слой расслоения контактных элементов). Теорема применима и в этом случае (хотя он и кажется вырожденным с точки зрения приведенного выше следствия).

Точечному начальному фронту соответствует «сферическая» волна. Сопоставляя распространение возмущений от произвольного начального фронта с распространением возмущений от одного из составляющих его точечных источников, мы видим, что соответствующие им лежандровы многообразия содержат общую характеристику. Из этого следует, что мгновенный фронт в последующие моменты времени касается сферического фронта исходного точечного источника в точке на луче, выходящем из источника по направлению, определяемому направлением начального фронта.

Отсюда следует, что мгновенный фронт в момент t является огибающей семейства сферических фронтов точечных источников, принадлежащих исходному фронту. Это — первоначальная формулировка принципа Гюйгенса (известного в разных отделах математики под разными именами: принцип Понtryгина, канонические уравнения Гамильтона и т. д.).

Между прочим, уравнения характеристик — не что иное, как инфинитезимальный вариант утверждения Гюйгенса об огибающей, соответствующий бесконечно малым значениям t и, следовательно, бесконечно малым сферическим фронтам.

Разумеется, в описанной выше геометрической теории предполагалось, что нужные определители отличны от нуля, так что теорема о неявной функции применима. Например, поле лоренцевых конусов в пространстве-времени нигде не должно касаться изохрон $t = \text{const}$ и т. д. Нетрудно проверить, что в таких примерах, как задачи римановой геометрии, даже с зависящей от времени метрикой, эти условия выполнены автоматически. В других задачах, например, в теории оптимального управления, ситуация часто оказывается более сложной, и необходимость исследовать особенности, возникающие при обращении определителей в нуль, составляет основную трудность.

Тот факт, что характеристики, проведенные через точки начально-го интегрального многообразия, образуют лежандрово многообразие, нуждается в доказательстве. Мы на нем не останавливаемся, потому что оно совершенно такое же, как уже проведенное выше доказательство теоремы 3 лекции 2.

Лекция 4

СТРУНА (МЕТОД ДАЛАМБЕРА)

Рассмотрим струну (можно представлять себе реальную струну музыкального инструмента, прикрепленную к деке, рис. 4.1).




Рис. 4.1. Струна

Пусть $u(x, t)$ — смещение струны в точке x в момент t от равновесного состояния в ортогональном направлении. Известно, что если струна однородна, а смещения невелики по сравнению с размерами струны, то функция $u(x, t)$ удовлетворяет следующему линейному дифференциальному уравнению в частных производных второго порядка:

$$u_{tt} = a^2 u_{xx}. \quad (4.1)$$

Выводом этого уравнения мы в данной лекции заниматься не будем. Здесь a — константа, имеющая физический смысл скорости, как будет показано ниже.

1. ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ

Задача 1. Покажите, что уравнение (4.1) заменой переменных

$$\xi = x - at, \quad \eta = x + at$$

приводится к виду

$$u_{\xi\eta} = 0. \quad (4.2)$$

(При $a = 1$ эта замена представляет собой композицию поворота и растяжения в плоскости независимых переменных.)

Уравнение (4.2) легко решается: запишем его в виде $(u_\xi)_\eta = 0$, что означает, что функция u_ξ не зависит от η , т. е. постоянна вдоль вертикальных прямых на плоскости (ξ, η) , рис. 4.2.




Рис. 4.2. Характеристики уравнения струны

Итак, $u_\xi = f(\xi)$, т. е. дифференциальное уравнение свелось к простейшему уравнению вида $F' = f$, значит, $u = \int f(\xi) d\xi = F(\xi) + G(\eta)$; заметим, что константа интегрирования, вообще говоря, зависит от прямой, вдоль которой интегрирование происходит, т. е. от η .

Если мы ищем решение в классе таких функций, чтобы все они, в том числе в промежуточных выкладках, были непрерывными, то получим общее решение вида $f(\xi) + g(\eta)$, где функция f гладкая, а g непрерывная. Мы пришли к «решению», которое может вообще не иметь производных! Кроме того, решая в другом порядке, получим асимметрию в смысле гладкости. Симметричность же смешанных частных производных имеет место только в достаточно гладком случае. Это наблюдение служит стимулом к введению обобщенных функций, в классе которых можно рассматривать решение вида $f(\xi) + g(\eta)$ с негладкими f, g .

Мы в данной лекции считаем, что решение ищется в классе достаточно гладких функций, так что f и g достаточно гладкие.

Итак, $u(x, t) = f(x - at) + g(x + at)$ — общее решение уравнения (4.2).

2. КРАЕВЫЕ ЗАДАЧИ И ЗАДАЧА Коши

Задача Коши выявляет сходство и различие теорий ОДУ и УРЧП. В теории ОДУ фазовое пространство конечномерно, а мы будем иметь дело с бесконечномерным фазовым пространством.

Задача Коши для струны представляет собой уравнение (4.1) с начальными условиями

$$u|_{t=0} = \varphi(x), \quad u_t|_{t=0} = \psi(x). \quad (4.3)$$




Рис. 4.3. Стержень

Значение второй производной в начальный момент не надо задавать, поскольку ее можно определить из уравнения.

Мы считаем, что $x \in \mathbb{R}$, т. е. струна бесконечна. Эта модель дает хорошее приближение к физической реальности, если мы рассматриваем малые по сравнению с размером струны отклонения на малых промежутках времени.

Первая краевая задача включает уравнение (4.1) при $x \in (0, l)$, начальные условия (4.3) и граничные условия

$$u|_{x=0} = u|_{x=l} = 0, \quad (4.4)$$

выражающие тот факт, что конечная струна закреплена на концах.

Эта задача описывает также продольные колебания закрепленного на концах стержня, здесь $u(x, t)$ — смещение точки x стержня от положения равновесия в момент t , рис. 4.3.

Можно рассмотреть колебания стержня с одним или обоими свободными концами, что выражается условием

$$u_x|_{x=0} = 0 \quad \text{и/или} \quad u_x|_{x=l} = 0. \quad (4.5)$$

Комбинацией этих условий получаются вторая и третья краевые задачи.

Четвертая краевая задача: рассматриваются периодические граничные условия

$$u(x, t) = u(x + l, t), \quad (4.6)$$

тем самым функция u задана на окружности.

Мы собираемся получить полные решения всех указанных задач (частью — на упражнениях).

3. ЗАДАЧА Коши для неограниченной струны. ФОРМУЛА ДАЛАМБЕРА

Итак, рассмотрим задачу Коши $u_{tt} = a^2 u_{xx}$, $u|_{t=0} = \varphi(x)$, $u_t|_{t=0} = \psi(x)$.

Теорема (формула Даламбера). *Решение задачи Коши дается формулой*

$$u(x, t) = \frac{\varphi(x - at) + \varphi(x + at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(y) dy. \quad (4.7)$$

Схема доказательства. Мы знаем, что общее решение уравнения имеет вид $u(x, t) = f(x - at) + g(x + at)$. Рассмотрим слагаемое $f(x - at)$. График функции $f(x - at)$ в фиксированный момент t представляет собой график функции $f(x)$, сдвинутый при $t > 0$ вправо на at . Это слагаемое называется *прямой волной*. Аналогично слагаемое $g(x + at)$ называется *обратной волной*. Подставим $t = 0$ сначала в формулу общего решения, а затем в эту же формулу, продифференцированную по t , получим систему:

$$\begin{cases} u|_{t=0} = \varphi(x) = f(x) + g(x), \\ u_t|_{t=0} = \psi(x) = -af'(x) + ag'(x). \end{cases} \quad (4.8)$$

Решив ее, найдем f, g , подставим в формулу общего решения и получим (4.7).

Задача 2. Восстановите подробности доказательства.

ЗАДАЧИ О «МУЛЬТИЛЬМАХ»

Пользуясь формулой Даламбера, можно рисовать последовательные «кадры мультильма о колебании струны», зная графики условий Коши.

Пример. Пусть $\psi \equiv 0$, а график φ имеет вид, как на рис. 4.4, где $\varphi \neq 0$ на интервале длины 1.




Рис. 4.4. Начальные условия




Рис. 4.5. Форма струны в последовательные моменты

Тогда по формуле Даламбера, которая в данном случае имеет вид $u(x, t) = (\varphi(x - at) + \varphi(x + at))/2$, получим форму струны в последовательные моменты времени, рис. 4.5.

Задача 3. Нарисуйте мультфильм для начальных условий $\varphi \equiv 0$, ψ — функция вида \sim .

4. ПОЛУОГРАНИЧЕННАЯ СТРУНА

Задача включает в себя уравнение (4.1), начальные условия (4.3) и граничные условия $u|_{x=0} \equiv 0$ (закрепленный конец) или $u_x|_{x=0} \equiv 0$ (свободный конец).

Комбинируем граничные условия и вид начальных данных, получаем таблицу задач:

начальные условия	$\varphi: \sim$ $\psi \equiv 0$	$\varphi \equiv 0$ $\psi: \sim$
граничные условия		
свободный конец при $x = 0$	4	5
закрепленный конец при $x = 0$	6	7

Задачи 4–7. Нарисуйте мультфильмы движения струны для указанных в таблице условий.

Указание. Полуограниченную задачу можно свести к неограниченной так, чтобы решение неограниченной задачи, суженное на полуправую, давало решение полуограниченной задачи. Для этого необ-

ходимо так продолжить начальные условия на всю прямую, чтобы решение в точке $x = 0$ удовлетворяло граничным условиям.

Здесь помогают соображения четности. Продолжить начальное условие на всю прямую четным образом можно, если в начальный момент $u_x|_{x=0} = 0$. Но будет ли решение в любой момент четным по x ? Во-первых это можно вывести из формулы Даламбера, во-вторых можно воспользоваться следующей замечательной идеей.

При выводе формулы Даламбера доказана единственность решения задачи Коши. Уравнение инвариантно относительно преобразования $x \mapsto -x$. Если начальное условие четно, т. е. тоже инвариантно относительно этого преобразования, то имеем два решения: $u(x, t)$ и $u(-x, t)$. Но поскольку решение единствено, то они совпадают: $u(x, t) = u(-x, t)$, т. е. решение четно.

Это общая идея: если задача выдерживает некоторую симметрию, а решение единствено, то оно тоже выдерживает эту симметрию.

Аналогично можно использовать нечетное продолжение для условия $u|_{x=0} = 0$.

5. ОГРАНИЧЕННАЯ СТРУНА (РЕЗОНАНС)

Метод Даламбера не очень удобен для решения краевых задач в случае ограниченной струны, впоследствии мы разовьем другой очень мощный метод. Сейчас проиллюстрируем применение метода Даламбера на задаче о вынужденных колебаниях ограниченной струны. Эта задача включает в себя уравнение (4.1), начальные условия (4.3) и следующие краевые условия: $u|_{x=0} = f(t)$, $u|_{x=l} = 0$.

Задача 8. Найдите общее решение.

Указание. Вклад в решение в точке (x, t) дают значения, принесенные с краев и с начального отрезка $t = 0$ вдоль характеристик $x - at = \text{const}$, $x + at = \text{const}$. Характеристики претерпевают излом, отражаясь от краев. В итоге значение решения представляет собой альтернирующую сумму значений в узлах полученных ломаных, рис. 4.6. Начальные условия могут быть произвольными, для простоты можете сначала рассмотреть нулевые.

Задача 9. Пусть функция $f(t)$ периодическая с периодом T . Будет ли существовать периодическое решение с такими граничными условиями? Если будет, то будут ли периодическими остальные решения?




Рис. 4.6. Как получается значение решения в данной точке

О т в е т. Периодического решения не существует, например, в случаях резонанса (когда период внешней силы T соизмерим с «периодом собственных колебаний» $2l/a$). При почти всех (в смысле меры Лебега) значениях T периодическое решение существует (по крайней мере, если функция гладкая). Это вытекает из теоретико-числовых соображений (метрической теории диофантовых приближений).

В заключение отметим, что все рассмотренные результаты требовали лишь элементарного математического анализа, не выходящего за рамки теории дифференцирования и интегрирования. Следующие разделы потребуют более мощных средств анализа.

6. МЕТОД ФУРЬЕ

Вернемся к уравнению (4.1): $u_{tt} = a^2 u_{xx}$. На его правую часть мы можем смотреть как на дифференциальный оператор, отображающий одно функциональное пространство в другое (или в себя, если рассматривать пространство бесконечно гладких или аналитических функций).

Запишем уравнение (а вместе с ним и любую рассмотренную задачу) более абстрактно, например:

$$u_{tt} = Au,$$

$$u|_{x=0} = u|_{x=l} = 0 \quad \text{или} \quad u(x + 2\pi, t) = u(x, t).$$

Начальные условия не фиксируем, поскольку хотим научиться решать задачу для произвольных начальных условий.

Итак, A — линейный оператор, точкой фазового пространства является функция u , удовлетворяющая нашим граничным условиям.

Оператор A имеет некоторые дополнительные свойства, кроме линейности. Посмотрим, что могут дать эти свойства, для простоты, сначала на конечномерных моделях.

Модель 1. Рассмотрим линейное обыкновенное дифференциальное уравнение $u_t = Au$, u — вектор в евклидовом пространстве \mathbb{R}^N , A — самосопряженный оператор: $(Ax, y) = (x, Ay)$, где скобки обозначают скалярное произведение. Тогда оператор A имеет ортогональный базис из собственных векторов X_k , причем соответствующие собственные значения λ_k вещественны. Фундаментальную систему решений образуют функции $e^{\lambda_k t} X_k$. Общее решение имеет вид $u(t) = \sum c_k e^{\lambda_k t} X_k$. Легко найти решение с заданным начальным условием $u(0) = \varphi$ (в данном случае это конечномерные векторы). Подставим $t = 0$: $\varphi = \sum c_k X_k$, нам надо найти c_k . Домножим скалярно на X_j , воспользуемся ортогональностью базиса и получим: $c_j = (\varphi, X_j)/(X_j, X_j)$.

Сходство с волновым уравнением здесь в том, что наш дифференциальный оператор второго порядка d^2/dx^2 — самосопряженный в подходящем пространстве.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ В ПРОСТРАНСТВЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ МНОГОЧЛЕНОВ

Одна из самых замечательных идей Гильберта заключается в том, чтобы рассматривать пространства функций как евклидовы. Эта идея лежит в основе функционального анализа.

Но сейчас мы ограничимся конечномерными пространствами тригонометрических многочленов. При любом натуральном N рассмотрим пространство

$$E_N = \{u(x) = \sum_{k=-N}^{k=N} c_k e^{ikx}, \quad x \in S^1, \quad c_k \in \mathbb{C}\}.$$

Если суммирование распространяется от $-N$ до N , то мы остаемся в пределах линейной алгебры, если от $-\infty$ до $+\infty$ — то попадаем в область рядов Фурье, это уже раздел функционального анализа.

На пространстве E_N введем эрмитову структуру:

$$(f, g) := \int_0^{2\pi} f \bar{g} dx.$$

Задача 10. Проверьте, что выполнены все аксиомы эрмитова пространства.

Норма многочлена определяется формулой $\|f\|^2 = (f, f)$.

Задача 11. Докажите, что многочлены $e_k = e^{ikx}$, $k \in \{-N, \dots, N\}$ образуют ортогональный базис.

Решение: $\int_0^{2\pi} e^{ikx} e^{-ilx} dx = 2\pi$, если $k = l$; если же $k - l = m \neq 0$,

то интеграл равен $\int_0^{2\pi} e^{imx} dx = \frac{1}{im} e^{imx} \Big|_0^{2\pi} = 0$.

Модель 2. Рассмотрим периодическую краевую задачу для волнового уравнения с начальными условиями из пространства E_N :

$$\begin{aligned} u_{tt} &= a^2 u_{xx}, \quad u(x + 2\pi, t) = u(x, t), \\ u|_{t=0} &= \varphi, \quad u_t|_{t=0} = \psi, \quad \varphi, \psi \in E_N. \end{aligned}$$

В следующей лекции мы сведем ее к системе ОДУ вида $u_{tt} = Au$, т. е. аналогичной системе модели 1.

Лекция 5

МЕТОД ФУРЬЕ (ДЛЯ СТРУНЫ)

Рассмотрим периодическую краевую задачу для струны:

$$u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad x \in S^1 = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}, \quad (5.1)$$

$$u|_{t=0} = \varphi(x), \quad u_t|_{t=0} = \psi(x). \quad (5.2)$$

Эту задачу можно рассматривать как задачу Коши на окружности S^1 . На связном компактном многообразии с краем (например, на отрезке) пришлось бы задавать те или иные краевые условия.

1. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ В ПРОСТРАНСТВЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ МНОГОЧЛЕНОВ

Рассмотрим пространство комплексных тригонометрических многочленов

$$E_N = \left\{ \sum_{-N}^N a_k e^{ikx}, \quad a_k \in \mathbb{C} \right\}.$$

(Можно рассматривать и вещественноненеизменные многочлены; необходимое и достаточное условие вещественности $a_k = \overline{a_{-k}}$.)

Пусть начальные данные $\varphi, \psi \in E_N$. Тогда и решение $u(\cdot, t) \in E_N$. В E_N имеется эрмитова структура:

$$(f, g) = \int_{S^1} f(x) \overline{g(x)} dx, \quad \|f\|^2 = (f, f).$$

Легко проверяются следующие свойства:

1) Многочлены $\{e^{ikx}\}$ образуют ортогональный базис. Этот базис не нормированный: $\|e^{ikx}\| = \sqrt{2\pi}$. Обозначим $X_k = e^{ikx}$.

2) Оператор $L = a^2 \frac{d^2}{dx^2}: E_N \rightarrow E_N$ самосопряженный, причем X_k — его собственные векторы:

$$LX_k = -a^2 k^2 X_k.$$

2. ОТСУПЛЕНИЕ

Рассмотрим евклидово пространство \mathbb{R}^n и в нем самосопряженный невырожденный оператор $L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, пусть $\{X_k\}$ — ортогональный собственный базис, $\lambda_k = -\omega_k^2$ — собственные значения.

Рассмотрим задачу: $\ddot{x} = Lx$, $x(0) = \varphi$, $\dot{x}(0) = \psi$.

Вектор-функции $\sin(\omega_k t)X_k$, $\cos(\omega_k t)X_k$ образуют фундаментальную систему решений этой задачи. Действительно, размерность пространства решений задачи равна $2n$ (это доказывается сведением к системе первого порядка: $\dot{x} = p$, $\dot{p} = Lx$), указанные $2n$ функций являются решениями, и, кроме того, они линейно независимы (проверьте!).

Значит, общее решение имеет вид

$$x(t) = \sum (a_k \cos \omega_k t X_k + b_k \sin \omega_k t X_k).$$

Легко также найти решение с заданными начальными условиями:

$$\begin{aligned} x(0) &= \sum a_k X_k \Rightarrow a_k = \frac{(\varphi, X_k)}{(X_k, X_k)}, \\ \dot{x}(0) &= \sum b_k \omega_k X_k \Rightarrow b_k = \frac{(\psi, X_k)}{\omega_k (X_k, X_k)}. \end{aligned}$$

3. ФОРМУЛЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ПУНКТА 1

В этом случае вместо x пишем u , вместо \mathbb{R}^n имеем E_N , $L = a^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2}$, для простоты считаем, что $a = 1$. Имеем: $X_k = e^{ikx}$, $\omega_k = k$.

Тогда общее решение задачи Коши имеет вид:

$$u(x, t) = \sum (a_k \cos(kt) + b_k \sin(kt)) e^{ikx}, \quad (5.3)$$

$$a_k = \frac{1}{2\pi} (\varphi, e^{ikx}), \quad (5.4)$$

$$b_k = \frac{1}{2\pi k} (\psi, e^{ikx}), \quad k \neq 0. \quad (5.5)$$

Суммирование в этих формулах ведется в пределах от $-N$ до N .

Итак, процесс решения задачи Коши в классе E_N не выходит за рамки линейной алгебры. Но замечательно, что и в общем случае ответ дается формулами (5.3)–(5.5) (с суммированием от $-\infty$ до $+\infty$).

4. ОБЩИЙ СЛУЧАЙ

Пусть $\varphi, \psi \in C^\infty(S^1)$ (можно также рассмотреть класс аналитических начальных данных или, наоборот, конечной гладкости).

Теорема. Решение задачи Коши (5.1), (5.2) дается формулами (5.3)–(5.5) с суммированием от $-\infty$ до $+\infty$.

Для доказательства надо проверить сходимость ряда, возможность почленного дифференцирования и удовлетворение начальных условий.

5. РЯДЫ ФУРЬЕ

Нам надо доказать сходимость ряда (5.3) вместе с частными производными до второго порядка включительно.

Рассмотрим пространство $C^\infty(S^1)$ с эрмитовой структурой

$$(f, g) = \int_{S^1} f \bar{g} dx, \quad \|f\|^2 = (f, f).$$

Это пространство не полно в этой норме, поэтому называется предгильбертовым (полное называется гильбертовым). В этом пространстве система функций $\{X_k\} = \{e^{ikx}\}$ образует в некотором смысле «базис».

Заметим, что ряд (5.3) можно переписать в виде ряда по экспонентам, воспользовавшись формулами Эйлера. Появятся члены вида $e^{ik(t+x)}, e^{ik(t-x)}$. Такой ряд легко будет дифференцировать.

Для доказательства сходимости ряда (5.3) вместе со всеми рядами, полученными почленным дифференцированием, достаточно доказать, что коэффициенты a_k, b_k стремятся к 0 быстрее, чем любая степень k .

Чтобы доказать выполнение начальных условий, надо доказать, что ряд Фурье функции сходится к ней самой. В этом смысле система функций $\{X_k\}$ является базисом:

$$\varphi \sim \sum a_k X_k, a_k = (\varphi, X_k)/(X_k, X_k), \text{ тогда } \sum a_k X_k \rightarrow \varphi.$$

Заметим, что та часть доказательства, где доказывается просто сходимость ряда Фурье начального условия (безотносительно к предельной функции) не будет отличаться от доказательства сходимости ряда (5.3). Для этого, как уже отмечено, достаточно установить быстрое убывание $|a_k|$.

6. СХОДИМОСТЬ РЯДОВ ФУРЬЕ

Лемма 1. Коэффициенты Фурье функции из класса $C^\infty(S^1)$ убывают быстрее любой степени своего номера.

Доказательство. Очевидна следующая оценка:

$$|a_k| \leq (\max_{S^1} |\varphi|) \cdot 2\pi,$$

т. е. коэффициенты по меньшей мере ограничены. Выполним интегрирование по частям:

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{2\pi} \int \varphi(x) e^{-ikx} dx = \\ &= \frac{1}{-2\pi ik} \int \varphi(x) d(e^{-ikx}) = \\ &= \frac{1}{-2\pi ik} \left(\varphi(x) e^{-ikx} \Big|_0^{2\pi} - \int \varphi'(x) e^{-ikx} dx \right) = \\ &= \frac{1}{2\pi ik} \int \varphi'(x) e^{-ikx} dx. \end{aligned}$$

По той же самой причине, что в начале, последний интеграл ограничен равномерно по k . Далее, можно снова выполнять интегрирование по частям, причем столько раз, сколько нам нужно.

В итоге получим, что $\forall m \exists C_{m,\varphi}: |(\varphi, e^{ikx})| < C_{m,\varphi} |k|^{-m}$. Лемма доказана.

Замечание. Для функции класса C^m получим убывание коэффициентов Фурье, как $1/|k|^m$.

Задача. Пусть функция φ принадлежит классу $C^\omega(S^1)$, т. е. φ голоморфна в полосе $|\operatorname{Im} z| \leq \beta$ и периодична: $\varphi(z+2\pi) \equiv \varphi(z)$. Докажите, что тогда коэффициенты Фурье убывают экспоненциально:

$$|a_k| < C e^{-\beta|k|}.$$

Указание. Сдвиньте путь интегрирования в интегrale, определяющем коэффициенты Фурье, на $\pm i\beta$ (в зависимости от знака k).

Верно ли обратное утверждение: если для коэффициентов Фурье верна последняя оценка, то функция допускает голоморфное периодическое продолжение в указанную полосу?

Ответ. Сумма ряда голоморфна внутри указанной полосы.

Замечание. Если функция непрерывна, то ряд Фурье сходится к ней в метрике L^2 . Как показал современный шведский математик Карлесон, на множестве полной меры имеет место поточечная сходимость.

Лемма 2. Ряд Фурье функции класса C^2 сходится к ней самой.

Доказательство. Ряд Фурье, построенный по функции φ класса C^2 , равномерно сходится к некоторой функции $\psi \in C^0$ (по замечанию после леммы 1). Надо доказать, что $\varphi \equiv \psi$. Допустим противное: $\delta(x) := \varphi(x) - \psi(x) \not\equiv 0$. Тем не менее δ имеет нулевой ряд Фурье: $\forall k (\delta, X_k) = 0$.

Попробуем приблизить δ тригонометрическим полиномом:

$$\left\| \delta - \sum c_k X_k \right\|^2 = \|\delta\|^2 + \left\| \sum c_k X_k \right\|^2 \geq \|\delta\|^2 > 0. \quad (*)$$

Мы видим, что как угодно точное приближение невозможно. Однако по теореме Вейерштрасса можно приблизить непрерывную функцию δ с любой точностью тригонометрическими полиномами равномерно. Это противоречит (*). Лемма доказана.

Замечание. Можно рассмотреть метод Фурье для задачи на отрезке с теми или иными граничными условиями. Но фактически разработан метод решения совершенно общей задачи $u_{tt} = Au$, где u — функция на произвольном многообразии. Надо для оператора A на многообразии найти собственные функции и собственные значения, ортогональный базис из собственных функций, а затем осуществить всю вышеуказанную схему.

Уже для оператора Лапласа $A = \Delta$ получается богатая теория, например, на многообразиях с римановой метрикой. Она составляет часть спектральной теории дифференциальных операторов.

7. ЯВЛЕНИЕ ГИБСА

Ряд Фурье разрывной периодической функции не может сходиться к ней равномерно, но может сходиться поточечно (например, это так для разрывных кусочно-гладких функций: сумма такого ряда совпадает с самой функцией на интервалах гладкости). Последовательность графиков частичных сумм ряда Фурье кусочно-гладкой функции сходится (равномерно!), но сходится не к графику исходной функции, а к другой

кривой. Эта кривая получается из графика данной разрывной функции добавлением вертикальных отрезков над точками разрыва. Интересно, что эти отрезки длиннее, чем отрезки, соединяющие части графика слева и справа от точки разрыва. При этом длины дополнительных

вертикальных хвостиков, выступающих вверх и вниз за график исходной функции, составляют всегда одинаковую долю (примерно 9% каждый) от величины разрыва (рис. 5.1).

Для доказательства этого удивительного факта (называемого *явлением Гиббса*) достаточно явно провести вычисления максимума и минимума частичной суммы ряда Фурье простейшей 2π -периодической разрывной функции

(скажем, равной x при $|x| < \pi$). Общий случай можно свести к этому, уничтожая разрывы вычитанием подходящей линейной комбинации сдвигов этой простейшей разрывной функции.

Явление Гиббса приводит к интересным артефактам в томографии (где функция двух переменных, например, рентгеновская оптическая плотность плоского сечения человеческого тела, восстанавливаемая компьютером при помощи суммирования (двойного) ряда Фурье)¹.

Поскольку плотность — разрывная функция (например, из-за существования костей), возникает явление Гиббса. Оно проявляется здесь в виде дополнительных к линиями разрыва прямых: двойных касательных и касательных перегиба реальных границ тканей различной плотности (подумайте, почему).




Рис. 5.1. Явление Гиббса

¹ Коэффициенты этого ряда являются коэффициентами Фурье так называемого преобразования Радона исходной плотности; преобразование Радона — это интеграл исходной плотности вдоль прямой, рассматриваемый как функция прямой; здесь оно рассматривается как функция одной переменной, а именно, расстояния прямой данного параллельного пучка прямых от одной из этих прямых.

Лекция 6

ТЕОРИЯ КОЛЕБАНИЙ. ВАРИАЦИОННЫЙ ПРИНЦИП

Физикам известен экспериментальный факт: законы природы описываются вариационными принципами. Он не имеет рационального обоснования, что рождает попытки богословского, философского и пр. истолкований, см., например, сочинения Вольтера, Мопертюи и др. в сборнике «Вариационные принципы механики».

Принцип гласит, что «природа совершает свои действия кратчайшим путем». Например, согласно принципу Ферма, лучи света распространяются кратчайшим путем. В математической формулировке, близкой к современной, принцип наименьшего действия сформулирован Гамильтоном. Он имеет вид:

$$\delta \int L dt = 0.$$

Входящий в эту формулу интеграл называется действием. Принцип описывает движение некоторой механической системы. Лагранжиан $L(q, \dot{q}, t)$ — функция от состояния и скорости движения в соответствующем конфигурационном пространстве. В этой формулировке принцип читается так: «Движение механической системы $q = q(t)$ возможно тогда и только тогда, когда вариация интеграла действия вдоль кривой $q = q(t)$ равна нулю».

Другими словами, истинное движение является критической точкой функции действия, заданной на бесконечномерном пространстве гладких отображений отрезка в конфигурационное пространство, рис. 6.1. Функции на бесконечномерных пространствах обычно называют функционалами. Какой вид имеет функция действия для типичной механической системы?

Рассмотрим движение точки q по римановому многообразию M^n . Траектория задана отображением $q = q(t)$, $t \in [t_0, t_1]$. Будем считать, что концы $q(t_0), q(t_1)$ фиксированы. Касательный вектор $\dot{q}(t)$ имеет риманов квадрат длины. Величина $T = (1/2)\dot{q}^2$ называется *кинетической*




Рис. 6.1. Истинные движения — критические точки функции действия

энергии. Рассмотрим также некоторую функцию $U: M^n \rightarrow \mathbb{R}$, называемую *потенциальной энергией*. Положим $L = T - U$, эта функция называется *функцией Лагранжа, или лагранжианом.*

(В 19-м веке шли споры по поводу обозначений для координат, импульсов, а также о выборе знака в лагранжиане; математикам «минус», разумеется, не нравился. По обыкновению, победили физики, и теперь общепринятые обозначения такие: q — координаты, p — импульсы, $L = T - U$ — лагранжиан, $F = \frac{\partial L}{\partial q}$ — сила. Во всяком случае, физический здравый смысл удовлетворен: при поднимании камня от поверхности Земли его энергия увеличивается. См. Клейн [2].)

Функционал действия имеет вид: $\Phi[q] = \int_{t_0}^{t_1} L(q(t), \dot{q}(t), t) dt$.

В координатах кинетическая энергия T представляет собой квадратичную форму: $T = \frac{1}{2} \sum_{ij} a_{ij} \dot{q}_i \dot{q}_j$.

Введем импульсы $p_i = \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i}$.

Геометрически импульс есть линейная форма от касательного вектора, т. е. кокасательный вектор.


Теорема 1. Экстремали (критические точки) функционала действия удовлетворяют системе уравнений Эйлера – Лагранжа

$$\frac{dp_i}{dt} = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}, \quad i = 1, \dots, n.$$

(Это система n ОДУ второго порядка относительно n неизвестных функций $q_i(t)$.)

Теорему докажем позже, а сейчас выявим связь с уравнением колебаний струны и рассмотрим некоторые примеры.

Рис. 6.2. Модель струны
Лагранжа




Лагранж рассмотрел «дискретную струну», состоящую из шариков, скрепленных между собой пружинками, рис. 6.2.

Для такой системы нетрудно найти лагранжиан и вывести уравнения движения, затем предельным переходом можно получить уравнение струны и понять его вариационную основу, найти лагранжиан. Сначала рассмотрим простые примеры.

Пример 1. Пусть частица свободно движется в евклидовом пространстве, например, для простоты, на плоскости. Тогда потенциальная энергия U равна 0, лагранжиан $L = T = (1/2)(\dot{q}_1^2 + \dot{q}_2^2)$. Легко проверить, что экстремали действия — прямые. Действительно, по теореме 1 экстремали удовлетворяют уравнениям Эйлера — Лагранжа, которые в данном случае имеют вид: $\dot{p}_1 = 0$, $\dot{p}_2 = 0$. Но $p_1 = \dot{q}_1$, $p_2 = \dot{q}_2$, т. е. обобщенные импульсы совпадают со скоростями. Тогда $\ddot{q}_1 = 0$, $\ddot{q}_2 = 0$, решения этих уравнений — прямые, рис. 6.3.

Рис. 6.3. Прямые — экстремали действия для свободной частицы



Пример 2. Теперь введем потенциальную энергию $U = U(q)$, т. е. пусть частица движется в силовом поле. Имеем систему уравнений:

$$\begin{aligned} \dot{p}_1 &= -\frac{\partial U}{\partial q_1}, & \ddot{q}_1 &= -\frac{\partial U}{\partial q_1}, \\ \dot{p}_2 &= -\frac{\partial U}{\partial q_2}, & \text{или} & \\ && \ddot{q}_2 &= -\frac{\partial U}{\partial q_2}. \end{aligned}$$

Рассмотрим случай, когда U — квадратичная форма. Например, при $n = 1$ имеем $U = aq^2$, уравнение $\ddot{q} = -aq$ есть уравнение маятника.

В общем случае квадратичного потенциала U приведем квадратичную форму к главным осям ортогональным преобразованием (в смысле метрики, определенной кинетической энергией). Получим систему независимых осцилляторов. Возвращаясь к струне, можно сказать, что она представляет собой бесконечную систему независимых маятников.




Рис. 6.4. Вариация движения

Доказательство теоремы 1. Для простоты, чтобы не писать индексов, будем считать, что $q \in \mathbb{R}$. Имеем лагранжиан $L(q, \dot{q}, t)$. Рассмотрим вариацию движения $\delta q(t)$, $\delta q(t_0) = \delta q(t_1) = 0$, рис. 6.4.

Вычислим приращение лагранжиана:

$$L(q + \delta q, \dot{q} + \delta \dot{q}, t) - L(q, \dot{q}, t) = \frac{\partial L}{\partial q} \delta q + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} (\delta \dot{q}) + o(\delta).$$

Теперь найдем главную линейную часть приращения действия:

$$\begin{aligned} \delta \int_{t_0}^{t_1} L(q, \dot{q}, t) dt &= \int_{t_0}^{t_1} \left(\frac{\partial L}{\partial q} \delta q + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} (\delta \dot{q}) \right) dt \stackrel{(*)}{=} \\ &= \int_{t_0}^{t_1} \left(\left(-\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) \delta q + \frac{\partial L}{\partial q} \delta q \right) dt = \int_{t_0}^{t_1} \delta q \left(-\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} + \frac{\partial L}{\partial q} \right) dt. \end{aligned}$$

Переход $(*)$ — интегрирование по частям, причем учтено, что подстановка равна 0, т. к. на концах отрезка вариация траектории равна 0.

Если траектория критическая, то последнее выражение тождественно равно 0. Тогда

$$-\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} + \frac{\partial L}{\partial q} \equiv 0,$$

иначе можно было бы так подобрать вариацию δq , что интеграл не будет равен 0 (это упражнение). Теорема доказана.

В случае свободного движения частиц лагранжиан имеет вид $L = T$. Из уравнений Эйлера – Лагранжа сразу получается, что критические траектории — прямые. На них достигается минимум интеграла. Для задачи о кратчайшем пути $L = \sqrt{2T}$ экстремали опять прямые и на них достигается минимум.

Важное замечание. Эта теория не зависит от системы координат. Поэтому если некоторое уравнение есть уравнение Эйлера–Лагранжа, то оно имеет вид Эйлера–Лагранжа в любой другой системе координат. Поэтому достаточно делать замену координат только в лагранжиане.

Упражнение. Рассмотрим равномерное движение $q(t)$ частиц по прямым, тогда $q(t)$ — решение уравнения $\ddot{q} = 0$. Запишите соответствующее уравнение в полярных координатах.

Подробнее о методах вариационного исчисления см. [1, гл. 3], там же имеются дальнейшие ссылки.

Из нашей теории получается мощный метод исследования системы в окрестности критической точки по отношению к отклонению от положения равновесия потенциальной энергии, например, минимума. Заменим потенциал его квадратичной частью, ошибка в правой части уравнения (т. е. в силе) будет второго порядка малости по сравнению с отклонением от положения равновесия; линейная же часть при этом не изменится, так что описанная замена есть просто линеаризация. Квадратичную форму кинетической энергии, зависящую как от параметра от положения q , заменим постоянной формой, взятой в точке минимума. В конечномерном случае кинетическая и потенциальная энергия будут иметь вид:

$$T = \frac{1}{2}(A\dot{q}, \dot{q}), \quad U = \frac{1}{2}(Bq, q).$$

Первая форма положительно определена, а вторая — не обязательно, если исходная критическая точка потенциальной энергии не минимум.

Известно, что две такие формы можно одновременно привести к главным осям. Это — приведение второй формы к главным осям ортогональным преобразованием, где первая форма задает евклидову структуру пространства. Практически для этого надо решить характеристическое уравнение $\det(B - \lambda A) = 0$. Исторически это уравнение возникло у Лагранжа при изучении вековых колебаний орбит планет около кеплеровских орбит, поэтому характеристическое уравнение называлось сёкулярным (вековым).

Итак, в теории малых колебаний, по определению, кинетическая энергия T задает евклидову структуру в конфигурационном пространстве, потенциальная энергия U — квадратичная форма в этом пространстве. В декартовых координатах уравнения Эйлера–Лагранжа имеют вид $\ddot{q} = -\nabla U = -Bq$.

Существует простой геометрический способ отыскания главных осей. Рассмотрим эллипсоид уровня квадратичной формы (Bq, q) . Самая далекая в смысле заданной евклидовой структуры точка от начала координат определит нам первый собственный вектор (первую главную ось). Остальные главные оси лежат в ортогональном дополнении к первой, соответствующая гиперплоскость пересекает эллипсоид по эллипсоиду меньшей размерности; к нему снова надо применить указанную процедуру и т. д., рис. 6.5. Замечательно, что этот метод работает и в бесконечномерном пространстве.

В главных осях система распадается на одномерные уравнения, которые явно решаются (выпишем решения в случае положительно определенной формы B):




Рис. 6.5. Отыскание главных осей

$$\ddot{q}_k = -\lambda_k q_k,$$

$$q_k(t) = a_k \cos \omega_k t + b_k \sin \omega_k t, \quad \text{где } \omega_k = \sqrt{\lambda_k}.$$

Эти формулы описывают независимые гармонические собственные колебания по ортогональным направлениям. Если частоты неизмеримы, то движение в целом непериодическое.

Удобно записывать соответствующее собственным колебаниям решение в комплексной форме: $q(t) = \operatorname{Re}(A_k e^{i\omega_k t} \xi_k)$, здесь A_k — комплексная амплитуда, ξ_k — собственный вектор. Все решения получаются сложением этих: всякое колебание представляет собой суперпозицию собственных колебаний. Исходная система оказывается, таким образом, системой из n невзаимодействующих осцилляторов.

При увеличении потенциальной энергии U все собственные частоты растут (доказательство см. в [1]). Отсюда получаются следующие простые, но замечательные факты об эллипсоидах:

если один эллипсоид находится внутри другого, то каждая ось меньшего меньше соответствующей оси большего;

рассмотрим сечение эллипсоида плоскостью, проходящей через его центр, тогда оси сечения имеют промежуточные значения между осями исходного эллипса, рис. 6.6.




Рис. 6.6. Соотношения между осями эллипсоидов

Практически эффект наблюдается, например, при задевании трещины в колоколе: треснутый колокол звучит глухо, при задевании трещины начинает звучать звонче.

Подробнее о малых колебаниях см. [1, гл. 5], а также [3, §25, п. 6].

Чтобы обобщить нашу теорию на бесконечномерные системы, потребуется обоснование. Но сначала посмотрим, какие получатся результаты.

В случае одномерной закрепленной на концах струны конфигурационным пространством является пространство функций $u(x)$: $u(0) = u(l) = 0$. Предположим, что функции эти гладкие. Кинетическая энергия имеет вид

$$T = \frac{1}{2} \int_0^l \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 dx.$$

Потенциальная энергия есть работа по приведению струны в заданную форму $u(x)$. Предположим, что эта форма мало отличается от стационарного положения $u \equiv 0$. При вычислении потенциальной энергии в приближении теории малых колебаний мы должны учитывать члены порядка u^2 , но можем пренебречь членами высшего порядка (u^3 и т. д.). Поскольку на изгибание струны работа не затрачивается, то вся работа идет на удлинение струны от исходной длины l до новой длины — длины графика $u(x)$.

Лемма. Потенциальная энергия туго натянутой струны пропорциональна ее удлинению (в приближении малых колебаний), с коэффициентом, пропорциональным силе натяжения.

Доказательство. По закону Гука сила натяжения пропорциональна удлинению. Удлинение — величина второго порядка малости по отношению к отклонению струны. Следовательно, величину силы натяжения деформируемой струны можно считать постоянной и не зависящей от формы струны (в рамках приближения малых колебаний, т. е. когда энергия вычисляется с учетом величин второго порядка малости по отношению к отклонению, но не третьего; в этом приближении силу достаточно вычислять, сохраняя члены первого порядка малости по отношению к отклонениям, пренебрегая величинами второго порядка малости).

Если сила натяжения при деформации постоянна, то энергия элемента струны вычисляется как работа этой постоянной силы на элементе пути и потому (в рассматриваемом приближении) пропорциональна удлинению этого элемента (и величине силы натяжения).

Суммируя потенциальные энергии всех элементов деформированной струны, мы получаем, что ее потенциальная энергия в рассматриваемом приближении равна произведению величины силы растяжения на удлинение всей струны.

Пренебрегая малыми выше второго порядка по отношению к u , мы получаем окончательно для потенциальной энергии выражение:

$$U = F \int_0^b \left(\sqrt{1 + \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2} - 1 \right) dx \approx \frac{F}{2} \int_0^b \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 dx.$$

Замечание. К тому же выражению можно было прийти, рассматривая модель с бусинками и пружинками, вычисляя силу, действующую на i -ю бусинку со стороны $(i-1)$ -й и $(i+1)$ -й (считая, что бусинка движется по нормали к невозмущенной струне). Нормальные невозмущенной струне проекции этих двух сил в первом приближении пропорциональны разностям отклонений соседних бусинок $q_i - q_{i-1}$ и $q_{i+1} - q_i$ соответственно (с разными знаками и с общим коэффициентом F , равным натяжению струны).




Рис. 6.7. Дискретная модель струны

Потенциальная энергия $U = \sum \frac{F}{2} (q_{i+1} - q_i)^2$ приводит именно к такой силе, действующей на i -ю бусинку:

$$-\frac{\partial U}{\partial q_i} = F [(q_{i+1} - q_i) - (q_i - q_{i-1})] = F(q_{i+1} - 2q_i + q_{i-1}).$$

В пределе сумма превращается в полученный при доказательстве леммы интеграл.

Лагранжиан $L = T - U$.

Чтобы записать уравнение Эйлера — Лагранжа, найдем импульсы и силы.

Очевидно, $p(x) = \partial u / \partial t$ (если струна однородна и везде имеет плотность 1).

Потенциальная энергия в допредельном случае равна $\frac{F}{2} \sum (q_{i+1} - q_i)^2$, где $q_i = u(x_i)$, рис. 6.7.

Чтобы найти силу, возьмем производную по q_i , получим

$$-F(q_{i+1} - q_i) + F(q_i - q_{i-1}) = -F(q_{i+1} - 2q_i + q_{i-1}).$$

В скобках стоит не что иное, как вторая разность (рис. 6.8), которая после предельного перехода превратится во вторую производную $\partial^2 u / \partial x^2$.

Итак, после предельного перехода уравнение Эйлера — Лагранжа будет иметь вид

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2},$$

т. е. вид волнового уравнения. Коэффициент k прямо пропорционален ее натяжению и обратно пропорционален ее плотности. Метод решения у нас уже есть — будем искать собственные колебания. Надо найти главные оси квадратичной формы потенциальной энергии в метрике, заданной кинетической энергией. В конечномерном случае мы писали:

$$q(t) = A e^{i\omega t} \xi.$$

Значит для струны надо искать решение в виде $u = e^{i\omega t} \xi(x)$.




Рис. 6.8. Вторая разность




Рис. 6.9. Стоячие волны

Подставим в уравнение:

$$-\omega^2 e^{i\omega t} \xi(x) = k e^{i\omega t} \xi''(x).$$

Придем к задаче на собственные функции: $\xi''(x) = -\lambda \xi$, $\lambda = \frac{\omega^2}{k}$.

Это применение общей теории собственных колебаний называется *методом разделения переменных*. Решение:

$$\begin{aligned}\xi &= a \cos \sqrt{\lambda} x + b \sin \sqrt{\lambda} x; \quad \xi(0) = 0 \Rightarrow a = 0; \\ \xi(l) &= 0, \quad \sin \sqrt{\lambda} l = 0, \quad \sqrt{\lambda} l = n\pi; \quad \sqrt{\lambda} = \frac{n\pi}{l}; \quad \omega \sim n.\end{aligned}$$

Мы видим, что есть счетное количество главных осей, собственных функций; при увеличении номера n собственные частоты растут. При умножении собственной функции на вещественную часть комплексной экспоненты времени получим стоячую волну (рис. 6.9): форма волны не меняется, по t происходят гармонические колебания.

В конечномерном случае всякие колебания разлагались в суперпозицию собственных. В случае уравнения струны это тоже верно, но требует отдельного доказательства (доставляемого теорией рядов Фурье, для того и созданной. Поэтому теорию рядов Фурье и ее обобщения называют также *гармоническим анализом*.)

Обоснование возможности применения теории колебаний к системам с бесконечным числом степеней свободы (вроде струны) было получено математиками довольно поздно (в конце XIX — начале XX века) и привело к созданию функционального анализа, а затем — квантовой механики. Однако сама общая алгебраическая структура теории колебаний как с конечным, так и с бесконечным числом степеней свободы — теория гораздо более фундаментальная (и использовавшаяся физиками с полным успехом задолго до строгого математического обоснования).

Положение здесь сходно с обоснованием теории вещественных чисел (полученным, строго говоря, лишь в XIX веке). Древним грекам времен Пифагора пришлось засекретить теорему о несоизмеримости диагонали квадрата с его стороной, подрывавшую веру в могущество чисел (которые в те времена понимались лишь как рациональные).

Это не помешало Ньютону создать анализ, не останавливаясь на деталях обоснования арифметики действительных чисел (ему, впрочем, хорошо известных). Автор настоящего курса стремился научить слушателей скорее искусству угадывать и предсказывать смелые обобщения (подобные переходу от колебаний с конечным числом степеней свободы к колебаниям сплошных сред), чем трудному ремеслу строгого обоснования этих результатов (включающего неизбежное исследование минимальной необходимой гладкости изучаемых объектов).

Сейчас в аналогичном теории колебаний сплошных сред и теории вещественных чисел положении находится квантовая теория поля, доставляющая наиболее поразительные математические результаты, но не их обоснования.

Задача* (Штурм, Гурвиц). Рассмотрим вещественную 2π -периодическую функцию

$$f(x) = \sum_{k \geq N} a_k \cos kx + b_k \sin kx,$$

ряд Фурье которой начинается с N -х гармоник. Докажите, что число нулей функции f на окружности $\{x \bmod 2\pi\}$ не меньше, чем число нулей первой гармоники, входящей в ряд с ненулевым коэффициентом (т. е. не меньше, чем $2N$).

Пример. При $N = 1$ число нулей не меньше двух. Это — неравенство Морса: функция на окружности имеет не менее двух критических точек.

ЛИТЕРАТУРА

1. Арнольд В. И. Математические методы классической механики.— М.: Наука, 1989.
2. Клейн Ф. Лекции о развитии математики в XIX столетии.— М.: Наука, 1989.
3. Арнольд В. И. Обыкновенные дифференциальные уравнения.— М.: Наука, 1984.

Лекция 7

ТЕОРИЯ КОЛЕБАНИЙ.

ВАРИАЦИОННЫЙ ПРИНЦИП (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Итак, кинетическая и потенциальная энергии струны (рис. 7.1) имеют вид: $T = \frac{1}{2} \int_0^l \dot{u}^2 dx$, $U = \frac{k}{2} \int_0^l (u_x)^2 dx$.




Рис. 7.1. Струна

Лагранжиан $L = T - U$, из вариационного принципа $\delta \int L dt = 0$ следует уравнение Эйлера–Лагранжа $\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = \frac{\partial L}{\partial q}$, которое в нашем случае имеет следующий вид уравнения колебаний струны:

$$u_{tt} = ku_{xx}.$$

Эти результаты можно обобщить на многомерный случай. Пусть колеблется тело произвольной размерности, например, при $n = 2$ это мембрана. Мембрану, как и струну, можно представлять себе в виде предела системы колеблющихся шариков, соединенных пружинками, рис. 7.2.

струна



мембрана




Рис. 7.2. Аппроксимации струны и мембраны

В случае мембраны или многомерного тела кинетическая энергия выражается аналогично случаю струны: $T = \frac{1}{2} \iint \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 dx$.

Под интегралом имеем в виду соответствующий многомерный интеграл.

Заметим, что можно рассматривать колебания не только в одном направлении, а в нескольких, тогда u становится вектор-функцией (геометрически: положение равновесия отвечает нулевому сечению расслоения, а само расслоение может быть любым). Кинетическая энергия будет записываться той же формулой, только под интегралом — скалярный квадрат вектора скорости.

Как выражается потенциальная энергия? Сообщим ответ:

$$U = \frac{k}{2} \int (\nabla u)^2 dx,$$

где $\nabla u = \frac{\partial u}{\partial x} = \left(\frac{\partial u}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial u}{\partial x_n} \right)$ — градиент. Этот интеграл называется *интегралом Дирихле*.

Дирихле занимался в основном теорией чисел, но он же заметил, что гармонические функции минимизируют этот интеграл (при соответствующих граничных условиях). Эта физическая идея — так называемый принцип Дирихле — оказалась мощнейшим орудием как для доказательства существования решений соответствующих задач, так и для их исследования и даже практического приближенного вычисления. Интересно отметить, что с этим интегралом и его обобщениями связаны попытки доказать гипотезу о нулях дзета-функции. Гипотеза состоит в том, что все нетривиальные комплексные нули дзета-функции лежат на одной вещественной прямой. Идея (восходящая по меньшей мере к Гильберту) заключается в том, чтобы найти задачу о колебаниях, через собственные числа которой выражаются нули дзета-функции. Вещественность собственных чисел влечет их расположение на одной вещественной прямой в комплексной плоскости.

Задача. Найти минимум интеграла Дирихле на пространстве гладких функций на сфере.

Решение. Для константы интеграл равен нулю, а для непостоянной функции он положителен. Следовательно, минимум равен нулю и достигается только на постоянных функциях.

Уравнения Эйлера – Лагранжа имеют в многомерном случае вид $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = k\Delta u$, где $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \dots + \frac{\partial^2}{\partial x_n^2}$ — оператор Лапласа в декартовых координатах. На самом деле оператор Лапласа зависит не от координат, а определяется евклидовой структурой пространства, как показывает следующая

Теорема 1. $\Delta u = \operatorname{div}(\operatorname{grad} u)$.

Прежде, чем доказать теорему, напомним определения участвующих здесь понятий и убедимся в их инвариантности.

Пусть u — функция, тогда ее дифференциал du — 1-форма, действующая на касательный вектор ξ : $du|_x(\xi) = (a_x, \xi)$, поскольку в евклидовом пространстве любая 1-форма есть скалярное произведение на фиксированный в данной точке вектор. Этот вектор называется вектором градиента функции u в точке x : $a_x = \operatorname{grad} u|_x$. Таким образом, градиент определяется евклидовой структурой пространства (более общо, римановой метрикой многообразия).

В любых координатах имеем: $du = \left(\frac{\partial u}{\partial x_1} dx_1 + \dots + \frac{\partial u}{\partial x_n} dx_n \right)(\xi) = \sum \frac{\partial u}{\partial x_i} \xi_i$. В декартовых ортонормированных координатах это запись скалярного произведения векторов ξ и $\left(\frac{\partial u}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial u}{\partial x_n} \right)$, так что в декартовых ортонормированных координатах градиент u имеет компоненты $\left(\frac{\partial u}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial u}{\partial x_n} \right)$.

Упражнение. Найдите компоненты $\operatorname{grad} u$ в полярных координатах на евклидовой плоскости и в сферических координатах в евклидовом трехмерном пространстве.

Дивергенция векторного поля определена на многообразии, на котором задан элемент объема, в частности, на римановом многообразии.

Рассмотрим векторное поле $v = \sum v_i(x) \frac{\partial}{\partial x_i}$ и соответствующий уравнению $\dot{x} = v(x)$ фазовый поток в n -мерном пространстве.

Напомним определение потока поля через некоторую поверхность. Обозначим форму объема через $\tau = \tau^n$. Форма объема τ^n — n -форма. Рассмотрим соответствующую вектору v $(n-1)$ -форму $i_v \tau$. Эта форма получается подстановкой в τ^n на первое место вектора v , остальные $n-1$ мест — свободны.




Рис. 7.3. Поток векторного поля через поверхность

Потоком поля v через $(n - 1)$ -мерную ориентированную гиперповерхность называется интеграл от этой формы по гиперповерхности.

Пример. Пусть в декартовых ортонормированных координатах $\tau = dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n$. Тогда

$$\begin{aligned} i_v \tau &= v_1 dx_2 \wedge \cdots \wedge dx_n - v_2 dx_1 \wedge dx_3 \wedge \cdots \wedge dx_n + \dots \\ &\quad \dots \pm v_n dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_{n-1}. \end{aligned}$$

В частности, при $n = 3$ для поля скоростей системы $\dot{x} = P$, $\dot{y} = Q$, $\dot{z} = R$ получаем: $i_v \tau = P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy$.

Поток имеет ясный гидродинамический смысл: количество фазовой жидкости, протекающей через поверхность за единицу времени, рис. 7.3.

Рассмотрим поток \bar{V}_ε поля v через малую сферу радиуса ε с центром x . *Дивергенцией* поля v в точке x называется предел $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\bar{V}_\varepsilon}{\tau(\varepsilon)}$, где $\tau(\varepsilon)$ — объем шара. Смысл дивергенции — «плотность источника» в данной точке.

Итак, дивергенция определена, если задана форма объема. В частности, дивергенция определена в римановых и евклидовых пространствах. Дивергенция поля v на многообразии с элементом объема τ связана с внешним дифференцированием $(n - 1)$ -форм (вовсе не зависящим от системы координат) соотношением

$$(\operatorname{div} v)\tau = d(i_v \tau).$$

Теорема 2. Дивергенция поля v в декартовых ортонормированных координатах есть след матрицы Якоби поля v :

$$\operatorname{div} v = \frac{\partial v_1}{\partial x_1} + \cdots + \frac{\partial v_n}{\partial x_n}.$$




Рис. 7.4. Малое линейное преобразование элемента объема

Доказательство. Рассчитаем новое положение точки x при движении по фазовому потоку поля v за малое время ε : $x \mapsto x + \varepsilon v(x) + o(\varepsilon)$. Таким образом, элемент объема подвергается малому линейному преобразованию, рис. 7.4.

Лемма. *В первом приближении вклад в изменение объема параллелепипеда вносят изменения векторов только в своем собственном направлении.*

Упражнение. Докажите лемму.

Поскольку в определении дивергенции вместо сферы можно взять параллелепипед, натянутый на n векторов, при вычислении потока надо найти приращение его объема при малом сдвиге вдоль v , в главном члене по лемме получится след матрицы Якоби v , умноженный на объем исходного параллелепипеда; при делении и переходе к пределу получится, что дивергенция равна этому следу. Теорема 2 доказана.

В декартовых координатах элементарным вычислением получаем, что $\Delta u = \operatorname{div}(\operatorname{grad} u)$. Этой формулой оператор Лапласа определен на любом римановом многообразии.


Задача. Вычислить оператор Лапласа функции, заданной на окружности $x^2 + y^2 = 1$ на евклидовой плоскости.

Ответ. $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}$, где $x = \cos \varphi$, $y = \sin \varphi$.

Формула $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \dots + \frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2}$ справедлива лишь в декартовых ортонормированных координатах, в других координатах оператор выражается по-другому, даже если пространство евклидово.

Упражнение. Запишите оператор Лапласа в полярных, цилиндрических и сферических координатах.

Замечание. Как будет показано ниже, геометрический смысл интеграла Дирихле — главный член приращения площади мембранны. Замечательно, что он квадратичный.



$$b = a\epsilon + O(\epsilon^2), \quad c = a + O(\epsilon^2)$$

Рис. 7.5. Гипотенуза практически равна катету

Это совершенно очевидно в одномерном случае: при малом угле разность между катетом и гипотенузой имеет второй порядок малости (проверьте), рис. 7.5. Этот простой факт имеет большие последствия и важные приложения.

Примеры. 1. Возвращаясь домой по синусоиде, вы увеличите себе путь совсем немного (примерно на 20%), так как в увеличение пути вносят вклад лишь участки с большим наклоном, а их доля невелика, рис. 7.6.



Рис. 7.6. Синусоида не намного длиннее прямой

2. Немного отклонив двигатели от продольной оси самолета, можно спасти хвостовое оперение от сгорания в струе, при этом ослабление тяги имеет лишь второй порядок малости, рис. 7.7. Например, даже при огромном отклонении в 6° получаем $\epsilon \approx 0,1$, при этом потеря тяги составляет всего 0,5%.




Рис. 7.7. Поворот двигателей практически не меняет силу тяги

3. Кеплер при обработке результатов астрономических наблюдений Тихо Браге (которые велись невооруженным глазом; еще в конце XVII в. надо было доказывать, что наблюдения в телескоп дают не меньшую точность) вначале думал, что Марс движется вокруг Солнца по окружности, но Солнце находится не в центре. Действительно, рассмотрим эллипс с полуосами a, b и малым эксцентриситетом e , рис. 7.8.




Рис. 7.8. Эллипс с малым эксцентризитетом почти неотличим от окружности

Тогда $b = a\sqrt{1 - e^2} = a(1 - e^2/2 + \dots)$. При малом e (для Марса примерно $1/10$) разницу между эллипсом и окружностью заметить трудно, а разница между центром и фокусом хорошо заметна.

Это подтверждается и таким простым опытом. Капните в круглую чашку с чаем каплю близко к центру. Волны, отразившись от стенок, соберутся в симметричной относительно центра точке, рис. 7.9.




Рис. 7.9. Собирание волн в круге и эллипсе

Объяснение. Если в эллиптической чашке капнуть точно в фокус, волны после отражения соберутся в другом фокусе. Окружность очень мало отличается от эллипса с малым эксцентризитетом. Поэтому волны собираются во втором фокусе этого близкого эллипса (но не точно, а немного размыто). При тщательном наблюдении можно заметить и вторичное собирание волн в исходной точке.

Теперь объяснение самого факта второго порядка малости различия: прямая дает минимум функционала длины, поэтому приращение и не может быть первого порядка малости.

Вернемся к геометрическому смыслу интеграла Дирихле. Утверждается, что это главная часть приращения площади, т. е. если S_0 — площадь мембранны в положении равновесия, а S_ε — площадь при отклонении εu , то нам надо доказать, что новая площадь S_ε равна $S_0 + \frac{\varepsilon^2}{2} \int (u_x)^2 dx + o(\varepsilon^2)$, рис. 7.10. Посмотрим на изменение площади малой площадки. Выберем удобную систему координат: одна ось идет



Рис. 7.10. Изменение площади мембраны

вдоль $\text{grad } u$, другая — ортогонально, рис. 7.11. Тогда новая площадь есть произведение новых длин, при этом одна из длин не изменилась, а другая вычисляется, как в одномерном случае, в итоге $S_\varepsilon = S_0(1 + + (\varepsilon^2/2)(\nabla u)^2 + \dots)$.

Остается проинтегрировать приращение по всей мемbrane.




Рис. 7.11. Вычисление приращения площади

Можно все вычисления провести в допредельной системе шариков на пружинках, рис. 7.12.

Проделаем гомотопию au от положения равновесия до отклонения εu , при этом надо найти член порядка ε^2 в выражении для потенциальной энергии, т. е. работы по созданию такого отклонения. Вид сбоку в двух ортогональных направлениях такой же, как в одномерном случае, рис. 7.12, поэтому равнодействующие сил уже вычислены и представля-




Рис. 7.12. Вычисление потенциальной энергии мембраны

ют собой (при надлежащем выборе единиц измерения) вторые разности со знаком минус:

$$-u(x-h, y) + 2u(x, y) - u(x+h, y), \quad -u(x, y-h) + 2u(x, y) - u(x, y+h).$$

При переходе к пределу получим члены вида $-u_{xx}$, $-u_{yy}$. При интегрировании по α от 0 до ε получим

$$-\int \alpha \Delta u d\alpha u = -u \Delta u \int \alpha d\alpha = -\frac{\varepsilon^2}{2} u \Delta u.$$

Наконец, при интегрировании по области имеем (с точностью до числового множителя)

$$U = - \iint \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) u dx dy.$$

Выполним интегрирование по частям (сначала по x)

$$\int \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} u dx = - \int \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial x} dx + u \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x_1}^{x_2}.$$

Учтем, что на границе $u = 0$ (мембрана закреплена), тогда подстановка нулевая. Аналогично выполняется интегрирование по y . В итоге получим

$$U = \iint (\nabla u)^2 dx dy.$$

Таким образом, потенциальная энергия пропорциональна приращению площади. Уравнение Эйлера – Лагранжа в этом случае, как мы видели, — волновое уравнение.

Попутно доказана формула

$$\int (\nabla u)^2 dx = - \int \Delta u u dx \quad (u|_{\partial\Omega} = 0).$$

Кроме того, мы вычислили силу, которая оказалась равна $-\Delta u$, поэтому волновое уравнение можно интерпретировать как уравнение Ньютона. Но можно просто честно посчитать $\frac{\partial L}{\partial q}$, раз нам известны T, U . Это квадратичные формы на бесконечномерном пространстве функций ($\dot{q} = u_t$, $q = u$).

Найдем вариацию $\delta \int \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 dx$. Пусть $u = u_0(x) + \varepsilon \xi(x)$, $\xi|_{\partial\Omega} = 0$.

Нам надо найти коэффициент при ε в разложении интеграла и представить его как бесконечномерное скалярное произведение:

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_0}{\partial x} + \varepsilon \frac{\partial \xi}{\partial x} \right)^2 dx &= \int \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_0}{\partial x} \right)^2 dx + \varepsilon \int \frac{\partial u_0}{\partial x} \frac{\partial \xi}{\partial x} dx + \dots = \\ &= -\varepsilon \int \xi \Delta u dx + \int \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_0}{\partial x} \right)^2 dx + \dots \end{aligned}$$

(при интегрировании по частям мы воспользовались тем, что $\xi|_{\partial\Omega} = 0$). Первый из этих интегралов и есть скалярное произведение. Так что сила действительно равна $-\Delta u$.

Все эти рассуждения верны и для Риманова многообразия.

Замечательный факт заключается в том, что волновым уравнением описывается широкий класс задач. Волновое уравнение можно получить исходя из предположения, что данная вариационная задача удовлетворяет некоторым условиям аксиоматического характера (правда, само вариационное происхождение задач математической физики остается без убедительного объяснения). Вот эти аксиомы:

1. Кинетическая энергия T есть квадратичная форма от скоростей, что означает *пространственную однородность* системы. Впрочем, в случае переменной плотности T выражалась бы похожей формой.

Ограничимся случаем однородной среды, где T есть интеграл от $\frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2$. Укажем, каким аксиомам должна удовлетворять U , чтобы задача описывалась волновым уравнением.

2. Квадратичная форма U аддитивна и локальна, что физически означает отсутствие дальнодействия. Квадратичная форма может быть записана в виде $U = \frac{1}{2} (Au, u)$, где A — линейный оператор, а скобка означает скалярное произведение (т. е. интеграл от произведения функций). Оператор A называется *локальным*, если значение функции Au в точке вычисляется через конечное число производных функции u в этой точке.

В нашем случае взаимодействуют только две соседние точки, что приводит к появлению в интеграле Дирихле только производных первого порядка u_x (а в соответствующем симметрическом операторе $A = -\Delta$ — только вторых производных). Взаимодействие большего

числа точек приведет к появлению старших производных. Например, в задаче об изгибе тонкой пластины в уравнении появится оператор $\Delta^2 u$. В случае мембраны прирост энергии происходит только за счет растяжения, но не изгиба. В случае пластинки энергия затрачивается и на изгибание. Это тоже пример локальной системы, но со старшими производными. Если же в форму потенциальной энергии войдут только производные первого порядка, то она будет иметь общий вид:

$$\sum a_{ij} \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial u}{\partial x_j} + \sum b_j \frac{\partial u}{\partial x_j} u + cu^2.$$

В каких случаях соответствующий симметрический оператор превращается в оператор Лапласа? Дальнейшие ограничения на оператор, действующий на функции в евклидовом пространстве \mathbb{R}^n :

3. Однородность (инвариантность относительно сдвигов):

$$\Delta(u(x+a)) = (\Delta u)(x+a).$$

4. Изотропность (инвариантность относительно вращений g):

$$\Delta(u(gx)) = (\Delta u)(gx).$$

Квадратичная форма от вектора градиента задает эллипсоид уровня в касательном пространстве в каждой точке. Пространство изотропно, если этот эллипсоид — сфера, т. е. свойства мембраны не зависят от поворота. Встречаются и неизотропные среды.

Из однородности и изотропности вытекает, что $b = 0$, поскольку линейная часть оператора есть скалярное произведение b на $u \frac{\partial u}{\partial x}$, и если бы b был ненулевым, то свойства мембраны изменились бы при некотором повороте.

Член cu^2 может присутствовать в однородной изотропной среде, например, он присутствует в задаче о колебании воздушного шара (тонкой оболочки) вокруг положения равновесия. Отсутствие этого члена связано со следующим ограничением.

5. Метрика пространства (x, u) не меняется при сдвигах вдоль оси u .

Все эти ограничения приводят к тому, что в уравнении останется лишь оператор Лапласа.




Рис. 7.13. Задача Дирихле для струны




Рис. 7.14. Задача Дирихле для мембраны

Рассмотрим теперь задачу о положениях равновесия — критических точках потенциальной энергии. Если $u|_{\partial\Omega} = 0$, то 0 — устойчивое положение равновесия, это минимум интеграла Дирихле. Но можно рассматривать другие граничные условия. Например, рассмотрим струну с концами, закрепленными в произвольных точках, рис. 7.13.

В этом случае минимум потенциальной энергии достигается на прямой.

Поставим аналогичную задачу для мембранны: $\Delta u = 0$, $u|_{\partial\Omega} = \varphi$. Это *задача Дирихле для уравнения Лапласа*, рис. 7.14. Решения уравнения $\Delta u = 0$ называются *гармоническими функциями* в области Ω . Решение задачи Дирихле мы будем искать в классе функций, непрерывных на замыкании Ω и дважды дифференцируемых внутри.

Имеется общий прием нахождения минимума потенциала U . Для этого надо двигаться против градиента, т. е. вдоль векторного поля $\dot{q} = -\nabla U$. В случае положительно определенной квадратичной формы U таким способом обязательно приедем к минимуму. В нашем случае уравнение градиентного спуска имеет вид ($\dot{q} = \frac{\partial u}{\partial t} = k\Delta u (= -\text{grad } U)$). В частности, для струны получим уравнение $\frac{\partial u}{\partial t} = ku_{xx}$, которое называется *уравнением диффузии или теплопроводности*.




Рис. 7.15. Выравнивание температур узлов

Уравнение теплопроводности получается в задаче о распространении тепла. Рассмотрим нагреваемые элементы, расположенные в узлах решетки. В каждый следующий момент времени значение температуры в узле — некоторое взвешенное среднее значений в пяти точках, рис. 7.15. Для простоты нарисуем одномерный случай (тот же рисунок).

Усреднив, получим новую функцию, затем к ней применим ту же процедуру и т. д. Это не что иное, как реализация алгоритма градиентного спуска. Итак, распространение тепла происходит так же, как градиентным методом ищется минимум потенциальной энергии.

Если уравнение интерпретировать как уравнение диффузии, то оно отвечает за плотность распределения частиц. Оператор Лапласа возникает исходя из описанных условий инвариантности системы. Между прочим, в этом случае член cu в уравнении (соответствующий $cu^2/2$ в потенциальной энергии) часто физически оправдан: он отвечает за рождение или смерть частиц в зависимости от знака c .

Способ отыскания стационарных решений (положений равновесия), таким образом, описан.

В специальных случаях удается найти явные решения. Сначала займемся гармоническими функциями. Как решения линейного уравнения $\Delta u = 0$, они образуют линейное пространство. Попытаемся удовлетворить граничным условиям. При $n = 1$ гармонические функции — линейные, их пространство двумерно, базис образуют функции $(1, x)$. Можно провести прямую (единственную) через две заданные точки и удовлетворить граничным условиям.

Пусть $n = 2$.

Теорема 3. Отождествим вещественную плоскость с комплексной прямой. Пусть $f(z)$ — голоморфная функция. Тогда $\operatorname{Re} f, \operatorname{Im} f$ — гармонические функции.

Упражнение. Докажите теорему. Воспользуйтесь уравнениями Коши — Римана.

Задачи. 1. Пусть $\varphi(x, y)$ — ориентированный угол, под которым виден из точки (x, y) фиксированный отрезок на плоскости. Докажите, что $\varphi(x, y)$ — гармоническая вне концов данного отрезка (многозначная) функция от (x, y) .

2. Постройте ограниченную функцию, гармоническую внутри круга, непрерывную всюду, кроме двух данных точек на границе, равную 0 на одной из дуг, на которые точки делят окружность, и 1 — на другой.

3. Аналогичная задача, когда окружность разбита на n дуг и даны n значений.

4. Найдите все гармонические функции на сфере (т. е. решите уравнение $\operatorname{div} \operatorname{grad} u = 0$, где u — гладкая функция на сфере в \mathbb{R}^n).

Указание. Если функция не константа, то ее интеграл Дирихле не 0, и функция не является критической точкой интеграла Дирихле. Значит, $\Delta u \neq 0$.

5. На вершинах куба в момент 0 задана функция. В каждый следующий момент $(i+1)$ значение в каждой точке заменяется средним арифметическим значений в соседних вершинах в предыдущий момент (i) . Найти предел получающейся последовательности функций при $i \rightarrow +\infty$.

Указание. Предельная функция — «гармоническая».

6. Пусть u — однородная функция степени 0 в \mathbb{R}^n (т. е. $u(\lambda x) = u(x)$ при любом x и любом $\lambda > 0$). Докажите, что

$$r^2 \Delta u = \tilde{\Delta} u,$$

где $\tilde{\Delta}$ на единичной сфере — оператор Лапласа $\operatorname{div} \operatorname{grad}$ (т. е. $(\tilde{\Delta} u)_{r=1} = \operatorname{div} \operatorname{grad}(u|_{r=1})$).

7. Пусть u — однородная функция степени k в \mathbb{R}^n (т. е. $u(\lambda x) = \lambda^k u(x)$ при любом x и любом $\lambda > 0$). Докажите, что

$$\tilde{\Delta} u = r^2 \Delta u - (k^2 + (n-2)k)u,$$

где $\tilde{\Delta} u$ — однородная функция степени k , совпадающая при $r = 1$ с $\operatorname{div} \operatorname{grad}(u|_{r=1})$.

В частности, для однородных функций степени k на плоскости ($n = 2$)

$$\tilde{\Delta} u = r^2 \Delta u - k^2 u,$$

а для однородных функций степени k в трехмерном пространстве

$$\tilde{\Delta} u = r^2 \Delta u - (k^2 + k)u.$$

8. Найдите все гармонические в $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ однородные функции, зависящие только от r .

Указание. Случай $n = 2$ — особый.

9*. Докажите, что число областей, на которые нулевая линия уровня k -й собственной функции оператора Лапласа в комплексной области (с граничными условиями Дирихле) делит эту область, не больше k . (Этот результат верен на компактных римановых многообразиях любой размерности, например, на сферах.)

Например, первая собственная функция (с наименьшим по модулю собственным числом) вовсе не меняет знака (она обращается в ноль лишь на границе области).

Указание. Отношение интеграла Дирихле к интегралу квадрата собственной функции на каждой из N компонент дополнения к нулевой линии уровня собственной функции одинаково. Поэтому существует N -мерное пространство функций, на котором это отношение квадратичных форм такое же, как для собственной функции.

Из теорем лекции 6 об осях эллипсоидов следует, что номер оси k не меньше размерности N .

10. Рассмотрим собственные функции оператора Лапласа на торе размерности n :

$$\sum \frac{\partial^2 u}{\partial x_j^2} = -\lambda u, \quad (x_j \bmod a_j) \in T^n.$$

Обозначим через $N(E)$ число собственных функций, для которых $\lambda \leq E$. Исследовать поведение $N(E)$ при $E \rightarrow \infty$.

Указание. Оператор Лапласа коммутирует со сдвигами. Поэтому собственными функциями являются экспоненты

$$e_k(x) = e^{2\pi i(k,x)}, \quad (k, x) = \sum k_j x_j / a_j, \quad k_j \in \mathbb{Z}.$$

Следовательно, вопрос сводится к подсчету числа целых точек в большом эллипсоиде.

Ответ. Рассмотрим в пространстве кокасательного расслоения тора T^*T^n область $\Omega(E)$, заданную неравенством $\sum \xi_j^2 \leq E$ (ξ_j — координаты формы $\sum \xi_j dx_j$). Тогда при $E \rightarrow \infty$

$$N(E) \sim (2\pi)^{-n} \operatorname{Vol} \Omega(E) = \operatorname{const} \cdot E^{n/2}.$$

Замечание 1. Аналогичная формула Вейля верна на любом многообразии и для любого «эллиптического» оператора, например, для оператора второго или высшего порядка с переменными коэффициентами $P\left(x, i \frac{\partial}{\partial x}\right) = \lambda u$. Область Ω в этом случае определяется условием $\tilde{P}(x, \xi) \leq E$, где \tilde{P} — сумма старших однородных членов по ξ многочлена P («главный символ»).

Замечание 2. Следующие члены асимптотики $N(E)$ исследовать трудно, даже для обычного оператора Лапласа при $a_j = 2\pi$. Беда в том, что на поверхности сферы $\sum k_j^2 = E$ может оказаться много целых точек (иными словами, собственное число E может иметь большую кратность) — эта возможность реализуется, например, в случае оператора Лапласа на сфере S^2 , для которого собственное число E имеет кратность порядка \sqrt{E} (см. лекцию 11).

Лекция 8

СВОЙСТВА ГАРМОНИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ

В этой лекции мы будем заниматься свойствами гармонических функций в основном на плоскости, некоторые теоремы будут доказаны в n -мерном случае, а начнем с трехмерного.

Рассмотрим функцию $u = 1/r$, где $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, (x, y, z) — декартовы координаты.

Упражнение. Проверьте, что функция u гармоническая.

Этот простой пример на самом деле является очень важным. Дело в том, что две важнейшие силы, изучаемые в физике, — сила тяготения и кулоновская сила — устроены следующим образом: они действуют вдоль соединяющей частицы прямой, а по абсолютной величине обратно пропорциональны квадрату расстояния между ними.

Но тогда потенциал, градиентом которого является сила притяжения к одной частице, пропорционален $1/r$ — гармонической функции. Линейная комбинация гармонических функций является гармонической функцией. Поэтому потенциал силы притяжения к конечному числу частиц является гармонической функцией.

От конечного числа частиц можно перейти к непрерывно распределенной массе (заряду) с плотностью $\rho(x)$ в некоторой области D . Тогда потенциал поля притяжения к этому телу в некоторой точке x вычисляется по формуле

$$\int_D \frac{\rho(y) dy}{|x - y|},$$

рис. 8.1, причем эта функция от x гармоническая в области, свободной от массы (или зарядов). Таким образом, фундаментальные законы природы связаны с гармоническими потенциалами.

Попытаемся понять без вычислений, почему функция $u = 1/r$ гармоническая, т. е. почему $\operatorname{div} \operatorname{grad} u = 0$.




Рис. 8.1. Гравитационное поле

Прежде всего $\operatorname{div} \operatorname{grad} u$ в точке x зависит лишь от r — расстояния точки x до 0, т. е. $\operatorname{div} \operatorname{grad} u(x) = f(\|x\|)$. Далее, рассмотрим область, расположенную между концентрическими сферами радиусов r и R , $r < R$. Вычислим поток $\operatorname{grad} u$ через границу этой области. Градиент u направлен к точке 0 и ортогонален рассматриваемым сферам. Площадь внешней сферы в $(R/r)^2$ раз больше площади внутренней сферы. Но величина градиента на внешней сфере ровно в то же число раз меньше, чем на внутренней (сила обратно пропорциональна квадрату расстояния). Значит, потоки градиента через внутреннюю и внешнюю сферу в точности равны, т. е. поток градиента через границу области в точности равен нулю. Откуда вытекает равенство нулю $\operatorname{div} \operatorname{grad}(1/r)$. Впрочем, конечно, равенство $\Delta(1/r) = 0$ можно проверить дифференцированием.

Теперь перейдем к случаю плоскости. Рассмотрим голоморфную функцию $f(z)$ на плоскости или в области, тогда по ней легко строятся гармонические функции: $\operatorname{Re} f(z)$, $\operatorname{Im} f(z)$, $\ln |f(z)|$, $\arg f(z)$ (последние две — вещественная и мнимая части голоморфной функции $\ln f(z)$) и т. п. Верно и обратное: всякая гармоническая функция получается таким способом.

Теорема 1. *Всякая гармоническая функция в односвязной области плоскости есть вещественная часть голоморфной функции, которая определена в этой области с точностью до аддитивной мнимой постоянной.*

Доказательство. Ищем голоморфную функцию в виде $f = u + iv$, гармоническая функция u нам задана, а v надо найти. В силу условий Коши–Римана $u_x = v_y$, $u_y = -v_x$, тогда $dv = \alpha$, где $\alpha = (-u_y)dx + u_x dy$. В односвязной области функция v с таким дифференциалом существует, если $d\alpha = 0$. В этом случае можно определить $v(x)$ как $\int_{x_0}^x \alpha$, и интеграл не будет зависеть от пути в области, так как в силу формулы Стокса интеграл по любому замкнутому пути будет нулевым. Итак, осталось проверить выполнение условия: $d\alpha = 0$. Но $d\alpha = (u_{xx} + u_{yy})dx \wedge dy = 0$, поскольку u — гармоническая. Значит, функция v существует и определена с точностью до вещественной аддитивной постоянной.

Мы видим, что на плоскости теории гармонических и аналитических функций по существу совпадают, первые — вещественные части

последних. Это определяет роль аналитических функций в математической физике, с их помощью можно получить явные решения многих задач, например, задачи об обтекании крыла потоком воздуха (Жуковский).

Теорема 2 (теорема о среднем). *Среднее значение гармонической функции на окружности равно значению в центре* (рис. 8.2): $\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u d\varphi = u(0)$.

Ниже мы докажем аналогичную теорему в многомерном случае и увидим, что это свойство гармонической функции можно принять за ее определение.

Доказательство. Как мы знаем, $u = \operatorname{Re} f$, где f голоморфна. Рассмотрим представление интегралом Коши:

$$f(0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(t)}{t} dt.$$




Рис. 8.2. Теорема о среднем

Это равенство верно для любой кривой γ , охватывающей точку 0.

В вещественной теореме мы будем явно использовать, что контур γ — окружность. Запараметризуем точку окружности: $t = Re^{i\varphi}$, тогда $\frac{dt}{t} = \frac{iRe^{i\varphi} d\varphi}{Re^{i\varphi}} = i d\varphi$. Подставим все в интеграл Коши:

$$f(0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) d\varphi, \quad f = u + iv.$$

Получим нужное нам равенство отдельно для вещественной и мнимой частей. Теорема доказана.

В многомерном случае теории гармонических и аналитических функций расходятся.

СЛЕДСТВИЯ ИЗ ТЕОРЕМЫ О СРЕДНЕМ

1. Принцип максимума. *Гармоническая функция не достигает экстремума внутри области, точнее, пусть $u(x_0, y_0) = \max u(x, y)$. Тогда если $(x_0, y_0) \in D$, то $u \equiv \text{const}$.*




Рис. 8.3. Принцип максимума

Доказательство. Пусть точка максимума (x_0, y_0) — внутренняя. Возьмем малую окружность с центром в ней (рис. 8.3). Если значение в некоторой точке (x_1, y_1) окружности меньше, чем в (x_0, y_0) , то по непрерывности оно меньше и на целой дуге, тогда нарушится теорема о среднем. Значит, функция постоянна в окрестности точки (x_0, y_0) . Другими словами, множество точек области, в которых $u(x_0, y_0) = \max u(x, y)$, открыто. Но это множество, очевидно, замкнуто, т. е. множество внутренних точек максимума либо пусто, либо совпадает с компонентой связности. Получим, что функция постоянна на всей компоненте связности, содержащей (x_0, y_0) .

Это доказательство основано лишь на теореме о среднем. Так что принцип максимума будет доказан и в многомерном случае, как только мы докажем многомерную теорему о среднем.

С точки зрения теории аналитических функций принцип максимума является проявлением локального сохранения области. Действительно, если бы вещественная часть аналитической функции могла достигать экстремума во внутренней точке, нарушился бы принцип сохранения области, рис. 8.4.




Рис. 8.4. Принцип максимума и принцип сохранения области

2. Единственность. Непрерывное решение задачи Дирихле в связной ограниченной области единственно.

Доказательство. Разность двух решений есть функция гармоническая внутри области, тождественно равная нулю на границе. Поскольку область ограничена, максимум и минимум этой разности достигаются (либо внутри области, либо на границе). Если максимум или минимум достигаются внутри, то разность константа и, значит, равна нулю. Если на границе, то разность имеет равные нулю максимум и минимум и тоже равна нулю. Итак, по принципу максимума разность тождественно равна нулю в области.

Заметим, что единственность решения задачи Дирихле имеет место для непрерывных функций, удовлетворяющих теореме о среднем, т. е. существует не более одной непрерывной функции, удовлетворяющей теореме о среднем, с заданным значением на границе ограниченной области.

Замечание. В неограниченных областях решение неединственно. Например, функция x гармонична в полуплоскости $x > 0$, непрерывна в замыкании этой полуплоскости и равна нулю на ее границе, но не внутри.

Теорема 3. *Непрерывная функция, удовлетворяющая теореме о среднем, является гармонической.*

Доказательство. Рассмотрим в области задачу Дирихле (в обычном смысле, т. е. для гармонической функции) с граничным значением, равным значению нашей функции. (Позднее мы докажем, что решение существует.) Рассмотрим разность решения и нашей функции. Она нулевая на границе, удовлетворяет теореме о среднем, значит, тождественно равна нулю в области.

Замечание. То, что ядро оператора Лапласа состоит из очень гладких функций — вещественных частей аналитических — заложено в природе этого оператора. Для волнового оператора картина совсем другая. Особенность данных Коши распространяется вдоль характеристик, так что решения волнового уравнения не более гладкие, чем начальные-данные.

Перейдем к решению задачи Дирихле. Сначала построим решение для круга.

Схема первого способа. Накопим достаточный запас гармонических функций в круге. Рассмотрим на границе круга функцию $\cos n\varphi$. Есть ли аналитическая функция с такой вещественной

частью? Есть, это функция

$$f_n(z) = \left(\frac{z}{R}\right)^n = \left(\frac{|z|}{R}\right)^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi).$$

У функции $if_n(z)$ вещественная часть на границе $|z| = R$ равна $\sin n\varphi$. Так что мы можем решить задачу Дирихле, если граничное условие имеет вид $\cos n\varphi$ или $\sin n\varphi$. Но мы знаем, что любое граничное условие можно разложить в ряд по этим функциям. Значит, сможем решить задачу и с любым граничным условием.

Реализуем первый метод в задаче Дирихле для круга. Разложим граничное условие в ряд Фурье:

$$f(\varphi) = \frac{a_0}{2} + \sum (a_n \cos n\varphi + b_n \sin n\varphi).$$

Перейдя к полярным координатам, запишем гармоническое продолжение на круг функций $\cos n\varphi, \sin n\varphi$:

$$\left(\frac{r}{R}\right)^n \cos n\alpha, \quad \left(\frac{r}{R}\right)^n \sin n\alpha.$$

В итоге получим решение в виде ряда:

$$u(r, \alpha) = \frac{a_0}{2} + \sum \left(a_n \left(\frac{r}{R}\right)^n \cos n\alpha + b_n \left(\frac{r}{R}\right)^n \sin n\alpha \right). \quad (*)$$

Наша цель — представить его в интегральной форме. Коэффициенты Фурье равны

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\beta) \cos n\beta d\beta,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\beta) \sin n\beta d\beta,$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\beta) d\beta.$$

Подставим все в (*), получим:

$$u(r, \alpha) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\beta) \left[\sum \left(\frac{r}{R} \right)^n \cos n(\alpha - \beta) + \frac{1}{2} \right] d\beta,$$

где

$$z = (r, \alpha), \quad \left(\frac{r}{R} \right)^n \cos n(\alpha - \beta) = \operatorname{Re} \left(\frac{z}{t} \right)^n, \quad t = Re^{i\beta}.$$

Просуммируем геометрическую прогрессию:

$$\left(1 + \frac{z}{t} + \left(\frac{z}{t} \right)^2 + \dots \right) - \frac{1}{2} = \frac{1}{1 - \frac{z}{t}} - \frac{1}{2} = \frac{t}{t-z} - \frac{1}{2},$$

получим

$$u(r, \alpha) = \int_0^{2\pi} f(\varphi) \operatorname{Re} \left(\frac{t+z}{t-z} \right) d\varphi.$$

$$\text{Преобразуем ядро: } \frac{t+z}{t-z} = \frac{(t+z)\overline{(t-z)}}{(t-z)(\bar{t}-\bar{z})}.$$

Вещественная часть чисителя есть $t\bar{t} - z\bar{z} = R^2 - r^2$, так как оставшееся выражение $t\bar{z} - \bar{z}t$ чисто мнимое.

Знаменатель $|t-z|^2 = R^2 + r^2 - 2Rr \cos(\alpha - \beta)$.

Получим ядро Пуассона

$$\frac{R^2 - r^2}{R^2 + r^2 - 2Rr \cos(\alpha - \beta)}.$$

В итоге

$$u(r, \alpha) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \frac{R^2 - r^2}{R^2 + r^2 - 2Rr \cos(\alpha - \beta)} f(\beta) d\beta.$$

Задача. Докажите, что этот интеграл получится при конформном преобразовании решения, полученного нами ниже для полуплоскости (второй способ).

По теореме Римана любую односвязную ограниченную область можно конформно отобразить на круг, а значит, можно получить решение задачи Дирихле в произвольной такой области при помощи ядра Пуассона, если конформное отображение известно.

Схема второго способа.

Задача. Пусть u — решение задачи Дирихле в области D_1 , пусть $f: D_1 \rightarrow D_2$ — конформное отображение областей. Постройте решение задачи Дирихле в области D_2 . Попробуйте убедиться в пригодности построенного решения без вычисления оператора Лапласа.

Мы знаем, что круг можно конформно отобразить на полуплоскость. Попробуем для полуплоскости решить задачу Дирихле: $\Delta u = 0$, $u(x, 0) = g(x)$.




Рис. 8.5. Граничное условие задачи Дирихле в полуплоскости

Заметим сначала, что для простого граничного условия, изображенного на рис. 8.5 решение представляется функцией $\frac{1}{\pi} \varphi_a(x, y)$, где

$$\varphi_a(x, y) = \operatorname{Im} \ln(z - a) = \arctg \frac{y}{x - a}.$$

Действительно, эта функция гармоническая на полуплоскости и удовлетворяет граничному условию рис. 8.5. Теперь рассмотрим функцию «угол»:

$$F_{ab}(x, y) = \frac{1}{\pi} (\varphi_b(x, y) - \varphi_a(x, y))$$

(см. рис. 8.6); она гармоническая на полуплоскости и удовлетворяет краевому условию $g(x) = 1$ при $a < x < b$ и $g(x) = 0$ при $x < a$ и $x > b$.




Рис. 8.6. Функция «угол»




Рис. 8.7. Аппроксимация кусочно-постоянным краевым условием

Произвольное (скажем, непрерывное и равное 0 вне конечного отрезка) граничное условие $g(x)$ на прямой приблизим кусочно-постоянной функцией, рис. 8.7, соответствующая гармоническая функция $\sum \frac{F_{ab}g(a)(x-a)}{b-a}$.



Рис. 8.8. Линии уровня функции F_{ab} 

Рис. 8.9. Линии уровня ядра

Перейдем к пределу при измельчении разбиения, получим гармоническую функцию с граничным условием $g(x)$, записанную в виде такой интегральной формулы:

$$\int \lim_{b \rightarrow a} \frac{F_{ab}(x, y)}{b - a} g(a) da$$

Функция $\lim_{b \rightarrow a} \frac{F_{ab}(x, y)}{b - a}$ в этом интеграле называется ядром. Изучим ее линии уровня. Картина линий уровня функции $F_{ab}(x, y)$ изображена на рис. 8.8, конформное отображение, оставляющее на месте 0 и переводящее a в ∞ , переводит эту картину в простую картину линий уровня угла. При делении на длину отрезка и переходе к пределу картина линий уровня получится, как на рис. 8.9.

Понятно, что при этом дадут вычисления: производная по параметру a от функции $\frac{1}{\pi} \operatorname{arctg} \frac{y}{x-a}$ есть

$$\begin{aligned} \frac{d}{da} \left(\frac{1}{\pi} \operatorname{arctg} \frac{y}{x-a} \right) &= \\ &= \frac{1}{\pi} \frac{1}{1 + (\frac{y}{x-a})^2} \frac{y}{(x-a)^2} = \frac{1}{\pi} \frac{y}{(x-a)^2 + y^2} \end{aligned}$$

Окончательно,

$$u = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{y}{(x-a)^2 + y^2} g(a) da.$$




Рис. 8.10. Диполь

Картина линий уровня ядра, рис. 8.10, хорошо нам известна из физики — это картина экви-потенциальных линий так называемого диполя (силовые линии диполя, ортогональные эквипотенциальным, образуют такую же картину).

ТЕОРЕМА О СРЕДНЕМ В МНОГОМЕРНОМ СЛУЧАЕ

Принцип максимума в многомерном случае. Приведем геометрическое объяснение того факта, что у гармонической функции не может быть строгих внутренних максимумов. Гармоническая функция минимизирует интеграл Дирихле $\int_D (\nabla u)^2 dx$.




Рис. 8.11. Неминимизирующая интеграл Дирихле функция

Если бы был строгий внутренний максимум, график в его окрестности имел бы вид колокола, рис. 8.11. Срезав горб горизонтальной плоскостью, мы получили бы функцию с меньшим интегралом Дирихле. Так что функция с внутренним экстремумом не может минимизировать этот интеграл. Правда, это рассуждение не охватывает функции с нестрогими максимумами, как на рис. 8.12. Все же мы

доказали, что функция, равная 0 на границе ограниченной области и минимизирующая интеграл Дирихле, тождественно равна 0 в области.




Рис. 8.12. Нестрогий максимум

Принцип максимума в полном объеме вытекает из многомерной теоремы о среднем.

Доказательство теоремы о среднем. Рассмотрим на сфере в \mathbb{R}^m радиуса R с центром 0 элемент Ω_{m-1} телесного угла, т. е.

проекцию элемента площади на сферу с тем же центром радиуса 1, рис. 8.13. Положим $f(R) = \int_{|x|=R} u(x) \Omega_{m-1}$. Тогда

$$f'(R) = \int_{|x|=R} \frac{\partial u}{\partial n} \Omega_{m-1} = \int_{|x|=R} (\nabla u, n) d\Omega_{m-1},$$




Рис. 8.13. К теореме о среднем

это есть поток градиента u через сферу, поделенный на R^{m-1} . Но если u гармоническая, то этот поток равен 0. Итак, $f'(R) = 0$,

$f(r) = \text{const}$. Но если радиус R мал, то очевидно, что указанный интеграл примерно равен $u(0)$. Значит, $f(R) = u(0)$, что и требовалось.

Следствие. $u(0) = \frac{1}{V_R} \int_{|x| \leq R} u(x) dx$, где V_R — объем шара радиуса R .

Действительно, чтобы проинтегрировать по шару, можно интегрировать по сфере фиксированного радиуса, а потом по радиусу.

Следствие. Для гармонической функции в n -мерном случае верен принцип максимума.

Следствие. Решение задачи Дирихле в n -мерном случае единствено.

ЗАМЕЧАНИЯ

1. При выводе формулы Пуассона мы не проверяли сходимости до границы. Конечно, наши рассуждения показывают, что если существует формула для решения задачи Дирихле, то она должна иметь вид:

$$u(r, \alpha) = \frac{1}{\pi} \int_a^{2\pi} \frac{R^2 - r^2}{R^2 + r^2 - 2Rr \cos(\alpha - \beta)} f(\beta) d\beta. \quad (**)$$

Надо все же аккуратно проверить, что для всякой непрерывной функции f функция u , определенная формулой $(**)$, действительно решает задачу Дирихле. Попробуйте сделать нужные оценки самостоятельно. (Если это вызовет затруднения, соответствующие рассуждения можно найти в учебнике А. Картана «Элементарная теория аналитических функций одного и нескольких комплексных переменных» на с. 168–170.)

2. Разумеется, второй вывод формулы Пуассона (для полуплоскости) имеет тот же недочет, что и первый — мы объясняем, как написать ядро Пуассона, но не проверяем, что полученное решение годится для любой непрерывной функции на границе.

3. При втором выводе формулы Пуассона мы сначала решаем задачу Дирихле для очень простых, но все же разрывных начальных данных. Найденные нами решения (связанные с функцией «угол») ограничены. Только для ограниченных решений можно гарантировать единственность решения задачи Дирихле с разрывными граничными дан-

ными, но этой теоремы мы не формулировали и не доказывали. Все это подчеркивает эвристичность нашего вывода формулы Пуассона.

4. Вот пример неединственности решения задачи Дирихле для разрывных начальных данных. Рассмотрим задачу Дирихле в полуплоскости $y \geq 0$ с начальным условием $u(x, 0) \equiv 0$. Допускаются решения, разрывные в точке ∞ . Рассмотрим любую целую функцию $f(r)$, вещественную на вещественной оси (например, $f(z) = z$, или $f(z) = \exp(z)$ и т. п.) Тогда функция $u = \operatorname{Im} f(z)$ дает решения нашей задачи. Отметим, что все эти решения, за исключением $u \equiv 0$, неограничены. Докажите это, используя теорию аналитических функций.

Докажите и более общий факт: две ограниченные функции, имеющие конечное число точек разрыва в замкнутом круге, гармоничные внутри круга и совпадающие на границе, тождественно совпадают в точках непрерывности.

Лекция 9

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ОПЕРАТОРА ЛАПЛАСА. ПОТЕНЦИАЛЫ

Взаимодействие математики и физики идет подчас странными путями. Дирак, один из крупнейших физиков 20-го века, так сформулировал стратегию теоретической физики: «Приступая к созданию физической теории, необходимо отбросить все предшествующие физические модели, а также основанную на них «физическую интуицию», которая есть не что иное, как набор предвзятых точек зрения». Надо, говорит Дирак, просто выбрать красивую математическую теорию и последовательно находить физические интерпретации ее следствиям, не боясь противоречия с предшествующими теориями.

«I learnt to distrust all physical concepts as the basis for a theory. Instead one should put one's trust in a mathematical scheme even if the scheme does not appear at first sight to be connected with physics. One should concentrate on getting an interesting mathematics.»

P. M. Dirac

(цитирую по книге P. Massani «N. Wiener», Birkhäuser 1990, с. 6).

Как это ни удивительно, весь опыт теоретической физики 20-го века (в отличие от физики 19-го века) подтверждает правоту Дирака. Замечено, что каждая новая физическая теория опровергает все предшествующие. А математические модели сохраняются.

Но сегодня мы займемся математической теорией, которая, наоборот, долго не признавалась математиками, хотя физики давно ею свободно пользовались — теорией так называемых обобщенных функций. Наиболее важным примером обобщенной функции является δ -функция Дирака. Мы рассмотрим ее сначала на прямой, затем в \mathbb{R}^n ; ее можно было бы определить на любом многообразии. Это — математический аналог таких физических понятий, как точечный заряд и материальная точка.

Физическое «определение», против которого восстают ортодоксальные математики, такое: δ -функция равна 0 всюду, кроме нуля,

в нуле равна бесконечности, а интеграл от нее по всей прямой равен 1. Физики прекрасно умеют работать с такими определениями, математически явно бессмысленными.

Мы примем следующее определение, которое просто в применении, позволяет легко выяснить физический смысл и не такое нудное, как в «правильной математической теории обобщенных функций».

Наша δ -функция переменной x обозначается $\delta(x)$ и сосредоточена в нуле. Пусть $\delta(x)$ фигурирует в некоторой формуле. Это значит, что надо в эту формулу вместо $\delta(x)$ подставить δ -образную функцию $\delta_\varepsilon(x)$, а затем перейти к пределу при $\varepsilon \rightarrow 0$.

δ -образная функция — это обычная гладкая функция со следующими свойствами:

- 1) Интеграл от нее по всей прямой равен 1.
- 2) Она неотрицательна.
- 3) Она сосредоточена в интервале $(-\varepsilon, \varepsilon)$, т. е. вне его равна нулю.

(Последние два условия можно ослабить.)

Типичный вид графика δ -образной функции показан на рис. 9.1.




Рис. 9.1. δ -образная функция

При переходе к пределу δ -образную функцию можно фиксировать (ε входит в формулу как параметр), а можно и не фиксировать, лишь бы семейство функций $\delta_\varepsilon(x)$ удовлетворяло условиям 1–3.


ПРИМЕРЫ И СВОЙСТВА

$$1. \int \delta(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int \delta_\varepsilon(x) dx = 1.$$

$$2. \delta(x) = 0 \text{ при } x \neq 0, \text{ так как } \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \delta_\varepsilon(x) = 0 \text{ при } x \neq 0.$$

$$3. \text{Вычислим } \int f(x)\delta(x) dx, \text{ где } f(x) \text{ — непрерывная функция.}$$

Основной вклад в интеграл $\int f(x)\delta_\varepsilon(x) dx$ дается выражением $\int f(0)\delta_\varepsilon(x) dx$, рис. 9.2, оно стремится к $f(0)$ при $\varepsilon \rightarrow 0$; разность

Рис. 9.2. К вычислению свертки с δ -функцией

между ним и всем интегралом тоже стремится к 0 при $\varepsilon \rightarrow 0$ (это упражнение). В итоге $\int f(x)\delta(x) dx = f(0)$.

4. Аналогично $\int f(y)\delta(x - y) dy = f(x)$.

Рассуждение то же самое, с учетом того, что $\delta_\varepsilon(x - y)$ — сдвиг функции $\delta_\varepsilon(x)$ из окрестности нуля в окрестность точки y , рис. 9.2.

Формула примера 4 имеет еще и следующую замечательную интерпретацию: произвольная функция f есть непрерывная линейная комбинация сдвинутых δ -функций $\delta(\cdot - y)$, сосредоточенных в точках y с коэффициентами $f(y)$, так что δ -функции $\delta(\cdot - y)$ образуют «континуальный базис» в пространстве функций на прямой. Полезно также понимать $\delta(\cdot - y)$ как плотность единичной точечной массы или заряда, сосредоточенного в точке y .

5. Однородность.

Определение. Функция f называется *однородной степени d* , если $f(\lambda x) = \lambda^d f(x)$ при любом положительном λ .

Выясним, однородна ли δ -функция и какой степени. Для примера найдем $\delta(2x)$. Подставим $2x$ вместо x в функцию $\delta_\varepsilon(x)$. Интеграл уменьшится в 2 раза. Перейдя к пределу, получим: $\delta(2x) = \frac{1}{2}\delta(x)$. Аналогичное рассуждение для любого множителя. Итак, функция $\delta(x)$ однородная степени -1 , так же как функция $1/x$. Это сходство неслучайно, в некотором смысле эти функции родственные, правда, только в одномерном случае.

В n -мерном случае функция $\delta(x)$ — однородная степени $-n$. В этом можно убедиться еще и так: $\delta(x_1, \dots, x_n) = \delta(x_1) \cdots \delta(x_n)$, поскольку соответствующее произведение δ -образных функций дает δ -образную функцию в n -мерном пространстве. Так как сомножители однородны степени -1 , произведение, очевидно, однородно степени $-n$.

Отступление. Принцип суперпозиции

Хотя этот принцип является основой всей так называемой линейной физики, по существу это простой факт из линейной алгебры.

Рассмотрим линейный оператор $L: V \rightarrow W$, отображающий одно линейное пространство в другое. Рассмотрим неоднородное линейное уравнение $Lu = f$. Уравнение разрешимо тогда и только тогда, когда $f \in \text{Im } L$, где $\text{Im } L$ — образ L — подпространство пространства W . Решения образуют аффинное подпространство в V , параллельное $\text{Ker } L$, где $\text{Ker } L$ — ядро L — подпространство пространства V . А именно, пусть u_u — какое-то решение неоднородного уравнения; тогда его общее решение представляется в виде $u = u_u + u_o$, где u_o — общее решение однородного уравнения $Lu = 0$, рис. 9.3.




Рис. 9.3. Решения линейного неоднородного уравнения

Теперь сформулируем собственно принцип суперпозиции. Пусть u_1, u_2 — решения соответственно уравнений $Lu = f_1$, $Lu = f_2$. Тогда $\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2$ — решение уравнения $Lu = \alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2$; здесь α_1, α_2 — произвольные постоянные.

Физически: бросим в воду один камень, получим некоторую картину волн; бросим другой камень, получим другую картину волн. Бросим оба камня вместе. Тогда полученная картина волн такая же, как если бы мы сложили возмущения от бросания первого камня с возмущениями, происшедшими от бросания второго.

Доказательства всех вышеперечисленных утверждений очевидны в силу линейности оператора.

Теперь соединим принцип суперпозиции с возможностью разложения любой функции в суперпозицию δ -функций. Получим следующее. Если мы хотим решить линейное дифференциальное уравнение, в правой части которого стоит произвольная функция f , то достаточно научиться решать это уравнение, где в правой части стоит δ -функция, а

затем применить принцип суперпозиции. Только вместо сумм придется писать интегралы.

Применим эти соображения к уравнению Пуассона $\Delta u = f$. Сначала надо решить уравнение $\Delta u = \delta(x)$. Конечно, решение этого уравнения не единствено. Действительно, ядро оператора Δ состоит из гармонических функций, так что к решению можно добавлять произвольную гармоническую функцию.

Из всех решений уравнения $\Delta u = \delta(x)$ можно выделить одно замечательное, называемое *фундаментальным*. Покажем, на каких основаниях можно его выделить.

Оператор Лапласа инвариантен относительно евклидовой группы движений (вращений и сдвигов). Действительно, лапласиан — это дивергенция градиента, а значит, он определяется только евклидовой структурой. С другой стороны, δ -функция также сферически симметрична. Поэтому при повороте вокруг начала координат из решения уравнения $\Delta u = \delta$ получится снова решение этого уравнения. Среднее арифметическое двух решений тоже является решением. Вообще решением является любая линейная комбинация нескольких решений, у которых сумма коэффициентов равна единице. Поэтому можно провести усреднение решения по группе всех вращений вокруг начала координат, которая является компактной.

Например, при $n = 2$ группа $SO(2)$ поворотов плоскости изоморфна окружности S^1 , усредняющая мера равна $\frac{1}{2\pi}d\varphi$.

При $n = 3$ группа вращений $SO(3)$ изоморфна вещественному трехмерному проективному пространству \mathbb{RP}^3 . Она двулистно накрывается трехмерной сферой (группой единичных кватернионов), которая в свою очередь изоморфна специальной унитарной группе $SU(2)$, называемой также спиновой группой порядка 3, см. ниже диаграмму:

$$\begin{array}{c} S^3 \cong SU(2) = \text{Spin } 3 \\ \downarrow \\ SO(3) \cong \mathbb{RP}^3 \end{array}$$

Метрику на $SO(3)$ можно, в частности, перенести с S^3 при двулистном накрытии. Метрика эта инвариантна относительно вращений, значит, есть и мера, по которой можно провести усреднение.

После усреднения получим решение, инвариантное относительно вращений. Иными словами, значение решения $u(x)$ зависит лишь от расстояния точки x от начала координат. Для таких функций оператор Δ превращается в обычновенный линейный дифференциальный оператор второго порядка. Поэтому уравнение для u имеет при $r > 0$ вид: $u'' + A(r)u' + B(r)u = 0$ (здесь в правой части 0, поскольку при $r > 0$ δ -функция обращается в 0).

Коэффициенты A, B можно вычислить явно, не поленившись перейти в операторе Лапласа к полярным координатам, но можно обойтись и без вычислений. Во-первых, мы знаем очевидное решение $u \equiv 1$. Поэтому $B \equiv 0$. Значит, оператор имеет вид $u'' + A(r)u'$.

Теперь применим соображения однородности. Оператор Лапласа переводит однородные функции в однородные, причем степень понижается на 2. Так как функция $\delta(x)$ однородная степени $-n$, то однородное решение u уравнения $\Delta u = \delta$ должно быть однородным степени $2-n$. Следовательно, такое решение пропорционально $1/r^{n-2}$, в частности, при $n = 3$ оно пропорционально $1/r$. (Заметим, что при $n = 2$ эта формула не работает — однородного непостоянного решения в этом случае не существует.)

Вычислим оператор Лапласа: $\Delta \left(\frac{1}{r^{n-2}} \right) = \operatorname{div} \operatorname{grad} \left(\frac{1}{r^{n-2}} \right)$.

Градиент нашей однородной функции есть векторное поле, направленное к центру по радиусам, его длина равна модулю производной по r :

$$(r^{2-n})' = (2-n)r^{1-n} = \frac{2-n}{r^{n-1}}.$$

(Для проверки: при $n = 3$ градиент потенциала $1/r$ есть ньютона сила, обратно пропорциональная r^2 .)

Для вычисления дивергенции заметим, что она инвариантна относительно вращений. Вычислим поток найденного градиентного поля через две концентрические сферы, рис. 9.4.




Рис. 9.4. Вычисление $\operatorname{div} \operatorname{grad} r^{2-n}$

Поток через сферу равен величине поля, умноженной на поверхность сферы, поверхность сферы радиуса R равна $\omega_{n-1}R^{n-1}$, где ω_{n-1} — поверхность сферы единичного радиуса (4π при $n = 3$, 2π при $n = 2$). В итоге поток равен $(2-n)\omega_{n-1}$, в частности, при $n = 3$ это -4π .

Наше поле, таким образом, обладает замечательным свойством «ненесжимаемости»: его поток через любую сферу с центром в 0 одинаков. Этим условием сферически симметричное поле определяется однозначно (с точностью до умножения на постоянную). Например, в трехмерном пространстве таким свойством ненесжимаемости обладает только Ньютоново поле. На плоскости тоже существует $O(2)$ -инвариантное ненесжимаемое поле: длина вектора поля обратно пропорциональна первой степени расстояния до центра. Это поле градиентное, но его потенциал — не однородная функция, а $\ln \frac{1}{r}$. Мы приходим к удивительной формуле $\frac{1}{r^0} \sim \ln \frac{1}{r}$.

Замечание. Эту формулу, а с ней и фундаментальное решение уравнения $\Delta u = \delta$ на плоскости, можно было бы угадать, рассматривая размерность плоскости $n = 2$ как предел размерностей $n = 2 + \varepsilon$:

$$\frac{1}{r^{n-2}} = \frac{1}{r^\varepsilon} = \exp\left(\varepsilon \ln \frac{1}{r}\right) = 1 + \varepsilon \ln \frac{1}{r} + O(\varepsilon^2).$$

Вернемся к вычислению дивергенции. Суммарный поток поля через границу слоя между концентрическими сферами нулевой. Но этот поток есть интеграл от дивергенции по слою. Итак,

$$\int_{r_1}^{r_2} r^{n-1} \operatorname{div} \operatorname{grad}(r^{2-n}) dr = 0$$

при любых r_1, r_2 , значит и сама дивергенция равна 0. Окончательно,

$$\Delta \left(\frac{1}{r^{n-2}} \right) = \operatorname{div} \operatorname{grad} \left(\frac{1}{r^{n-2}} \right) = 0$$

при $r > 0$. А тогда можно найти и коэффициент $A(r)$ — вот мы и избежали длинной замены переменных.

Утверждение. Во всем пространстве $\Delta \left(\frac{1}{r^{n-2}} \right) \neq 0$.

Действительно, рассмотрим поток поля градиента через сферу с центром 0, он равен $(2 - n)\omega_{n-1}$. Более того, сферу можно заменить границей произвольной области. Если эта область содержит 0, то интеграл по этой области от дивергенции поля равен $(2 - n)\omega_{n-1}$, а если




Рис. 9.5. Фундаментальное решение оператора Лапласа при $n = 1$

не содержит, то интеграл равен нулю. Но это означает по самому определению δ -функции, что дивергенция поля равна

$$(2 - n)\omega_{n-1}\delta(x).$$

Например, при $n = 3$ имеем $\Delta\left(\frac{1}{r}\right) = -4\pi\delta(x)$ и т. д.

Конечно, этот результат можно проверить и при помощи δ -образных функций. Но мы видим, насколько все становится проще, если работать прямо с идеальным предельным объектом — с самой δ -функцией.

При $n = 2$ в качестве фундаментального решения (потенциала) подходит функция $\ln(1/r)$. Действительно, производная по r от нее равна $-1/r$, а дальше проходят все наши рассуждения.

Заметим, что на уровне полей результат общий во всех размерностях: поле обратно пропорционально r^{n-1} . Случай $n = 1$ тоже включается в общую картину: фундаментальным решением оператора $\frac{d^2}{dx^2}$ является функция $|tx|$ с подходящим t , поле по абсолютной величине пропорционально $\frac{1}{r^{1-1}}$, т. е. постоянно, рис. 9.5.

Мы видим, что $t = 1/2$, так что фундаментальное решение есть $|x|/2$. Интересно, что случай $n = 1$ укладывается в общую картину и на уровне коэффициентов. А именно, общая формула для фундаментального решения:

$$u_0 = \frac{1}{(2 - n)\omega_{n-1}r^{n-2}}$$

при $n = 1$ превращается в $\frac{r}{\omega_0} = \frac{r}{2}$. Действительно, поверхность ω_0 (нульмерный объем) нульмерной сферы S^0 , состоящей из двух точек, равна 2.

Итак, общая формула для фундаментального решения верна во всех размерностях, кроме 2, где возникает логарифм: $u_0 = -\frac{1}{2\pi}\ln\frac{1}{r}$.




Рис. 9.6. Прямая создает в каждой ортогональной плоскости такое же поле зарядов, какое точечный заряд создает на плоскости

Замечание. Появление здесь логарифма имеет свои глубокие причины: логарифм относится к так называемым присоединенным однородным функциям. Логарифм присоединяется к степенным функциям совершенно таким же образом, как присоединенные векторы присоединяются к собственным в теории жордановых клеток. Вы уже сталкивались с этим явлением в теории резонансов при решении линейных однородных уравнений с постоянными коэффициентами: когда собственные числа становятся кратными, к экспонентам присоединяются квазимногочлены.

Физический смысл фундаментального решения — потенциал единичного точечного заряда в точке 0. Градиент этого потенциала есть поле, созданное этим зарядом.

Физически интересно рассматривать поля при $n = 3$. Но и поля в меньших размерностях можно получить из трехмерных картин, обладающих подходящей симметрией.

Рассмотрим, например, равномерно заряженную прямую в \mathbb{R}^3 . Найдем силу, созданную этим зарядом в данной точке как равнодействующую сил точечных зарядов, размазанных по прямой. Результат будет такой же, как при рассмотрении плоскости, проходящей через нашу точку перпендикулярно заряженной прямой, причем весь заряд прямой надо поместить в 0, рис. 9.6.

Предостережение: складывать нужно именно силы, а не потенциалы, так как соответствующий интеграл для потенциалов расходится. Мы получаем еще одну замечательную и удивительную формулу

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dz}{\sqrt{r^2 + z^2}} \sim 2 \ln \frac{1}{r} + \text{const}$$

(чему равна константа, спрашивать запрещается!).

Аналогично, если заряд равномерно распределен на плоскости, то на каждой ортогональной прямой получим такую же картину сил, какую создает точечный заряд при $n = 1$.

Аналогичный спуск можно проводить, начиная с любой размерности.

Теперь рассмотрим непрерывную функцию $f(x)$, заданную в ограниченной области Ω . Решение u уравнения Пуассона $\Delta u = f$ можно найти по принципу суперпозиции, представляя f в виде суперпозиции сдвигов δ -функции. Пусть u_0 — фундаментальное решение, т. е. $\Delta u_0(x) = \delta(x)$. Иными словами, $u_0(x)$ — потенциал, созданный в точке x единичным зарядом, помещенным в нуле. Если заряд величины $f(y)$ находится в точке y , то в точке x он создаст потенциал $f(y)u_0(x - y)$.

Суперпозиция всех этих полей — поле с потенциалом, заданным формулой

$$u(x) = \int_{\Omega} f(y)u_0(x - y) dy.$$

Эта функция называется *интегралом Пуассона*. По принципу суперпозиции

$$\Delta u(x) = \int_{\Omega} f(y)\delta(x - y) dy = f(x).$$

Поэтому $u(x)$ — решение уравнения Пуассона.

Теорема. Пусть непрерывная функция $f(x)$ сосредоточена в ограниченной области Ω . Тогда существует решение уравнения Пуассона $\Delta u = f$, которое дается формулой:

$$u(x) = \int_{\Omega} f(y)u_0(x - y) dy,$$

где u_0 — фундаментальное решение оператора Лапласа.

Когда явная формула для решения написана, выполнение уравнения можно проверить непосредственно, не прибегая к δ -функциям.

Упражнение. Докажите теорему непосредственно.

Решение не единствено, к нему можно добавить любую гармоническую функцию. Единственное решение можно выделить, наложив условие на бесконечности.

При $n > 2$ фундаментальное решение на бесконечности обращается в 0, а значит обращается в 0 и весь интеграл Пуассона. Этим условием решение выделяется однозначно. Действительно, разность двух таких решений была бы гармонической функцией, обращающейся в нуль на бесконечности. По принципу максимума она тождественно равна нулю.

При $n = 2$ единственное с точностью до аддитивной постоянной решение выделяется условием $|u(x)| \leq C \ln |x|$.

Теперь рассмотрим заряды, сосредоточенные только на границе $\partial\Omega$ области Ω . Обозначим поверхностную плотность зарядов в точке y границы через $f(y)$. Положим

$$u(x) = \int_{\partial\Omega} f(y) u_0(x - y) dy.$$

Эта функция гармонична всюду вне границы области Ω и обращается в 0 на бесконечности (при $n = 2$ $|u|$ на бесконечности растет не быстрее логарифма).

Что происходит в точках самой границы? Рассмотрим элемент dS границы. Построим вдоль нормали цилиндр над dS с малой высотой ε , рис. 9.7.

Рассмотрим поток градиента функции u через границу построенной области G . Естественно ожидать, что поток через боковую поверхность мал вместе с ε , так как эта боковая поверхность имеет малую площадь (оставим это пока без доказательства). Вычислим сначала суммарный поток:

$$\int_{\partial G} \frac{\partial u}{\partial n} d\sigma = \int_{\partial G} (n, \nabla u) d\sigma = \int_G \Delta u dx = \int_{(\partial\Omega) \cap G} f dS$$

(второе равенство — на основании формулы Стокса, третье учитывает заряды, попавшие в G). С другой стороны, поток через основания равен $\left(\frac{\partial u}{\partial n_+} + \frac{\partial u}{\partial n_-} \right) dS$ с точностью до малой по сравнению с dS поправки. Пренебрегая малым при малых ε потоком через боковую поверхность,




Рис. 9.7. Поле, созданное простым слоем




Рис. 9.8. Потенциал равномерно заряженной сферы

мы приходим к выводу, что в каждой точке $\partial\Omega$ имеет место равенство:

$$\frac{\partial u}{\partial n_+} + \frac{\partial u}{\partial n_-} = f.$$

Сумма в левой части — скачок нормальной производной, если считать, что нормаль ориентирована в одну сторону. Итак, функция $u(x)$ гармоническая внутри и вне поверхности, скачок ее нормальной производной равен плотности распределенного по поверхности заряда. Эта функция называется *потенциалом простого слоя* — заряды распределены по поверхности в один слой.

Пример 1. Вычислим потенциал сферы с постоянной плотностью заряда. С точностью до множителя получим $u(x) = \int_{|y|=R} \frac{dy}{|x-y|}$, рис. 9.8.

Взять этот интеграл явным интегрированием на сфере можно, но не очень просто (Ньютона с этим справился).

Но можно найти ответ и без интегрирования, используя симметрию сферы. Мы заранее знаем, что $u = u(r)$ — функция гармоническая внутри и вне сферы. Значит можно искать решение в виде $a + b/r$ (константы могут быть разными внутри и вне области). Внутри сферы $b = 0$, иначе нарушится гармоничность в нуле. Значит, внутри сферы u постоянна и, в частности, равна своему значению в центре — $4\pi R$. Силовое поле внутри шара равно 0.

Кстати, Ньютона обнаружил это путем уравновешивания сил, рис. 9.9, его рассуждение верно также для эллипсоида, точнее, для бесконечно тонкого однородного слоя между гомотетичными эллипсоидами с общим центром, где соображения симметрии (зависимость потенциала только от радиуса) не проходят.




Рис. 9.9. Тяготение внутри сферы и эллипса отсутствует

центром, где соображения симметрии (зависимость потенциала только от радиуса) не проходят.

Задача. Докажите, что силы притяжения противоположными элементами слоя между концентрическими гомотетичными эллипсоидами противоположны.

Вернемся к нашей сфере и найдем константы a и b для внешней области. Снаружи $a = 0$ (потенциал на бесконечности нулевой). Коэффициент b представляет собой суммарный заряд и равен $4\pi R$. Можно также найти a из соображений непрерывности функции u в точках самой сферы при подходе изнутри и снаружи, поскольку интеграл равномерно сходится. График потенциала дан на рис. 9.8.

Пример 2. Пусть A — симметрический оператор в евклидовом пространстве, I — тождественный. Оператор $A - \lambda I$ определяет однопараметрическое семейство квадратичных форм $((A - \lambda I)x, x)$, называемое евклидовым пучком. Оператор $(A - \lambda I)^{-1}$ (резольвента) — тоже симметрический и определяет нелинейный пучок квадратичных форм $((A - \lambda I)^{-1}x, x)$ (двойственный евклидову в смысле проективной двойственности). Рассмотрим семейство квадрик $((A - \lambda I)^{-1}x, x) = 1$. Например, при $n = 2$ пучок имеет вид, как на рис. 9.10, все кривые здесь имеют одни и те же фокусы.

Уравнения квадрик пучка можно записать в собственном базисе оператора A в виде

$$\frac{x_1^2}{a_1 - \lambda} + \dots + \frac{x_n^2}{a_n - \lambda} = 1,$$

где a_1, \dots, a_n — собственные числа оператора A . Квадрики, соответствующие различным значениям λ , называются *конфокальными* друг другу.

Задача: Докажите, что через каждую точку n -мерного пространства проходят ровно n конфокальных друг другу квадрик пучка (соответствующих некоторым значениям $\lambda_1, \dots, \lambda_n$). Эти квадрики в каждой точке их пересечения попарно ортогональны.

Значения $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ называются *эллиптическими координатами* точки.




Рис. 9.10. Кривые пучка при $n = 2$




Рис. 9.11. Поверхности пучка при $n = 3$

При $n = 3$ через каждую точку пространства проходит эллипсоид, однополостный гиперболоид и двуполостный гиперболоид, рис. 9.11.

Задача. Рассмотрим какой-нибудь эллипсоид и бесконечно близкий концентрический гомотетичный эллипсоид. Рассмотрим потенциал, созданный равномерным распределением зарядов в слое между этими двумя эллипсоидами. Такой потенциал задается плотностью $\frac{dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n}{df}$, т. е.

$\frac{ds}{|\nabla f|}$, где ds — евклидова площадь,

а f — квадратичная форма, задающая эллипсоид. Она называется *гомеоидной* плотностью. Тогда:

1. Электростатистическое поле внутри эллипсоида равно нулю.
2. Снаружи силовые линии (фазовые линии векторного поля градиента потенциала) являются координатными линиями вышеописанных эллиптических координат.
3. Все поверхности уровня потенциала во внешней области являются эллипсоидами, конфокальными друг другу.

Напомню некоторые простые положения электростатики.

Потенциал установившегося распределения зарядов проводящей поверхности постоянен на ней. Действительно, если потенциал был бы не постоянен, то градиент потенциала (т. е. электростатическое поле) имел бы направленную вдоль поверхности компоненту, которая заставила бы заряды двигаться.

Определенное выше гомеоидное распределение — это распределение заряда на поверхности проводящего («металлического») заряженного эллипсоида.

Интересно, что плотность распределения заряда на проводящей поверхности больше там, где больше кривизна поверхности. Внутри же проводника не может быть зарядов установившегося распределения. Действительно, градиент потенциала установившегося распределения зарядов равен нулю внутри проводника (иначе заряды начали бы дви-

гаться). Значит, потенциал внутри проводника — константа и, следовательно, плотность зарядов там нулевая.

Точно так же потенциал гладкой проводящей поверхности, ограничивающей некоторую ограниченную область, постоянен в этой области, если нет зарядов.

Действительно, потенциал — гармонический внутри поверхности и постоянный на поверхности. Следовательно, по принципу максимума он постоянен и внутри области.

Попросту говоря, электростатическое поле не может проникнуть вовнутрь металлической полости («экранирование»). Аналогичные факты верны и в \mathbb{R}^n при любом n .

Задача 1. В точку на расстоянии r от центра незаряженной проводящей окружности радиуса R в \mathbb{R}^2 помещен единичный заряд. Найти образовавшееся электростатическое поле, его эквипотенциальные кривые и силовые линии.

Указание. Начните со случая $r = 0$.

Задача 2. Проведите вычисления плотности равновесного распределения зарядов для «заряженного» проводящего эллипса или квадрата в двумерной задаче; какова особенность распределения заряда у вершин?

ДОБАВЛЕНИЕ. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ПРОСТОГО СЛОЯ

Докажем, что электростатическое поле, созданное гладким распределением зарядов простого слоя на гладкой ограниченной поверхности, ограничено вплоть до границы.

Отсюда, в частности, следует, что поток через боковую поверхность цилиндра малой высоты ε (в построениях на с. 99) мал вместе с ε , чем мы пользовались при доказательстве формулы скачка нормальной производной потенциала простого слоя.

Рассмотрим семейство нормалей к поверхности слоя. Достаточно малая окрестность этой поверхности расслоена на отрезки нормалей. Достаточно доказать, что сила равномерно ограничена внутри такой r -окрестности (так как вне ее сила ограничена величиной $\rho S/r^2$, где ρ — максимальная плотность заряда, а S — площадь поверхности). Рассмотрим отрезок нормали, проведенный через точку P на поверхности. Введем в окрестности точки P декартовы координаты с началом в P : z по нормали к поверхности, \vec{x} в касательной плоскости. Если радиус r

окрестности точки P достаточно мал, то уравнение поверхности слоя в наших координатах записывается в виде: $z = h(\vec{x})$, $|h(\vec{x})| \leq C|\vec{x}|^2$.

Для доказательства ограниченности силы достаточно равномерно оценить только силу, созданную зарядами, находящимися в построенном шаре радиуса r (сила, созданная остальными зарядами, скажем, в $r/2$ -окрестности точки P не превосходит $4\rho S/r^2$).

Настоящую трудность вызывает оценка силы, созданной вблизи точки P зарядами из окрестности. Здесь ограниченность получается лишь за счет того, что противоположные части окрестности тянут в разные стороны.

Рассмотрим вначале частный случай, когда слой в нашем шаре — горизонтальная плоскость ($z = 0$) и плотность распределения зарядов постоянна.

В этом случае горизонтальные составляющие сил, созданных на оси z зарядами в противоположных точках \vec{x} , точно уравновешивают друг друга. Результирующая сила вертикальна и дается в точке Z интегралом (при плотности зарядов — единица):

$$F = \int_0^r \frac{Z 2\pi x dx}{(x^2 + Z^2)^{3/2}} = 2\pi \int_0^{r/Z} \frac{\xi d\xi}{(\xi^2 + 1)^{3/2}} = 2\pi \left(1 - \frac{Z}{\sqrt{r^2 + Z^2}} \right)$$

(для простоты Z считается положительным, при изменении знака Z сила меняет знак), где $x = |\vec{x}|$.

Во всяком случае сила ограничена величиной 2π (соответствующей, как мы уже знаем, полю равномерно заряженной плоскости).

Теперь заменим распределение зарядов вдоль поверхности $z = h(\vec{x})$ с плотностью $\rho(\vec{x})$ в области $x < r$ распределением постоянной плотности $\rho(0)$ в круге $x < r$ на плоскости $Z = 0$ (здесь Z — координата точки оси z , где мы хотим оценить величину поля).

Вертикальная составляющая силы в точке Z дается теперь интегралом от:

$$\frac{(Z + h(\vec{x})) \rho(\vec{x}) J(\vec{x}) x dx d\varphi}{(x^2 + (Z + h)^2)^{3/2}},$$

где ρ — плотность, J — якобиан, равный отношению элемента площади слоя над \vec{x} к элементу $x dx d\varphi$ площади на плоскости \vec{x} (с полярными координатами x, φ).

Величины ρ и J в нашей области ограничены. Кроме того, выражение в знаменателе:

$$x^2 + (Z + h)^2 = x^2 + Z^2 + 2Zh(\vec{x}) + h^2(\vec{x}) \geq \frac{1}{2}(x^2 + Z^2)$$

при достаточно малых r , так как $|Zh| \leq \frac{Z^2}{4} + h^2$ и $|h| \leq Cx^2$.

Поэтому все пропорциональное Z слагаемое в интеграле оценивается сверху константой так же, как в случае однородной плоскости.

Второе (пропорциональное h) слагаемое под интегралом ограничено (числитель меньше C_1x^3 , а знаменатель больше C_2x^3). Поэтому вся вертикальная составляющая ограничена. Горизонтальная составляющая, т. е. интеграл от $\frac{\vec{x}\rho(\vec{x})J(\vec{x})x dx d\varphi}{(x^2 + (Z + h(\vec{x}))^2)^{3/2}}$, оценивается сложнее.

Прежде всего можно сразу считать, что $\rho J \equiv 1$. Действительно, функции ρ и J гладкие, поэтому замена $\rho(\vec{x})J(\vec{x})$ на $\rho(0)J(0)$ меняет подынтегральное выражение на ограниченное слагаемое ($\leq C_3x^3$ в числителе, $\geq C_2x^3$ в знаменателе).

Остается сравнить интеграл при $\rho J = 1$ с таким же интегралом с $h = 0$ (равным, как мы уже знаем, нулю).

Лемма.

$$\left| \frac{1}{(x^2 + Z^2)^{3/2}} - \frac{1}{(x^2 + (Z + h)^2)^{3/2}} \right| \leq \frac{C_4}{x^2}.$$

Доказательство. Пусть $Z = \lambda x$, тогда левая часть равна

$$\frac{1}{x^3} \left| \frac{1}{(1 + \lambda^2)^{3/2}} - \frac{1}{(1 + (\lambda + \mu)^2)^{3/2}} \right|,$$

где $h = \mu x$, так что $|\mu| < Cx$.

Функция $\frac{1}{(1 + \lambda^2)^{3/2}}$ имеет ограниченную некоторой константой C_5 на всей прямой производную. По формуле конечных приращений

$$- \left| \frac{1}{(1 + \lambda^2)^{3/2}} - \frac{1}{(1 + (\lambda + \mu)^2)^{3/2}} \right| \leq C_5\mu.$$

Поскольку $|\mu| \leq Cx$, оцениваемая в лемме величина не превосходит окончательно

$$\left| \frac{C_5\mu}{x^3} \right| \leq \frac{C_5C}{x^2},$$

что и требовалось доказать.

Наконец, для интеграла, дающего горизонтальную составляющую силы при $J\rho = 1$, мы получаем оценку

$$\left| \int_0^r \int_0^{2\pi} \frac{\vec{x} \cdot x \, dx \, d\varphi}{(x^2 + (Z + h(\vec{x}))^2)^{3/2}} \right| \leqslant 2\pi \int_0^r \frac{x^2 C_4}{x^2} dx = 2\pi r C_4$$

(такой же интеграл с $h = 0$ равен нулю, а разность подынтегральных выражений при $h = 0$ и при любом h оценена величиной C_4/x^2 в лемме).

Замечание 3. Подобными же элементарными оценками можно доказать и непрерывность потенциала простого слоя во всем пространстве, и существование и непрерывность пределов его производных по внутренней и внешней нормалям, а не только формулу скачка нормальной производной, которой мы тут ограничились.

Замечание 4. При рассмотрении потенциалов очень полезно введенное Фарадеем соглашение, что «из каждой единицы заряда выходят 4π силовых линий электростатического поля» (что бы это ни означало). Предполагается, что линии начинаются в положительных зарядах (или на бесконечности), а кончаются в отрицательных (или на бесконечности).

В этом случае напряженность поля оказывается равной «плотности силовых линий». Например, для зарядов простого слоя половина из $\rho 4\pi dS$ силовых линий, выходящих из зарядов области dS , идут в одну, а половина — в другую сторону, откуда и получается формула скачка. Множитель 4π появляется тут из-за того, что в физике речь идет о потенциале единичного заряда вида $u = 1/r$, а мы определяли потенциал простого слоя как интеграл от сдвигов фундаментального решения $\Delta u = \delta$.

Лекция 10

ПОТЕНЦИАЛ ДВОЙНОГО СЛОЯ

Итак, мы нашли фундаментальное решение оператора Лапласа в \mathbb{R}^n :

при $n > 2$ $u_0 = \frac{1}{-(n-2)\omega_{n-1}r^{n-2}}$, где ω_{n-1} — поверхность единичной сферы в \mathbb{R}^n ;

при $n = 2$ $u_0 = -\frac{1}{2\pi} \ln \frac{1}{r}$;

при $n = 1$ $u_0 = \frac{|x|}{2}$.

Между прочим, знаки определяются условием $\Delta u_0 = \delta$ так: при сглаживании особенности вблизи нуля у сглаженной функции должна получиться положительная вторая производная. Коэффициент определяется из условия, что поток $\operatorname{grad} u$ через единичную сферу должен быть равен 1.

При помощи фундаментальных решений мы построили потенциалы: объемный, дающий решение уравнения Пуассона, а также простого слоя. Теперь займемся потенциалом двойного слоя.

Рассмотрим на гиперповерхности распределение зарядов в два слоя (один слой положительный, другой — отрицательный) с некоторой плотностью $\rho(x)$ (ρ — функция на гиперповерхности), рис. 10.1.

Здесь имеется в виду следующий предельный переход. Пусть l — расстояние между зарядами по нормали, проведенной к гиперповерхности в точке q ; заряды $+Q = \rho/l$ и $-Q = -\rho/l$ имеют величину порядка $1/l$; они создают некоторое поле. Мы вычисляем предел поля при $l \rightarrow 0$. Этот предел называется *полем диполя*, а его потенциал — *потенциалом диполя* или *дипольным потенциалом*. При переходе к пределу *дипольный момент* $\rho = Ql$ сохраняется. Направление, соединяющее




Рис. 10.1. Двойной слой на гиперповерхности

няющее бесконечно близкие заряды, составляющие диполь, называется *осью диполя*. Потенциал двойного слоя плотности ρ , распределенного на гиперповерхности, есть интеграл от дипольных потенциалов зарядов, расположенных на гиперповерхности, оси которых — нормали к гиперповерхности, причем дипольный момент в бесконечно малой области ds на гиперповерхности есть ρds .

Проведем вычисление потенциала диполя в терминах фундаментального решения u_0 :

$$\begin{aligned} u_0 \left(x - \left(q + n_q \frac{l}{2} \right) \right) \frac{\rho}{l} - u_0 \left(x - \left(q - n_q \frac{l}{2} \right) \right) \frac{\rho}{l} = \\ = \rho \frac{\partial u_0(x - q)}{\partial n_q} + o(1) \quad \text{при } l \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Здесь n_q — внешняя нормаль к гиперповерхности в точке q .

Мы нашли элемент потенциала двойного слоя, созданный диполем, расположенным в точке q , а в целом потенциал двойного слоя в точке x равен

$$u(x) = \int_{S^{n-1}} \rho(q) \frac{\partial u_0(x - q)}{\partial n_q} dq.$$

СВОЙСТВА ПОТЕНЦИАЛА ДВОЙНОГО СЛОЯ

1. Вместо нормированного условием $\Delta u_0 = \delta$ фундаментального решения обычно используется функция $u_0 = \frac{1}{r^{n-2}}$ (при $n > 2$) и $u_0 = \ln \frac{1}{r}$ при $n = 2$. Потенциал двойного слоя — гармоническая функция во внутренней и во внешней области, ограниченной поверхностью, поскольку это было верно до предельного перехода;

$$\Delta u|_{\mathbb{R}^n \setminus S^{n-1}} = 0.$$

Внутренних областей может даже быть несколько, если поверхность не связна.

Пример. Пусть $n = 2$, $\rho \equiv 1$ на связной замкнутой кривой. Тогда $u(x) = \text{const}$, причем константы разные вне кривой, внутри и на кривой.

Сейчас мы докажем этот удивительный факт. Проведем вначале вычисление потенциала диполя. Центр диполя можно считать началом

координат. Производная фундаментального решения по направлению любого вектора \vec{v} есть

$$L_v \ln \frac{1}{r} = -\frac{1}{r} L_v r = -\frac{|\vec{v}| \cos \varphi}{r}.$$

Действительно, $L_v r$ легко вычисляется для любой размерности:

$$L_v \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2} = \frac{2(x_1 v_1 + \dots + x_n v_n)}{2\sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}} = \frac{(\vec{v}, \vec{r})}{r} = v \cos \varphi,$$

см. рис. 10.2.

Производная фундаментального решения при любом $n > 2$ вычисляется аналогично:

$$L_v \frac{1}{r^{n-2}} = \frac{(2-n)(\vec{r}, \vec{v})}{r^n}.$$

Заметим, что на бесконечности потенциал отдельного заряда убывает, как $1/r^{n-2}$, а потенциал диполя — быстрее, как $1/r^{n-1}$. (Говорят, что положительный и отрицательный заряды «экранируют» друг друга.)

Нарисуем линии уровня потенциала диполя (для $n = 2$). Если направить ось x вдоль вектора \vec{v} , то получим функцию $\frac{x}{r^2} = \frac{x}{x^2 + y^2}$. Это очень важная гармоническая на плоскости без нуля функция. Она имеет особенность в нуле. Ее линии уровня — конические сечения, заданные уравнениями $x^2 + y^2 = cx$. Они образуют семейство окружностей, проходящих через начало координат и касающихся там друг друга. Эти окружности перпендикулярны оси диполя в его центре, рис. 10.3.




Рис. 10.2. Производная радиус-вектора по вектору v




Рис. 10.3. Линии уровня потенциала диполя




Рис. 10.4. Линии уровня потенциала пары противоположных зарядов

Задача. Нарисовать линии уровня потенциала пары разноименных зарядов одинаковой величины на плоскости.

Указание. Разность логарифмов двух чисел равна логарифму отношения этих чисел. Геометрическое место точек, отношение расстояний которых до двух данных точек постоянно (рис. 10.4), есть окружность (почему?). При слиянии зарядов ($l \rightarrow 0$) система окружностей (рис. 10.4) переходит в систему окружностей (рис. 10.3) с общей касательной в центре диполя.

В нашей системе координат линия уровня потенциала диполя — окружность — касается оси y . Если кривая, в точках которой мы исследуем потенциал диполя, перпендикулярна оси диполя и имеет в его центре конечную кривизну, то она имеет касание второго порядка со своей соприкасающейся окружностью, входящей в наше семейство линий уровня потенциала диполя. Поэтому предельное значение потенциала диполя при стремлении точки к центру диполя вдоль этой кривой, проходящей через центр диполя, вполне определено и равно значению потенциала диполя на соприкасающейся окружности, т. е. равно половине кривизны кривой.

Следствие. Подынтегральная функция интеграла, определяющего потенциал двойного слоя, ограниченная на тор $\{x \in S, q \in S\}$, продолжается по непрерывности даже на диагональ $x = q$ (где подынтегральная функция не определена).

Рассмотрим элемент кривой и угол, под которым он виден в данной точке x . Получится функция, гармоническая по x во всех точках, кроме точек этого элемента кривой, рис. 10.5.

Действительно, этот угол равен $\frac{ds \sin \varphi}{r} = ds \frac{x}{x^2 + y^2}$, где $x = r \sin \varphi$, $y = r \cos \varphi$.

Отсюда ясен геометрический смысл потенциала (диполя): это элемент угла, под которым виден из данной точки элемент кривой. При-

Рис. 10.5. Угол, под которым виден элемент кривой, — гармоническая функция



чем это справедливо в любой размерности: вклад окрестности ds гиперповерхности в интеграл, вычисляемый в данной точке x , есть элемент телесного угла, под которым элемент ds виден из точки x .

Задача. Докажите для любой размерности, что телесный угол, под которым виден элемент поверхности, — гармоническая функция.

Указание. Воспользуйтесь формулой производной фундаментального решения вдоль векторного поля.

Для $n = 2, 3$ потенциал диполя, определяемый как производная от $\ln \frac{1}{r}$ или $\frac{1}{r}$ соответственно, в точности совпадает с элементом телесного угла; в больших размерностях n появится коэффициент $n - 2$, если использовать $u_0 = \frac{1}{r^{n-2}}$. Равенство будет на самом деле с точностью до знака, зависящего от выбора ориентации гиперповерхности, по которой ведется интегрирование элемента угла. Гиперповерхность ориентируется как граница ориентированной «внутренней» области.

Если $\rho \equiv 1$, то при $n = 2$ после интегрирования элемента угла мы получаем «угол, под которым граничная кривая видна из точки x », точнее, при указанном выборе ориентации кривой потенциал равен $-2\pi \times$ (число оборотов вектора из точки x к точке кривой при обходе всей кривой). При $n = 3$ аналогично получим ориентированный полный телесный угол, под которым видна поверхность из точки x , рис. 10.6.

Это рассуждение заменило довольно длинные вычисления. При $n = 2$ получаем для потенциала двойного слоя плотности 1, распределенного вдоль связной замкнутой кривой, значение -2π во внутренней области, в наружной — 0, на самой кривой — $-\pi$, если в этой точке существует касательная.

При $n = 3$ получаем соответственно $-4\pi, 0, -2\pi$. Аналогично можно получить значения в любой размерности.




Рис. 10.6. Полный телесный угол




Рис. 10.7. Эквипотенциальные поверхности диполя при $n > 2$

Замечание. В n -мерном случае гиперповерхности уровня потенциала диполя задаются уравнением $\frac{\sin \varphi}{r^{n-1}} = \text{const.}$

Эквипотенциальные поверхности диполя имеют в его центре касательную гиперплоскость, перпендикулярную оси диполя, проходят через центр диполя, касаясь друг друга, но имеют в этой точке при $n > 2$ уплощение, рис. 10.7. При четных n эквипотенциальные поверхности аналитические, включая и центр диполя. При нечетных n эквипотенциальные поверхности имеют в центре диполя такую же особенность, как график функции $|x|^n$ от $n - 1$ переменной.

При $n > 2$ кривизна каждой эквипотенциальной поверхности диполя в его центре равна нулю.

Поверхность общего положения, касающаяся эквипотенциальных поверхностей в центре диполя, будет поэтому иметь при $n > 2$ общие точки со сколь угодно малыми эквипотенциальными гиперповерхностями диполя. Поэтому наш потенциал диполя на некоторых из них очень велик (по модулю). Значит, на поверхности общего положения, проходящей через центр диполя перпендикулярно его оси, потенциал элемента двойного слоя будет иметь особенность, обращаясь в бесконечность.

Из-за этого, вообще говоря, теория разрешимости краевых задач для уравнения Лапласа в многомерном случае не совсем аналогична обычно излагаемой в учебниках для $n = 2$ теории Фредгольма. А именно, при $n > 2$ не достаточна используемая в теории Фредгольма теория интегральных уравнений с непрерывным ядром. Правда, особенность достаточно слабая — суммируемая, поэтому можно применить теорию операторов с суммируемым ядром.

Пусть теперь плотность $\rho \neq \text{const.}$ Исследуем свойства потенциала двойного слоя.




Рис. 10.8. Скачок потенциала двойного слоя

1. Свойство гармоничности u во внутренней и во внешней областях сохраняется.

2. Легко найти разницу значений функции u на границе области и ее предельных значений при подходе к границе из внутренней области и из внешней области. Она такая же, как если бы плотность была постоянной. А именно ($n = 2$):

$$u_-(x_0) = u(x_0) - \pi\rho(x_0), \quad u_+(x_0) = u(x_0) + \pi\rho(x_0),$$

где $u_-(x_0)$ — предел изнутри, $u_+(x_0)$ — предел снаружи, рис. 10.8.

Для доказательства рассмотрим вспомогательный потенциал двойного слоя с постоянной плотностью $\rho = \text{const} \equiv \rho(x_0)$; для него это утверждение верно. Затем рассмотрим потенциал с плотностью $\rho - \rho(q)$, которая равна 0 в точке q , и докажем, что у него скачок нулевой. Вместо формального доказательства я объясню, почему это так. Если бы плотность была нулевой в целой окрестности точки q , то эта окрестность не создавала бы двойного слоя. Остальная часть поверхности создала бы в этой окрестности потенциал двойного слоя — гармоническую функцию без особенностей. Поэтому скачки в точке q обратились бы в нули. На самом деле плотность равна нулю не в окрестности, а только в самой точке q . Поэтому для доказательства исчезновения скачка нужно провести оценки, аналогичные приведенным в приложении к предыдущей лекции. Эти элементарные оценки показывают, что скачок потенциала равен 0. Достаточным условием для этого является непрерывность плотности в точке q .

3. Производная потенциала двойного слоя по нормали (нормаль ориентирована в одном и том же направлении как для точек внутренней области, так и для точек наружной) не имеет скачка.

В случае постоянной плотности это действительно верно — производная и снаружи, и внутри равна 0. В общем случае производная потенциала есть сила («напряженность» поля). Рассмотрим цилиндрическую область Ω , близкую к элементу ds поверхности, рис. 10.9. Вычи-




Рис. 10.9. К вычислению скачка нормальной производной потенциала двойного слоя

слим поток поля силы $\text{grad } u$ через границу этой области. Учитываем (как в предыдущей лекции) только нормальную компоненту:

$$ds \left(\frac{\partial u}{\partial n_+} - \frac{\partial u}{\partial n_-} \right).$$

По формуле Стокса поток равен

$$\int_{\partial\Omega} (\text{grad } u, n_{\Omega}) ds = \int_{\Omega} \text{div grad } u dx = \int_{\Omega} \Delta u dx = \text{const} \int_{\Omega} Q dx = 0,$$

поскольку этот интеграл есть общий заряд в рассматриваемой области, а он нулевой (положительные заряды компенсируются отрицательными). Итак,

$$\frac{\partial u}{\partial n_+} = \frac{\partial u}{\partial n_-}.$$

Ниже мы еще используем свойства потенциала двойного слоя, а сейчас займемся свойствами оператора Лапласа.

Фундаментальные решения имеют важные приложения к задаче о колебаниях сферически симметричных тел. Рассмотрим, например, окружность на плоскости (периодическую струну). Окружность $x^2 + y^2 = 1$ является римановым многообразием, а значит, на ней определен оператор Лапласа div grad . На окружности имеется стандартная полярная координата φ . Через эту координату оператор $\Delta = \text{div grad}$ на окружности выражается обычным образом: $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}$.

В больших размерностях вместо задачи о колебаниях струны получаем задачу о колебаниях сферы. Здесь нет единой координаты. Вместо тригонометрических функций ($\sin k\varphi, \cos k\varphi$), описывающих собственные колебания струны, колебания сферы описываются так называемыми сферическими функциями, появляющимися во всех задачах математической физики, где имеется сферическая симметрия. Место теории

рядов Фурье функций на окружности для функций на сфере занимает разложение по сферическим гармоникам.

С практической точки зрения интересна задача о гравитационном потенциале Земли, который влияет на движение спутников. В свою очередь, спутники можно рассматривать как индикаторы, по которым можно судить о распределении масс в Земле. Как мы вскоре увидим, вклады высоких гармоник быстро убывают с удалением от Земли, так что не слишком близко к Земле потенциал близок к сумме сферически симметричной главной части $\frac{c_1}{r}$ и дипольного возмущения $\frac{c_2 z}{r^3}$.

Рассмотрим задачу о собственных функциях оператора Лапласа на n -мерной сфере. $n = 1$ это обычные тригонометрические функции. Решив периодическую краевую задачу для уравнения $\frac{d^2 u}{d\varphi^2} = \lambda u$, можно найти все гармоники. Это в точности комбинации $\sin k\varphi$ и $\cos k\varphi$ с целыми k (собственное число $\lambda = -k^2$).

Как обстоит дело в больших размерностях, например на двумерной сфере $x^2 + y^2 + z^2 = 1$? Сейчас мы познакомимся со сферическими функциями, которые с этой точки зрения являются обобщением тригонометрических.

Рассмотрим функцию $u(x, y, z)$, постоянную вдоль каждого луча, выходящего из начала координат. Такая функция называется однородной степени 0 (напомню, что функция называется однородной степени k , если $u(\lambda x) = \lambda^k u(x)$ для всякого $\lambda > 0$).

В начале координат функция может не быть определенной. Например, однородной функцией степени 0 является

$$u(x, y, z) = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{2x^2 + 3y^2 + 4z^2}.$$

Задача. Найдите $\Delta u|_{S^2}$ и сравните с $\operatorname{div} \operatorname{grad}(u|_{S^2})$.

Последний оператор называется *сферическим лапласианом*. Я буду обозначать его через $\tilde{\Delta}$.

Оказывается, в пространстве любой размерности n для однородной функции u любой степени k справедливо тождество:

$$\tilde{\Delta} u = r^2 \Delta u - \Lambda u, \quad \Lambda = k^2 + k(n - 2).$$

Стоящий в левой части равенства оператор — это сферический лапласиан, продолженный на все пространство по однородности степени k ;

на единичной сфере $r^2 = 1$ это просто сферический лапласиан:

$$\tilde{\Delta}u|_{r^2=1} = \operatorname{div} \operatorname{grad}(u|_{r^2=1}).$$

Рассмотрим частные случаи:

1. При $k = 0$ имеем тождество

$$\tilde{\Delta}u = r^2 \Delta u. \quad (10.1)$$

Его легко объяснить. Градиент однородной функции u степени 0, ограниченный на единичную сферу, совпадает с градиентом ограничения самой функции на эту сферу, поскольку градиент однородной функции нулевой степени касается сферы. Так же легко получить из рассмотрения потоков, что совпадают и дивергенции градиентов. Т.е. для однородных функций степени 0 обычный и сферический лапласианы на единичной сфере совпадают: $(\tilde{\Delta}u)|_{r^2=1} = (\Delta u)|_{r^2=1}$. А тождество (10.1) получается в силу продолжения сферического лапласиана на все пространство с сохранением однородности. Действительно, оператор Δ понижает степень однородности на 2 единицы, поэтому Δu — однородная функция степени -2 . Чтобы продолжение имело степень 0, функцию Δu степени -2 нужно умножить на r^2 .

2. Пусть $n = 2$, $k \neq 0$. Наше тождество принимает вид

$$\tilde{\Delta}u = r^2 \Delta u - k^2 u.$$

Применим его к однородной степени k гармонической на плоскости функции $u = \operatorname{Re} z^k$ (в частности, при $k = 2$, на единичной окружности $u = \cos 2\varphi$).

Наше тождество принимает вид $\tilde{\Delta}u = -k^2 u$.

Мы не будем пока заниматься доказательством общего тождества, отметим только, что оно основано на формуле Эйлера для однородных функций степени k (докажите ее в качестве упражнения):

$$\sum_{i=1}^n x_i \frac{\partial u}{\partial x_i} = ku.$$

Следствие. Пусть функция однородная и гармоническая. Тогда она, ограниченная на единичную сферу, — собственная для сферического лапласиана:

$$\tilde{\Delta}u = -\Lambda u.$$

Ниже мы увидим, что так получаются все собственные функции сферического лапласиана.

Определение. Сферическими функциями на сфере S^{n-1} называются ограничения на сферу однородных гармонических многочленов в \mathbb{R}^n .

Задача. Найдите размерность пространства сферических функций, являющихся ограничениями гармонических многочленов заданной степени однородности k в \mathbb{R}^n .

Например, для $n = 3$ получаем:

k	0	1	2	\dots
размерность	1	3	5	\dots
(базис x, y, z)		(базис $xy, yz, zx,$ $x^2 - y^2, y^2 - z^2$)		

Остановимся на одном интересном приложении сферических функций к топологической задаче.

Теорема Максвелла. При $n = 3$ все сферические функции данной степени k можно получить, последовательно дифференцируя потенциал $1/r$ вдоль подходящих постоянных векторных полей: $L_{v_k} \dots L_{v_1} \frac{1}{r}$ (результат такого дифференцирования называется *мультипольным потенциалом*) и ограничивая результат на единичную сферу. При этом k полей v_1, \dots, v_k определяются по данной ненулевой сферической функции степени k однозначно (с точностью до ненулевых множителей).

Размерность пространства сферических функций степени k равна $2k + 1$. Рассматривая их с точностью до ненулевой мультипликативной постоянной и исключая 0, получаем проективное пространство \mathbb{RP}^{2k} .

С другой стороны, по теореме Максвелла все сферические функции степени k с точностью до ненулевого множителя можно получить из $1/r$, дифференцируя вдоль k постоянных полей векторов длины 1 в \mathbb{R}^3 . Постоянные векторы длины 1 определяются функцией однозначно с точностью до знаков. Дифференцирования вдоль постоянных полей коммутируют, поэтому результат не зависит от порядка.

Таким образом, мы построили взаимно однозначное отображение

$$\mathbb{RP}^2 \times \dots \times \mathbb{RP}^2 / S(k) \rightarrow \mathbb{RP}^{2k},$$

где $S(k)$ — симметрическая группа перестановок k сомножителей.

Первое из пространств называется *симметрической k -й степенью* проективной плоскости $\mathbb{R}P^2$ и обозначается через $S^k \mathbb{R}P^2$. Построенное отображение Максвелла $S^k \mathbb{R}P^2 \rightarrow \mathbb{R}P^{2k}$ — гомеоморфизм. По-видимому, теорема Максвелла — самое элементарное доказательство гомеоморфности этих пространств.

Родственная теорема из алгебры — теорема Виета. Отображение Виета

«корни \rightarrow элементарные симметрические многочлены от корней»

задает гомеоморфизм симметрической k -й степени \mathbb{C} и \mathbb{C}^k : $S^k \mathbb{C} \approx \mathbb{C}^k$.

Соответствующая проективная теорема: $S^k(\mathbb{C}P^1) \approx \mathbb{C}P^k$. Комплексная проективная прямая $\mathbb{C}P^1$ — это сфера Римана S^2 , так что проективная теорема Виета доставляет гомеоморфизм $S^k(S^2) \approx \mathbb{C}P^k$.

Лекция 11

СФЕРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ.

ТЕОРЕМА МАКСВЕЛЛА.

ТЕОРЕМА ОБ УСТРАНИМОЙ ОСОБЕННОСТИ

Рассмотрим в \mathbb{R}^n однородную функцию F степени k :

$$F(\lambda x) = \lambda^k F(x) \quad \forall \lambda > 0.$$

В нуле такая функция может не быть определена (однородная функция может быть задана в однородной области, например, в некотором телесном угле с началом 0).

Мы определили для каждого k модифицированный сферический оператор Лапласа $\tilde{\Delta}$, который переводит однородные функции степени k в однородные с сохранением степени однородности. Напомним его определение: функция ограничивается на единичную сферу, там от нее берется дивергенция градиента, результат продолжается как однородная функция степени k на все пространство, кроме начала координат.

Теорема. $\tilde{\Delta}F = r^2 \Delta F - \Lambda F$, $\Lambda = k^2 + k(n - 2)$.

Доказательство. Вычислим $\Delta F = \operatorname{div} \operatorname{grad} F$. Пусть f — ограничение F на единичную сферу: $f = F|_{S^{n-1}}$, $f: S^{n-1} \rightarrow \mathbb{R}$. Тогда $(\operatorname{grad} F)|_{S^{n-1}} = \operatorname{grad} f + \frac{\partial F}{\partial r} \frac{\partial}{\partial n}$, см. рис. 11.1 (конечно, мы считаем здесь касательное пространство к сфере в точке вложенным в касательное пространство к объемлющему пространству).

По однородности $F(rq) = r^k f(q)$, поэтому $\frac{\partial F}{\partial r} = kr^{k-1} f(q)$. Нам достаточно найти градиент на единичной сфере, поскольку он однороден степени $k - 1$. Наше поле раскладывается на касательную и нормальную составляющие, причем касательная составляющая не имеет потока через крышки пробной поверхности, а нормальная — через боковые стенки, рис. 11.2.




Рис. 11.1. Сферический и полный градиенты




Рис. 11.2. Вычисление потока через пробную поверхность

Вычислим поток градиента через пробную поверхность:

$$\int_{\partial G} (\operatorname{grad} F, \vec{n}) dS = \int_{\tau} (\operatorname{grad} F, \vec{n}) dS + \sigma(1 + \varepsilon)^{n-1} k f (1 + \varepsilon)^{k-1} - \sigma k f,$$

где первый член — поток через боковую поверхность, второй — через верхнюю крышку, третий — через нижнюю. В результате получаем:

$$\int_{\tau} (\operatorname{grad} F, \vec{n}) dS + \sigma(n + k - 2)\varepsilon k F + o(\varepsilon).$$

Здесь $\varepsilon\sigma$ — объем пробной области; функции F и f совпадают на единичной сфере. Деля поток на объем пробной области и стягивая пробную область к точке на единичной сфере, получаем в этой точке:

$$\Delta F = \tilde{\Delta}f + kF(n + k - 2).$$

(Действительно, поток $\operatorname{grad} F$ через ∂G есть интеграл от $\operatorname{div} \operatorname{grad} F$ по G , в то время как поток от $\operatorname{grad} F$ через τ есть $\varepsilon \times$ (поток $\operatorname{grad} f$ через $\partial\sigma$) + $o(\varepsilon)$, а поток в скобках равен интегралу от $\operatorname{div} \operatorname{grad} f$ по σ .)

Таким образом, наше тождество доказано на единичной сфере. При продолжении в точку, находящуюся от начала координат на расстоянии r , в правой части F умножится на r^k , ΔF — на r^{k-2} . Поэтому и возникнет множитель r^2 в первом слагаемом доказываемого тождества.

Модифицированный сферический лапласиан однороден степени k по определению. Поэтому из выполнения тождества на единичной сфере следует его выполнение везде (кроме начала координат). Итак, тождество доказано.

Наша теорема — частный случай следующего простого, но полезного замечания о лапласиане функции на подмногообразии евклидова пространства: при вычислении значения лапласиана в точке можно заменить подмногообразие его касательным пространством в этой точке, а функцию — соответствующей функцией на касательном пространстве.

Рассмотрим m -мерное подмногообразие («поверхность»)

$$y = f(x), \quad x \in \mathbb{R}^m, \quad y \in \mathbb{R}^l$$

в евклидовом пространстве \mathbb{R}^{m+l} с метрикой $dx^2 + dy^2$. Будем называть x -подпространство *горизонтальным*, y -подпространство *вертикальным*. Будем рассматривать декартовы координаты точки x как координаты точки $X = (x, y = f(x))$ на поверхности.

Функция U , заданная на поверхности, записывается в этих координатах как функция на горизонтальной плоскости

$$u(x) = U(X).$$

Лемма. *Предположим, что касательная плоскость поверхности в точке 0 горизонтальна (т. е. что $(df/dx)(0) = 0$). Тогда риманов лапласиан функции U на поверхности совпадает в этой точке с евклидовым лапласианом функции и на касательной плоскости.*

Доказательство. Запишем метрику на поверхности в виде римановой метрики dS^2 на горизонтальной плоскости. Из теоремы Пифагора следует, что отличие dy^2 этой метрики от евклидовой метрики горизонтальной плоскости — второго по $|x|$ порядка малости:

$$dS^2 - dx^2 = O(|x|^2)$$

(здесь и далее малость квадратичной формы или дифференциального оператора означает, конечно, малость коэффициентов). Поэтому операторы GRAD и DIV риманова градиента и римановой дивергенции, соответствующие метрике dS^2 на горизонтальной плоскости, отличаются от евклидовых grad и div малыми второго порядка:

$$\text{GRAD} - \text{grad} = O(|x|^2), \quad \text{DIV} - \text{div} = O(|x|^2).$$

Применяя эти операторы последовательно к функции u , мы находим

$$\text{DIV GRAD } u = \text{div grad } u + O(|x|^2) + \text{div } O(|x|^2).$$

Последнее слагаемое есть $O(|x|)$, поэтому

$$(\text{DIV GRAD } u)(0) = (\text{div grad } u)(0).$$

Замечание. Перенесение функции на касательную плоскость не обязательно проводить при помощи ортогонального проектирования: можно использовать любое семейство гладких кривых, важно лишь, чтобы проходящая через нашу точку кривая была в ней ортогональна поверхности.

Пример. Рассмотрим единичную сферу $y = \sqrt{1 - x^2}$ в n -мерном евклидовом пространстве и точку $x = 0$ на ней ($m = n - 1$, $l = 1$). Рассмотрим функцию U на сфере. Вычислим ее сферический лапласиан в точке $x = 0$.

По лемме он равен евклидовому лапласиану $\Delta(x)u$ (сумме вторых частных производных по x_i от соответствующей функции $u(x)$).

Однородное степени k продолжение функции U в евклидово пространство обозначим через \tilde{U} . На касательной плоскости $y = 1$ сферы в точке $x = 0$ эта функция обращается в функцию

$$\tilde{u}(x) = (\sqrt{1 + x^2})^k u(\tilde{x}), \quad |\tilde{x} - x| = O(|x|^3).$$

Поэтому евклидов лапласиан продолжения в нашей точке $x = 0$, $y = 1$ есть

$$\Delta \tilde{U} = \frac{d^2}{dy^2} y^k u(0) + (\Delta_x \tilde{u})(0) = k(k - 1)u(0) + \Delta_x \tilde{u}.$$

Но $\tilde{u}(x) = u(x) + \frac{k}{2}x^2 u(0) + O(|x|^3)$. Поэтому в точке $x = 0$

$$\Delta_x(\tilde{u}) = \Delta_x u + k(n - 1)u.$$

Окончательно, в нашей точке

$$\Delta \tilde{U} = \Delta_x u + [k(n - 1) + k(k - 1)]u(0).$$

Поскольку выбранная точка ничем не отличается от остальных, мы доказали нашу формулу $\tilde{\Delta}F = r^2 \Delta F - \Lambda F$, $\Lambda = k(n + k - 2)$ при $r = 1$. По однородности она верна везде.

Следствие. Если функция F (заданная в $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$) гармоническая и однородная степени k , то она собственная для (модифицированного) сферического лапласиана: $\tilde{\Delta}F = -\Lambda F$ (т. е. ее ограничение на сферу — собственное для сферического лапласиана). Обратно, собственная функция сферического лапласиана, продолженная с единичной сферы однородно степени k , гармонична всюду, кроме нуля.

Заметим, что для одной и той же собственной функции лапласиана на единичной сфере можно найти два гармонических продолжения, поскольку из квадратного уравнения $\Lambda = k^2 + k(n - 2)$ определяются два значения k .

Пример. Пусть $n = 2$ (т. е. мы рассматриваем функции на плоскости и их ограничения на окружность). При $n = 2$ имеем $\Lambda = k^2$. Гармонической однородной функцией степени 1 является функция x . Но существует также гармоническая однородная функция степени -1 , ограничение которой на единичную окружность такое же, как и у функции x .

В полярных координатах формулы этих сопряженных функций: $F = r \cos \varphi = x$, $\hat{F} = \frac{\cos \varphi}{r} = x/r^2$, это потенциал диполя (ядро потенциала двойного слоя). Аналогично для сопряженных степеней однородности k и $-\hat{k}$:

$$F = r^k \cos k\varphi, \quad \hat{F} = \frac{\cos k\varphi}{r^k}.$$

Пусть $n = 3$, т. е. мы рассматриваем функции трех переменных и их ограничения на двумерную сферу. В случае $n = 3$ имеем $\Lambda = k^2 + k$. Поэтому сопряженная с k степень однородности есть $\hat{k} = -1 - k$.

При $k = 0$ сопряженные функции $F = 1$, $\hat{F} = 1/r$.

При $k = 1$ имеем $F = z$, $\hat{F} = z/r^3$, как и в двумерном случае, это потенциал диполя (ядро потенциала двойного слоя).

При $k = 2$ мы можем найти гармоническую квадратичную форму, например, $F = \frac{3z^2 - x^2 - y^2 - z^2}{2}$, $F|_{S^2} = f = \frac{3z^2}{2} - \frac{1}{2}$.

Функции z и f являются сферическими, т. е. описывают собственные колебания сферы. Кроме того, это так называемые зональные функции: они инвариантны относительно вращений вокруг оси z и меняют знак при переходе через параллели, которые делят сферу на отдельно колеблющиеся зоны, причем разделяющие параллели остаются неподвижными, рис. 11.3.




Рис. 11.3. Зональные функции описывают собственные колебания сферы

Задача. При любом ли целом k существует зональная сферическая функция, являющаяся ограничением на сферу многочлена степени k от z ?

В общем случае $\Lambda = k^2 + k(n - 2)$, сопряженный к k показатель однородности равен $\hat{k} = 2 - n - k$. Значения сопряженных функций в точках rq (q — точка единичной сферы, r — расстояние от начала координат) равны $F(rq) = r^k f(q)$, $\hat{F}(rq) = f(q)/r^{k+n-2}$.




Рис. 11.4. Инверсные точки

При любом n из формулы связи $F(q/r)$ и $\hat{F}(rq)$ совершенно исчез показатель однородности k . Значит, она верна и для линейных комбинаций однородных функций с разными показателями однородности. Но такими функциями можно приблизить любую гармоническую. Таким образом, при этом преобразовании всякая гармоническая функция F переходит в гармоническую функцию $\hat{F}(x) = \frac{1}{|x|^{n-2}} F\left(\frac{x}{|x|^2}\right)$ (можно это проверить и явным вычислением).

Предложение 1. Однородные гармонические функции степени k существуют только при целых k . (Собственные функции сферического лапласиана существуют только при Λ , соответствующих целым k .)




Рис. 11.5. Определение размерности пространства однородных многочленов степени 3

Доказательство. Изучим сначала однородные гармонические многочлены. Пространство однородных многочленов нулевой степени одномерно, степени 1 имеет размерность n , размерность пространства многочленов степени 2 и выше найдем для простоты в трехмерном случае (см. рис. 11.5):

степень	0	1	2	3
размерность	1	3	6	10

Вообще, $\dim S^k \mathbb{R}^3 = C_{k+2}^2 = \frac{(k+2)(k+1)}{2}$. Оператор Лапласа переводит это пространство в пространство $S^{k-2} \mathbb{R}^3$ однородных многочленов степени на 2 меньше, чем исходная. Гармонические однородные многочлены степени k образуют линейное пространство — ядро отображения

$$\Delta: S^k \mathbb{R}^3 \rightarrow S^{k-2} \mathbb{R}^3.$$

Утверждение. *Лапласиан отображает $S^k \mathbb{R}^3$ на $S^{k-2} \mathbb{R}^3$.*

Действительно, любой многочлен есть образ некоторого многочлена под действием лапласиана. (Достаточно проверить это для одночленов. Для одночленов от одной переменной x это очевидно: $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = x^p$ при $u = x^{p+2}/(p+2)(p+1)$. Для одночлена $x^p y^q$ от x и еще m переменных y_i начинаем с одночлена $u = x^{p+2} y^q / (p+2)(p+1)$. Имеем $\Delta_{x,y} u = x^p y^q + v$, где $v = \Delta_y u$ — многочлен, степень которого по y меньше $|q|$. Поэтому $x^p y^q$ лежит в образе $\Delta_{x,y}$, если все многочлены степени меньше $|q|$ по y в нем лежат. Это позволяет доказывать требуемое индукцией по $|q|$ (если $\Delta_{x,y} w = v$, то $\Delta_{x,y}(u - w) = x^p y^q$).)

Итак, размерность пространства сферических функций степени k равна разности размерностей пространств $S^k \mathbb{R}^3$ и $S^{k-2} \mathbb{R}^3$, т. е.

$$\frac{(k+2)(k+1)}{2} - \frac{k(k-1)}{2} = 2k + 1.$$

Следствие. *Для каждого неотрицательного целого k на сфере S^2 существует $(2k+1)$ -мерное линейное пространство сферических функций — собственных функций сферического лапласиана с собственным числом $-\Lambda$, $\Lambda = k^2 + k$, — являющихся ограничениями гармонических однородных многочленов степени k в \mathbb{R}^3 на сферу.*

Доказательство. Собственность ограничений следует из доказанного тождества. Размерность пространства гармонических в \mathbb{R}^3 однородных многочленов степени k только что подсчитана. Размерность пространства их ограничений на сферу такая же, так как равный на сфере нулю однородный многочлен равен нулю тождественно.

Мы нашли размерность пространства гармонических однородных многочленов степени k для $n = 3$. В общем случае его размерность растет как k^{n-2} .

Утверждение. *Сферические функции с разными собственными числами попарно ортогональны.*

Действительно, собственные колебания с разными собственными частотами всегда ортогональны, как главные оси эллипсоида в евклидовом пространстве с разными длинами.

Отсюда следует, например, что $\int_{S^2} (3z^2 - 1) dz = 0$. Конечно, этот интеграл можно и явно вычислить при помощи симметризации: три таких интеграла для x, y, z равны между собой, а в сумме дают 0.

Теорема. Всякая сферическая функция (собственная функция сферического лапласиана) является ограничением на сферу однородного гармонического многочлена в объемлющем пространстве.

Доказательство. Собственные числа сферического лапласиана неположительны, так как потенциальная энергия — интеграл Дирихле — неотрицательна.

Нулевому собственному числу отвечают гармонические на сфере собственные функции. Гармоническая на сфере функция — константа (по принципу максимума), так как сфера — замкнутое (не имеющее края и компактное) связное многообразие. (Действительно, вырежем малую дыру, тогда максимум будет достигаться на границе дыры. Стягивая дыру в точку, убеждаемся, что значение функции, гармонической на замкнутом связном многообразии, в любой его точке равно максимуму этой функции по всему многообразию.)

Теперь рассмотрим любое отрицательное собственное число $-\Lambda$,

$\Lambda > 0$. Для любого $\Lambda > 0$ существует показатель однородности $k > 0$ такой, что $\Lambda = k(k + n - 2)$, рис. 11.6.

Собственная функция сферического лапласиана с собственным числом $-\Lambda$ продолжается на все пространство без 0 в виде гармонической однородной функции степени k (по нашему основному тождеству).




Рис. 11.6. Собственное число как функция степени

Поскольку k положительно, продолженная функция в окрестности нуля ограничена. По доказываемой ниже теореме об устранимой особенности гармоническая в окрестности нуля ограниченная функция остается гармонической при продолжении в начало координат по непрерывности. Для продолженной функции имеем $u(0) = 0$, поскольку $u(rq) = r^k u(q)$, $k > 0$.

Поскольку k положительно, продолженная функция в окрестности нуля ограничена. По доказываемой ниже теореме об устранимой особенности гармоническая в окрестности нуля ограниченная функция остается гармонической при продолжении в начало координат по непрерывности. Для продолженной функции имеем $u(0) = 0$, поскольку $u(rq) = r^k u(q)$, $k > 0$.

Продолженная функция в нуле гармоническая и, следовательно, гладкая. Но гладкая в нуле однородная функция степени k — обязательно однородный многочлен степени k (причем k обязательно целое неотрицательное) — это видно из формулы Тейлора. Итак, любая сферическая функция продолжается до однородного гармонического во всем пространстве многочлена.

Теорема Максвелла. *Все сферические функции степени k при $n = 3$ можно получить последовательным дифференцированием функции $1/r$ вдоль k направлений.*

Доказательство. Во-первых, очевидно, что производная гармонической функции вдоль постоянного векторного поля гармонична. Например, частные производные гармонической функции гармоничны.

Во-вторых, на сфере производные совпадают с некоторыми однородными многочленами. Для исходной функции $1/r$ это так: 1 — однородный многочлен степени ноль.

Допустим, что после a дифференцирований получена функция вида F/r^a , где F — однородный многочлен степени d . При дифференцировании вдоль постоянного поля однородность сохраняется, степень понижается на 1. Пусть ∇_v — дифференцирование вдоль постоянного поля \vec{v} . Тогда

$$\nabla_v \frac{F}{r^a} = \frac{\nabla_v F \cdot r^a - Fa \cdot r^{a-2}(\vec{v}, \vec{r})}{r^{2a}} = \frac{(\nabla_v F)r^2 - aF(\vec{v}, \vec{r})}{r^{a+2}}.$$

Числитель — однородный многочлен степени $d + 1$. Поэтому получающаяся гармоническая функция после ограничения на единичную сферу совпадает с однородным многочленом. Этот многочлен гармонический. Действительно, после дифференцирования мы получим гармоническую однородную функцию отрицательной степени. Показатель ее однородности сопряжен к показателю однородности числителя, являющегося однородным многочленом положительной степени. При ограничении однородной гармонической функции на сферу получается сферическая функция. Если продолжить ее с сопряженным положительным показателем однородности, то получится гармонический во всем пространстве многочлен (по предыдущей теореме). Итак, ограничение нашей производной на сферу совпадает с ограничением на нее некоторого однородного гармонического во всем пространстве многочлена.

Можно доказать (см. приложение 1), что пространство функций, получающихся таким образом, линейно (это вовсе не очевидно).

Чтобы доказать, что таким образом получатся все сферические функции, достаточно показать, что в пространстве сферических функций нет собственных подпространств, инвариантных относительно всех вращений. Тогда подпространство, полученное конструкцией Максвелла (оно инвариантно относительно вращений), совпадает со всем пространством сферических функций.

Для доказательства неприводимости представления группы вращений сферы S^2 линейными преобразованиями $(2k + 1)$ -мерного пространства сферических функций (т. е. отсутствия нетривиальных инвариантных подпространств) достаточно, например, убедиться, что все это пространство состоит из линейных комбинаций одной единственной функции и ее поворотов. В качестве такой порождающей все пространство сферической функции можно взять, например, зональную сферическую функцию. Исследуем эти функции несколько подробнее.

Мы имеем два способа продолжать сферические функции до однородных гармонических функций. Рассмотрим случай конструкции Максвелла, когда все дифференцирования производятся по одному и тому же направлению, например, вдоль оси z . Ограничиваая функции $\left(\frac{\partial}{\partial z}\right)^k \frac{1}{r}$ на сферу, будем получать сферические функции. При $k = 0$ имеем 1, при $k = 1$ получим z/r^3 ; каждый раз будем получать выражение вида

$$\left(\left(\frac{\partial}{\partial z} F \right) r^2 - a F z \right) / r^{a+2}.$$

Если $F = F(z, r)$, то при наших дифференцированиях такой вид F сохраняется, поэтому на единичной сфере получится функция только от z . Значит, в пространстве сферических функций любой степени k есть функция, зависящая только от z . Она является ограничением на сферу некоторого многочлена от z , который называется **многочленом Лежандра**. Многочлены Лежандра разных степеней попарно ортогональны на отрезке $[-1, 1]$ оси z , так как равный нулю интеграл по сфере от их произведения превращается просто в интеграл по dz по теореме Архимеда о симплектоморфизме сферы без полюсов и цилиндра (элемент площади сферы равен элементу площади описанного цилиндра при проектировании на цилиндр горизонтальными радиусами, рис. 11.7):




Рис. 11.7. Симплектоморфизм Архимеда сферы на цилиндр и графики первых трех многочленов Лежандра

Следствие. *Многочлен Лежандра степени k имеет на интервале $(-1, 1)$ k различных корней.*

Действительно, число нулей не больше k , так как многочлен имеет степень k . Предположим, что число корней меньше k . Тогда число m корней на интервале $(-1, 1)$, в которых многочлен меняет знак, тем более меньше k . Составим линейную комбинацию из многочленов Лежандра степени не выше m , которая обращается в 0 первого порядка в этих m нулях. Такая линейная комбинация существует, так как линейные комбинации многочленов Лежандра степени не выше m — это в себе многочлены степени m (пространство многочленов имеет размерность $m + 1$, а первые $m + 1$ многочленов Лежандра линейно независимы). Умножим построенную линейную комбинацию на наш многочлен Лежандра степени k . Произведение не меняет знака на интервале $(-1, 1)$. Это противоречит ортогональности многочленов Лежандра степени k многочленам Лежандра меньших степеней.

Итак, число различных корней многочлена Лежандра степени k на интервале $(-1, 1)$ равно k . Следовательно, все корни — простые.

Каждый многочлен Лежандра описывает зональное собственное колебание сферы, рис. 11.8.

Кроме многочлена Лежандра f степени k , то же собственное число имеют еще присоединенные функции $f_j(z) \cos j\varphi$, $f_j(z) \sin j\varphi$ ($j < k$), которые также описывают собственные колебания, рис. 11.9; каждая долька в сетке колеблется отдельно.

Присоединенные функции можно получить из многочлена Лежандра, поворачивая




Рис. 11.8. Колебание сферы, соответствующее многочлену Лежандра




Рис. 11.9. Колебания сферы, соответствующие присоединенным функциям

сферу вокруг оси x или оси y на малый угол α . Многочлен Лежандра превращается при этом в близкую сферическую функцию. Присоединенная функция измеряет разность между исходной и сдвинутой функцией. А именно, производная сдвинутой функции по α и является присоединенной сферической функцией: $(x(\partial/\partial z) - z(\partial/\partial x))f(z) = xf'(z) = f'(z)\sqrt{1-z^2}\cos\varphi$. При повторных дифференцированиях появляются $\cos 2\varphi$, и т. д. Эти вычисления доказывают, между прочим, что все сферические функции порождаются одной зональной, и, следовательно, доказывают неприводимость (отсутствие инвариантных подпространств).

В частности, отсюда вытекает, что конструкция Максвелла дает все сферические функции.

Можно доказать (см. ниже приложение 1), что пространство k -кратных производных от функции $1/r$ по k постоянным (и, следовательно, коммутирующим) векторным полям линейно (производная линейно зависит от поля). Размерность этого линейного пространства производных не превосходит $2k+1$, так как ненулевое k -кратное дифференцирование задается направлениями k векторов (k точками на 2-сфере) и еще одним общим множителем.

С другой стороны, мы построили выше линейное отображение этого линейного пространства размерности $2k+1$ на все $(2k+1)$ -мерное пространство гармонических однородных многочленов степени k в \mathbb{R}^3 . Значит, это отображение — изоморфизм. Следовательно, конструкция Максвелла не только дает все сферические функции с данным k , но они получаются, с точностью до множителя, по одному разу. Тем самым доказано топологическое утверждение:

$$S^k(\mathbb{R}P^2) \approx \mathbb{R}P^{2k}.$$

Теория сферических функций имеется в любой размерности, в любой размерности есть зональные функции. При $n = 3$ это полиномы Лежандра. Посмотрим, что получится при $n = 2$.




Рис. 11.10. Зональные колебания окружности

Колебания окружности описываются собственными функциями $\cos k\varphi, \sin k\varphi$.

Существование зональных колебаний означает, что из этих двух функций можно составить линейную комбинацию, зависящую только от z . Но это очевидно: такой функцией является функция $z = \cos \varphi$, а также функция $\cos k\varphi$ при любом k , рис. 11.10.

Следствие. $\cos k\varphi = T_k(\cos \varphi)$, где T_k — многочлен.

Эти многочлены называются *многочленами Чебышева*. Они ортогональны на отрезке $[-1, 1]$, правда, с весом (посчитайте, с каким), и имеют аналогичные свойствам нулей полиномов Лежандра свойства нулей.

Между прочим, роль присоединенных функций здесь играют функции $\sin k\varphi$, получающиеся из зональных дифференцированиями по углу поворота зональной функции.

Большинство так называемых специальных функций математической физики возникает в задаче о колебаниях тел с той или иной симметрией в пространстве какой-либо размерности.

Например, задача о колебаниях круга приводит к так называемым функциям Бесселя. Бессель — немецкий астроном, встретивший эти функции при разложении гравитационного потенциала Солнца, ограниченного на кеплеров эллипс, в ряд Фурье.

Тот факт, что столь различные физические задачи, как задача о колебаниях круга и о притяжении планет, приводят к одной и той же математической теории, является удивительным проявлением универсальности математики и единства всего сущего.

Чтобы закончить доказательство поразительной теоремы Максвелла, остается доказать использованную в нем (и также поразительную) теорему об устранимой особенности.

Теорема. Пусть $n = 2$. Если функция в \mathbb{R}^n гармонична в некоторой проколотой окрестности точки и ограничена, то она продолжается по непрерывности в эту точку, и продолженная функция гармонична и в полной окрестности точки, включая саму точку.

Эта теорема имеет простой физический смысл. Гармоническая функция описывает стационарное состояние мембраны, натянутой на некоторый контур. Например, мембрану можно натянуть на два колечка. Теорема утверждает, что нельзя мембрану подпереть в одной точке иголкой, иголка пройдет насеквоздь, рис. 11.11.




Рис. 11.11. Мембрану можно подпереть колечком, но нельзя иголкой

В случае тонкой пластиинки, которая описывается уравнением $\Delta^2 u = 0$, соответствующее утверждение неверно, т. е. пластиинку можно подпереть в одной точке.

Доказательство. Рассмотрим окружность с центром в рассматриваемой точке 0 (сдвинув и растянув координаты, можно считать, что окружность задается условием $r = 1$). Построим гармоническую функцию в круге, совпадающую на окружности с нашей функцией. Мы уже знаем, что такая функция существует (явная формула — интеграл Пуассона — указана в лекции 7). Надо доказать, что разность между исходной и построенной функциями, обозначим ее u , равна нулю в проколотом круге.

Рассмотрим функцию $u_0 = C \ln(1/r)$. Она гармонична в проколотом круге и равна нулю на окружности $r = 1$. Подберем C так, чтобы при $r = \varepsilon$ эта функция была больше u .

Функция u в проколотом круге ограничена; пусть там $|u| \leq M$. Чтобы при $r = \varepsilon$ функция u_0 была равна M , выберем $C = \frac{M}{\ln(1/\varepsilon)}$. Тогда на единичной окружности $u = u_0 = 0$, а на окружности радиуса ε $u \leq u_0$. В кольце между окружностями обе функции гармоничны, а на обеих границах $u \leq u_0$. По принципу максимума гармоническая в кольце функция $u_0 - u$ неотрицательна всюду в кольце, рис. 11.12. Итак,

$$0 \leq u \leq \frac{M \ln(1/r)}{\ln(1/\varepsilon)}.$$

Такому же неравенству удовлетворяет и функция $-u$.




Рис. 11.12. Метод барьера устранения особенности

Пусть $\varepsilon \rightarrow 0$. Тогда во всех точках круга получаем $u = 0$, рис. 11.12.

Аналогичное доказательство проходит и в случае, когда в нуле особенность слабее логарифмической. Примененный метод устранения особенности называется методом барьера. Сущность метода состоит в том, чтобы найти положительную гармоническую функцию вне особенности, стремящуюся к бесконечности при подходе к особенности. Умножив такую «барьерную» функцию на подходящую константу, ее можно сделать сколь угодно малой в любой точке вне особенности. Если исследуемая функция стремится к бесконечности при подходе к особенности медленнее, чем барьерная функция, то особенность устранима: на краях кольца исследуемая функция меньше (не больше) барьерной, поэтому она по модулю меньше (не больше) ее везде и поэтому равна нулю.

Теорема об устранимой особенности верна в любой размерности; особенность должна быть слабее, чем у фундаментального решения. Доказательство совершенно такое же, как при $n = 2$, только вместо $C \ln(1/r)$ нужно поставить $C(r^{n-2} - 1)$.

Следствие. *Ограниченнaя гармоническая функция на плоскости постоянна.*

Замечание. Этот результат, принадлежащий Лиувиллю, справедлив и в \mathbb{R}^n при любом n , но приведенное ниже простое доказательство проходит только при $n = 2$.

Доказательство. Сфера Римана при помощи стереографической проекции покрывается двумя плоскими картами, которые связаны между собой преобразованием $w = 1/z$. Рассмотрим нашу функцию $u(z)$ в карте w , там она гармонична и ограничена в окрестности нуля. По теореме об устранимой особенности она ограничена и гармонична на всей сфере Римана, а значит, постоянна.

Замечание. Достаточна даже ограниченность с одной стороны: например, всякая положительная гармоническая на всей плоскости функция постоянна.

Задача. Если гармоническая на плоскости функция растет не быстрее многочлена, то она является многочленом.

Указание. Производные такой функции растут не быстрее многочлена. Отсюда, ввиду уравнений Коши–Римана, следует, что голоморфная функция f , вещественной частью которой является исходная гармоническая функция, растет не быстрее некоторого многочлена. Значит, голоморфная в некоторой прооколотой окрестности $z = \infty$ (т. е. $w = 0$) функция $f(z)/z^N = w^N f(1/w)$ ограничена. Из теоремы об устранимой особенности следует, что она голоморфна при $w = 0$, поэтому f — многочлен степени не выше N .

Задача. Устранима ли особенность ограниченной функции, гармонической в дополнении к отрезку в \mathbb{R}^3 ?

Указание. В качестве барьера взять потенциал заряда плотности 1 на отрезке.

Задача. Доказать теорему Лиувилля в \mathbb{R}^n : ограниченная гармоническая функция постоянна.

Указание. Воспользоваться формулой Пуассона или разложением в ряд по сферическим функциям на большой сфере.

Лекция 12

КРАЕВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ЛАПЛАСА. ТЕОРИЯ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ И СИСТЕМ

Рассмотрим в \mathbb{R}^n компактную связную гладкую гиперповерхность S^{n-1} , делящую \mathbb{R}^n на две области: внутреннюю (ограниченную) область G и внешнюю (неограниченную) область G' . Пусть на границе задана непрерывная функция $f: S^{n-1} \rightarrow \mathbb{R}$. Краевая задача Дирихле для уравнения Лапласа заключается в следующем: ищем в замыкании области G (G') функцию u , для которой выполняются условия

- 1) функция u гармонична: $\Delta u = 0$ в области G (внутренняя задача) или G' (внешняя задача),
- 2) функция непрерывна в замыкании области: $u \in C(\bar{G})$ (соответственно, $C(\bar{G}')$),
- 3) функция удовлетворяет граничному условию $u|_{S^{n-1}} = f$.
- 4) В случае внешней задачи рассматриваются также некоторые дополнительные условия на бесконечности, влияющие на существование и единственность решения. Эти условия в разных учебниках ставятся по-разному. Наиболее обычно (выглядящее на первый взгляд странным) условие

$$\begin{aligned}|u| &< C \quad \text{при } x \rightarrow \infty, \quad n = 2; \\ u &\rightarrow 0 \quad \text{при } x \rightarrow \infty, \quad n > 2.\end{aligned}$$

Задачей Неймана называется задача, в которой третье условие имеет вид $\frac{\partial u}{\partial n} = f$, тогда во втором условии надо потребовать гладкость на границе класса C^1 или какое-нибудь другое достаточное условие существования нормальной производной.

В случае задачи Неймана тоже обычно накладываются условия типа 4). Физически краевое условие Дирихле 3) соответствует закрепленной по краю мембране, а условие Неймана $\frac{\partial u}{\partial n} = 0$ — свободной.

Комбинируя варианты внутренняя — внешняя, Дирихле — Неймана, получаем всего 4 типа краевых задач. Рассмотрим все по порядку.

1. Внутренняя задача Дирихле.

Решение существует и единственно.

Например, при $n = 2$ интеграл Пуассона дает решение задачи Дирихле в круге. Произвольную область по теореме Римана можно конформно отобразить на круг, а значит, получить и в ней решение задачи Дирихле. К сожалению, доказательство теоремы Римана основано на существовании решения задачи Дирихле. К тому же этот прием не работает в больших размерностях. Тем не менее результат верен в любой размерности: существует единственное решение задачи Дирихле.

Результат сохраняется и в случае плоской или многомерной области, ограниченной несколькими связными поверхностями. Единственность сразу следует из принципа максимума (см. предыдущие лекции). Идея доказательства существования заключается в минимизации интеграла Дирихле при заданных граничных условиях. Этот минимум может достигаться, как мы уже знаем, только на решении задачи Дирихле. Он действительно достигается. Физически это достаточно очевидно (стационарное состояние натянутой на контур мембраны). Но доказательство нетривиально, встречаются тонкости. Например, для мембранны, подпертой в одной точке, нижняя грань интеграла Дирихле не достигается (см. теорему об устранимой особенности в лекции 10). Мы не будем доказывать существование минимума.

2. Внешняя задача Дирихле.

Ее можно свести к внутренней. Для этого надо сделать инверсию с центром в некоторой точке области. Если эту точку принять

за начало координат, то инверсия задается формулой $x \mapsto x/|x|^2$. При $n = 2$ гармонические функции переходят в гармонические. При $n > 2$ гармонической будет функция $\frac{1}{|x|^{n-2}} u\left(\frac{x}{|x|^2}\right)$. Новую функцию мы рассматриваем в ограниченной области, в которую перешла внешность G при инверсии, рис. 12.1, и ставим для нее внутреннюю задачу Дирихле.




Рис. 12.1. Преобразование областей при инверсии

Видно, что может появиться особенность в нуле. Но если исходная функция во внешности G ограничена, то особенность устранима. Итак, ограни-

ченное решение внешней задачи Дирихле существует и единственно. При $n > 2$ оно стремится к 0 на бесконечности, так как при возвращении ко внешней области ограниченное решение внутренней задачи будет поделено на растущую на бесконечности величину $|x|^{n-2}$.

Неограниченное решение неединственно. Например, при $n = 2$, если граница — окружность $r = 1$, то к ограниченному решению можно добавить фундаментальное (растущее на бесконечности) решение с любым коэффициентом (оно равно нулю на границе). Можно добавлять и другие гармонические функции, например $r \cos \varphi$, $\cos \varphi/r$ и т. п. Если не наложить условия 4), то получим бесконечномерное пространство решений.

Условие 4) при $n > 2$ выбирается так, чтобы преобразованная функция $\frac{1}{|x|^{n-2}} u\left(\frac{x}{|x|^2}\right)$, поделенная на фундаментальное решение $1/|x|^{n-2}$, стремилась к 0 при $|x| \rightarrow 0$. Тогда к преобразованной функции применима теорема об устранимой особенности, и внешняя задача Дирихле сводится к внутренней. Так получается условие $u \rightarrow 0$ при $x \rightarrow 0$.

3. Внутренняя задача Неймана.

Пусть сначала $n = 2$. Гармоническая функция является вещественной частью голоморфной. Мнимая часть этой голоморфной функции — гармоническая функция, сопряженная к нашей. Условия Коши — Римана означают, что производная нашей искомой функции по нормали к границе равна производной сопряженной функции по ортогональному направлению, рис. 12.2.

Получаем, что задана производная сопряженной функции v вдоль границы. Если бы по этой производной удалось восстановить саму v на границе, то задача Неймана для функции u свелась бы к задаче Дирихле для функции v . Но восстановить v по производной удается не всегда, к этому могут быть препятствия топологического характера. Например, если граница топологически есть окружность с координатой s на ней, то необходимым и достаточным условием возможности восстановления v по $f = \partial v / \partial s$ является условие $\oint_G f ds = 0$. В случае неодносвязной обла-




Рис. 12.2. Сведение задачи Неймана к задаче Дирихле

сти, например кольца, для разрешимости задачи требуется тоже однозначное условие: интеграл от граничной функции по границе кольца равен нулю. Не возникает двух условий типа «интеграл по каждой окружности равен нулю», как можно было бы ожидать (поучительно подумать, почему это так!). Итак, получается следующий результат.

Теорема. *Внутренняя задача Неймана разрешима тогда и только тогда, когда* $\oint_{\partial G} f ds = 0$. Решение единствено с точностью до аддитивной константы. Таким образом, пространство решений одномерно.

Замечание. Рассмотрим линейный оператор $A: X \rightarrow Y$. В пространстве X имеется подпространство $\text{Ker } A$ — ядро оператора A , а в пространстве Y подпространство $\text{Im } A$ — образ оператора A .

Число $k = \dim \text{Ker } A$ есть число линейно независимых решений однородного уравнения $Au = 0$, а число $s = \text{codim } \text{Im } A$ есть число независимых условий, которые надо наложить на правую часть неоднородного уравнения $Au = f$, чтобы обеспечить разрешимость.

Обозначим также $c = \text{codim } \text{Ker } A$, $i = \dim \text{Im } A$. Имеем: $c + k = \dim X$, $i + s = \dim Y$. Кроме того, выполняется равенство $c = i$ (фактор по ядру отображается на образ изоморфино). Значит, $k - s = \dim X - \dim Y$.

Мы видим, что число $k - s$, называемое индексом оператора A , на самом деле не зависит от оператора, а определяется пространствами.

Иногда это наблюдение удается обобщить на бесконечномерные пространства. Это можно сделать при условии, что A достаточно хорошо приближается конечномерными операторами. В наших приложениях X, Y будут функциональными пространствами, потребуется достаточно хорошая аппроксимация конечными суммами рядов Фурье.


Посмотрим с этой точки зрения на наши краевые задачи.

В случае внутренней задачи Дирихле $s = 0$, $k = 0$, $s - k = 0$.

В случае внутренней задачи Неймана $s = 1$, $k = 1$, $s - k = 0$. Оказывается, в обеих задачах речь идет об отображении одних и тех же пространств.

Необходимость условия $\oint_{\partial G} f ds = 0$ для разрешимости внутренней задачи Неймана можно получить и исходя из соображений минимизации интеграла Дирихле. При $n = 2$ очевидно, например, что нормальная

Рис. 12.3. Нормальная производная гармонической функции не может быть положительной



производная не может быть положительной на всей границе, иначе нарушится принцип максимума, рис. 12.3. Если производная положительна, то появится особенность не меньше логарифмической, рис. 12.3.

Задача. Проведите интегрирование по частям в интеграле Дирихле $\int_G (\nabla u)^2 dx$ в многомерном случае и убедитесь, что условие $\oint_{\partial G} f ds = 0$ необходимо для разрешимости внутренней задачи Неймана.

4. Внешняя задача Неймана.

В двумерном случае внешнюю задачу можно свести к внутренней (в многомерном это не удается). Заметим, что при условии $\partial u / \partial n = 1$ на граничной окружности $r = 1$ внутренняя задача неразрешима, а внешняя имеет решение $\ln(1/r)$. Любую функцию на границе можно представить в виде суммы константы и функции с нулевым интегралом по границе. Инверсией можно свести внешнюю задачу к внутренней: производная по внешней нормали переходит в производную по внутренней нормали. Это верно для произвольной области: инверсия — конформное отображение, нормаль к граничной прямой переходит в нормаль к ее образу при инверсии.

Окончательный результат: без ограничения 4) решение не единственно; при условии 4) решение единствено, причем существует тогда и только тогда, когда $\oint_{\partial G} f ds = 0$.

То же верно в больших размерностях. При этом $s = 1$, $k = 1$, $k - s = 0$.

Доказательства всех перечисленных результатов о существовании и единственности решений краевых задач строятся следующим методом. Решение ищем в виде потенциала с неизвестной плотностью. Для этой плотности получается интегральное уравнение, разрешимость которого и доказывается.

Рассмотрим, например, внутреннюю задачу Дирихле. Решение ищем в виде потенциала двойного слоя с неизвестной плотностью ρ на границе. Обозначим значение потенциала на границе через $A\rho$, где A — линейный (интегральный) оператор из пространства функций на границе в себя. По теореме о скачке потенциала двойного слоя предельное значение потенциала внутри области при подходе к границе есть $A\rho + \lambda\rho$, где λ — постоянная, зависящая лишь от размерности (она равна π в двумерном и 2π в трехмерном случае). Границное условие Дирихле $u|_{\partial G} = f$ принимает поэтому вид уравнения $(A + \lambda E)\rho = f$ для плотности ρ .

Если бы пространство плотностей было конечномерным, мы сразу решили бы это уравнение: $\rho = (A + \lambda E)^{-1}$. Существование обратного оператора гарантируется тогда отсутствием ненулевого решения у однородного уравнения.

Единственность решения уравнения $(A + \lambda E)\rho = 0$ следует из принципа максимума, так как равная на границе области G нулью непрерывная в замыкании этой области и гармоническая внутри функция везде равна нулю. Поэтому, если бы пространство функций ρ было конечномерным, существование решения задачи Дирихле было бы доказано.

На самом деле это пространство бесконечномерно, но оператор A настолько хорошо аппроксимируется конечномерными, что вывод сохраняется.

Причина, по которой оператор A почти что конечномерен, состоит в следующем. Оператор переводит плотность ρ в значение потенциала на границе. Рассмотрим на границе точку x , рис. 12.4.




Рис. 12.4. Высокая гармоника дает малый вклад в значение потенциала в точке границы

Разложим плотность в ряд Фурье. Высокая гармоника этого ряда быстро осциллирует. Физически это означает наличие близких зарядов с противоположными знаками. Они действуют противоположно, поэтому такая гармоника вносит малый вклад в результат в точке x . Поэтому оператор A хорошо приближается конечномерными. Благодаря этому индекс оператора $A + \lambda E$ равен нулю, как для оператора из конечномерного пространства в себя, хотя этот оператор и действует в бесконечномерном пространстве плотностей.

В многомерном случае для сферической границы можно использовать вместо разложения Фурье разложение по сферическим функциям. Для других граничных многообразий используются аналогичные рядам Фурье локальные разложения вблизи каждой точки.

На этом мы заканчиваем наше краткое обсуждение вопросов существования и единственности решений основных краевых задач для уравнения Лапласа. Для аккуратного доказательства сформулированных результатов нужен аппарат теории интегральных уравнений Фредгольма, для построения которого в этих лекциях нет времени. Краткое его изложение имеется, например, в учебнике Г. Е. Шилова «Введение в теорию линейных пространств».

ЛИНЕЙНЫЕ УРАВНЕНИЯ С ЧАСТНЫМИ ПРОИЗВОДНЫМИ И ИХ СИМВОЛЫ

Вернемся к общей теории дифференциальных уравнений. Напомню вначале общее понятие линеаризации. Начнем с обыкновенного дифференциального уравнения, заданного векторным полем v в фазовом пространстве. Пусть x_0 — положение равновесия дифференциального уравнения $\dot{x} = v(x)$, т. е. $v(x_0) = 0$. Тогда в окрестности точки x_0 можно поставить задачу о малых колебаниях вокруг положения равновесия, описываемых линеаризованной системой: $\dot{y} = Ay$, $A = \frac{\partial v}{\partial x}\Big|_{x=x_0}$, рис. 12.5.




Рис. 12.5. Линеаризация
в окрестности положения
равновесия

Замена уравнения $\dot{x} = v(x)$ уравнением $\dot{y} = Ay$ называется *линеаризацией* системы в точке x_0 . Линеаризованное векторное поле живет в касательном пространстве исходного фазового пространства в положении равновесия. Оно не зависит от системы координат, используемой при вычислении матрицы Якоби $\frac{\partial v}{\partial x}\Big|_{x_0}$.

В случае уравнений с частными производными такое происхождение имеет задача о малых колебаниях сплошной среды (струны, мембранны и т. п.). Это линеаризация соответствующего уравнения динамики сплошной среды, имеющего фазовым пространством бесконечномерное пространство положений и скоростей точек среды. В линеаризованных задачах о малых колебаниях сплошной среды роль оператора A играют линейные операторы с частными производными, причем они могут быть как угодно высокого порядка.

Неизвестная функция может быть не скалярной, а векторной (представьте себе, например, струну в трехмерном пространстве: ее отклонение от равновесного состояния в каждой точке — вектор, имеющий 2 компоненты, координаты в нормальном струне направлении).

Для описания подобных ситуаций в общем виде следует рассмотреть векторное расслоение, база которого — многообразие независимых переменных. Значения неизвестных функций («полей», как говорят физики) определяют сечение этого расслоения. При локальном изучении можно записать все в координатах и считать, что $x \in \mathbb{R}^n$, $u \in \mathbb{R}^r$. В физике компоненты вектора u называются полями, r — число полей, $n = D + 1$, где D — физическая размерность, единица отводится на время.

Линейный дифференциальный оператор в системе координат (x_1, \dots, x_n) имеет вид многочлена от операторов $\partial/\partial x_i$ с зависящими от x коэффициентами, т. е. вид

$$P(\partial, x) = \sum_{|\alpha|=0}^m a_\alpha(x) \partial^\alpha,$$

где

$$\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{Z}_+^n, \quad |\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_n,$$

$$\partial^\alpha = \frac{\partial^{|\alpha|}}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_n^{\alpha_n}}.$$

Число $m = \max |\alpha|$ называется порядком оператора. Такой оператор действует на скалярные функции ($r = 1$). Если полей несколько ($r > 1$), то обычно возникают «матричные» дифференциальные операторы со значениями в векторном расслоении над той же базой, что и исходные поля. Обычно размерность слоя — такая же, как число исходных

полей r , т. е. число уравнений равно числу неизвестных функций. В локальных координатах оператор $u \mapsto v$ записывается в виде системы

$$\begin{aligned} v_1 &= P_{11}(\partial, x)u_1 + \dots + P_{1r}(\partial, x)u_r \\ &\dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \\ v_r &= P_{r1}(\partial, x)u_1 + \dots + P_{rr}(\partial, x)u_r. \end{aligned}$$

Обозначим $\mathcal{P}(\partial, x)$ всю матрицу из операторов $P_{jl}(\partial, x)$, получим короткую матричную запись $v = \mathcal{P}(\partial, x)u$. Здесь \mathcal{P} — матрица из многочленов от $\partial/\partial x_i$ с зависящими от x коэффициентами.

Пример. Уравнения Коши–Римана имеют вид

$$0 = \begin{pmatrix} \partial_x & -\partial_y \\ \partial_y & \partial_x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix},$$

здесь $r = 2$, матрица кососимметрическая, степень многочленов $m = 1$, их коэффициенты — постоянные.

Рассмотрим, более общим образом, важный частный случай, когда дифференциальные операторы \mathcal{P} инвариантны относительно сдвигов по x , т. е. когда все коэффициенты $a_\alpha(x)$ постоянны.

Происхождение этого случая такое. Если известно, что поля меняются плавно, то при локальном изучении можно в первом приближении применить операцию замораживания коэффициентов, т. е. переход к уравнениям с постоянными коэффициентами, равными значениям коэффициентов в рассматриваемой точке. Для медленно меняющихся полей замораживание дает достаточно хорошее приближение.

Итак, рассмотрим операторы с постоянными коэффициентами: $A = \mathcal{P}(\partial)$. Оказывается, такие уравнения решаются, причем получается чисто алгебраическая теория. Пусть, для простоты, $r = 1$ (рассматривается одно уравнение с одной неизвестной функцией).

Рассмотрим сдвиги $T_s: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $T_s x = x + s$. Операторы $A = \mathcal{P}(\partial)$ и T_s действуют на функции и коммутируют между собой: $A T_s = T_s A$. Значит, они имеют общие собственные векторы. Какие собственные функции у сдвигов? Считаем, что наши функции комплекснозначные.

На окружности функции представляются рядами Фурье. Чем длинее сворачиваемый в окружность отрезок, тем ближе расположены частоты, участвующие в представлении. А именно, для отрезка длины L участвуют частоты $\kappa = 2\pi l/L$, рис. 12.6.




Рис. 12.6. В разложение Фурье входят близкие частоты

Следует ожидать, что при растягивании отрезка на всю прямую ряд превратится в интеграл; тем самым мнимые экспоненты образуют «континуальный базис»: e^{ikx} , k пробегает двойственное пространство $(\mathbb{R}^n)^*$ (в физике k называется волновым вектором). Функции $e_k = e^{ikx}$ называют (гармоническими) плоскими волнами, они являются собственными функциями операторов сдвига и дифференцирования:

$$T_s e_k = \lambda_k e_k, \quad \lambda_k = e^{iks}, \quad \partial^\alpha e_k = (ik)^\alpha e_k.$$

Мы видим, что $Ae_k = P(ik)e_k$, т. е. каждая гармоническая плоская волна является собственной функцией любого линейного дифференциального оператора с постоянными коэффициентами, причем собственное число — многочлен от волнового вектора.

В случае r полей вычисления аналогичны: умножив экспоненту на амплитуду $w \in \mathbb{R}^r$, получим $\mathcal{P}(\partial)we_k = (\mathcal{P}(ik))we_k$. Здесь $\mathcal{P}(ik)$ — матрица, элементы которой — многочлены.

Упражнение. Найдите эту матрицу для оператора Коши–Римана.

Ответ: $\begin{pmatrix} ik_1 & -ik_2 \\ ik_2 & ik_1 \end{pmatrix}$.

Для каждого волнового вектора k и каждого дифференциального оператора $P(\partial)$ с постоянными коэффициентами имеется, вообще говоря, r собственных векторов w_j оператора $P(ik)$. Каждый из них определяет гармоническую плоскую волну с волновым вектором k вида $w_j e_k$, являющуюся собственным вектором матричного дифференциального оператора $A = \mathcal{P}(\partial)$. Физически плоские волны $w_j e_k$ с данным волновым вектором k имеют общие фронты, но различные «поляризации» $w_j \in \mathbb{R}^r$.

При $r = 1$ имеем один дифференциальный оператор $P(\partial)$, полином $P(ik)$ от волнового вектора k называется *символом* этого оператора. Старший член символа называется *главным символом*.

Например, символ оператора Лапласа в \mathbb{R}^n равен $-k_1^2 - \dots - k_n^2$ и совпадает с его главным символом. Символ обычно обозначают буквой σ , например, для оператора Лапласа $\sigma = -k^2$.

Для матричного оператора матрица из символов называется *матричным символом* оператора.

Символом системы называется определитель матричного символа. Например, символ системы Коши – Римана равен

$$\det \begin{pmatrix} ik_1 & -ik_2 \\ ik_2 & ik_1 \end{pmatrix} = -k_1^2 - k_2^2,$$

т. е. совпадает с символом оператора Лапласа на плоскости.

Главным символом системы называется главная однородная часть ее символа. В физике воли соответствующее понятие обычно называется дисперсионным соотношением.

Замечание. Главный символ определен инвариантно, т. е. не зависит от системы координат, использованной для его построения: он является однородным многочленом от компонент кокасательного вектора k пространства независимых переменных. Инвариантность главного символа означает независимость от системы координат его значения на каждом кокасательном векторе. Полный символ не инвариантен. Например, у оператора Лапласа после замены переменных могут добавиться члены первого порядка. Можно усмотреть инвариантность главного символа из следующих соображений (для простоты ограничимся скалярным случаем, $r = 1$). Подействуем оператором на гармоническую плоскую волну e_k :

$$P(\partial, x) e_k = \sigma_m(k) + \sigma_{m-1}(k) + \dots,$$

где коэффициенты полиномов могут зависеть от x . Пусть $k \rightarrow \infty$. Если $\sigma_m \neq 0$, то это главный член асимптотики значения оператора на высокочастотной плоской волне. Сделав в функции $e_k(x)$ гладкую замену переменной x , легко проверить, что эта асимптотика зависит лишь от вектора k , но не от системы координат.

Алгебраические свойства главного символа оказывают решающее влияние на свойства соответствующего дифференциального уравнения, и в этом смысле теория дифференциальных уравнений может рассматриваться как ветвь алгебраической геометрии.

Пример. Пусть функцию f на многообразии можно разложить в ряд по экспонентам (например, на окружности, торе): $f = \sum f_k e_k$. Ищем решение уравнения $\Delta u = f$ в виде ряда $u = \sum u_k e_k$. Получаем

$-k^2 u_k = f_k$, $u_k = -f_k/k^2$. Очевидно, что ряд $\sum u_k e_k$ сходится, более того, гладкость u возросла на два порядка по сравнению с гладкостью f .

То же рассуждение проходит для любого линейного оператора порядка m с постоянными коэффициентами, если $|\sigma_m(k)| \geq C|k|^m$.

Такой оператор называется *эллиптическим*. Мы видим, что из-за эллиптичности бесконечномерность задачи фактически исчезает, способ решения чисто алгебраический.

Оператор с переменными коэффициентами называется *эллиптическим*, если он становится эллиптическим при замораживании коэффициентов в любой точке.

Пример. Оператор Лапласа $\operatorname{div} \operatorname{grad}$ на любом римановом многообразии (например, на поверхности сферы) — эллиптический (докажите!).

Для эллиптического оператора $P(\partial, x)$ с переменными коэффициентами предыдущие формулы не дают точного решения уравнения $Pu = f$. Однако, замораживая коэффициенты, можно получить достаточно хорошее приближение к решению эллиптического уравнения $Pu = f$ на компактном многообразии.

Выбирая в качестве f «волновые пакеты» вроде $f = e^{-sx^2} e_k(x)$, можно использовать при больших k приближенное решение $u = f/\sigma_m(k)$. Быстрое убывание u при $k \rightarrow \infty$ гарантирует «почти конечномерность» задачи. Из-за этого теория эллиптических уравнений и краевых задач даже и в случае переменных коэффициентов почти столь же близка к конечномерной линейной алгебре, как и соответствующие теории для оператора Лапласа, с которыми мы познакомились выше.

Если оператор не эллиптический (например, волновой), то этот способ непосредственно не пройдет, но можно его модифицировать.

Задача 1. Найти многообразие нулей главного символа волнового уравнения

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}.$$

Ответ. Это квадратичный конус в \mathbb{R}^3 («световой конус»).

Задача 2. Пусть квадратичная форма $\sum a_{pq} k_p k_q$ положительно определена. При каких значениях скорости c и волнового вектора k волновое уравнение

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \sum a_{pq} \frac{\partial^2 u}{\partial x_p \partial x_q}$$

имеет решение вида плоской волны $e^{\omega t - kx}$, бегущей в направлении вектора k со скоростью c ?

Задача 3. Найдите многообразие нулей главного символа системы уравнений Максвелла

а) в вакууме:

$$\frac{\partial E}{\partial t} = \operatorname{rot} H, \quad \frac{\partial H}{\partial t} = -\operatorname{rot} E,$$

б) в однородной неизотропной среде.

Указание. См. книгу Куранта и Гильберта «Уравнения математической физики».

Задача 4. Найти многообразие нулей главного символа системы уравнений Дирака для четырех комплексных функций u_j четырех переменных x_i :

$$\sum_{k=1}^4 \alpha_k (\partial/\partial x_k - a_k) u - \beta b u = 0,$$

где

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & i & 0 \\ 0 & -i & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \\ \alpha_3 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_4 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \\ \beta &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ i & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Общая схема теории распространения волн, определяемых системами линейных уравнений с частными производными, такова.

Множество нулей главного символа является полем конусов в ко-касательных пространствах пространства-времени. Переходя к проектировизации (или к сферизации), мы получаем «гиперповерхность Френеля» медлительностей в многообразиях контактных элементов пространства-времени.

Геометрическая оптика (т. е. теория лучей и фронтов), заданная этой гиперповерхностью (см. лекцию 2), приближенно описывает (при некоторых условиях) коротковолновые асимптотики (в физике называемые также квазиклассическими), т. е. поведение волн, длина которых мала по сравнению с геометрическими размерами системы (например, с расстояниями, на которых заметно меняются коэффициенты системы).

Основным из условий является условие *гиперболичности*, которое состоит в следующем. Рассмотрим алгебраическую гиперповерхность степени d в m -мерном вещественном проективном пространстве. Гиперповерхность называется *гиперболической* по отношению к точке, если каждая вещественная прямая, проходящая через эту точку, пересекает гиперповерхность в d вещественных точках. Если все эти точки попарно различны, то поверхность называется *строго гиперболической*.

Пример. Эллипс строго гиперболичен относительно своих внутренних точек, нестрого гиперболичен относительно граничных точек и не гиперболичен относительно внешних точек.

Условие гиперболичности системы состоит в том, что гиперповерхность медлительностей в проективном пространстве контактных элементов в каждой точке пространства-времени должна быть гиперболической относительно временной точки.

Здесь временная точка — это проективизация вектора dt касательного пространства к пространству-времени (соответствующий контактный элемент — касательная гиперплоскость изохроны).

Строго гиперболическая поверхность четной степени $2n$ состоит из n диффеоморфных сфере и расположенных один внутри другого овалоидов — от ближайшего к временной точке до самого далекого. Физически эти компоненты соответствуют различным «модам» или типам волн, способных распространяться в данной среде. Например, в упругой среде бывают продольные и поперечные волны. Продольная и поперечная волны, распространяющиеся в одном и том же направлении, имеют, вообще говоря, разные скорости.

Ближайший к временной точке овалоид соответствует самой медленной волне, следующий — более быстрой, и т. д. до приходящей первой, самой быстрой волны, соответствующей самому внешнему из овалоидов. Это видно из того, в каком порядке идут точки пересечения соответствующих конусов с вершиной O с времяподобной мировой линией $q = c$, расположенной рядом с O . Ближайшая к изохроне точка

пересечения соответствует наименьшему времени t прихода возмущения из O в с и, следовательно, самой быстрой волне.

Следует иметь в виду, что каждому направлению соответствуют две волны одного типа: одна распространяется вперед, а другая назад (соответствующие волновые векторы противоположны).

Пример. Для волнового уравнения $2n = 2$, мода одна, и каждому направлению в физическом пространстве соответствуют ровно две волны, распространяющиеся по этому направлению в противоположные стороны.

Обоснование коротковолновых асимптотик и, в частности, перехода «физической» оптики волновых уравнений в геометрическую оптику уравнения эйконала выходит за рамки этих лекций. Замечу только, что последовательное проведение этой программы приводит к появлению в асимптотических формулах интересных топологических инвариантов — так называемых индексов Маслова, описывающих «потерю четверти волны при прохождении луча у каустики» и проявляющихся в квантовой механике в виде поправки $(1/2)$ к условию квантования Бора–Зоммерфельда. Общая формулировка условий квантования приводит, таким образом, к топологическому объекту — характеристическому классу Маслова на лагранжевых подмногообразиях симплектического фазового пространства.

Задача. Перенести формулу Вейля (асимптотику числа собственных функций с собственными числами, меньшими E) на случай гиперболических систем.

Приложение 1

ТОПОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕМЫ МАКСВЕЛЛА О МУЛЬТИПОЛЬНОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ СФЕРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ

Здесь приведено доказательство теоремы Максвелла о мультипольном представлении сферических функций. В частности, доказывается, что функции, допускающие такое представление, образуют линейное пространство. Именно это утверждение осталось недоказанным выше (лекция 11, с. 130).

Одновременно мы докажем ряд интересных топологических и алгебраических следствий теоремы Максвелла (впервые доказанной, по-видимому, Сильвестром в малоизвестной заметке, содержащей также как основной идеологический принцип трактата Бурбаки, так и предостережение об опасности злоупотребления формализацией математики).

Вспомним утверждение теоремы (см. с. 117 и 127):

Теорема 1. *Ограничение на сферу n -кратной производной функции $1/r$ вдоль n постоянных (инвариантных относительно сдвигов) векторных полей на \mathbb{R}^3 совпадает с некоторой сферической функцией степени n . Любая ненулевая сферическая функция степени n может быть получена таким образом при помощи некоторого набора из n ненулевых векторных полей. По заданной функции эти поля определяются однозначно (с точностью до умножения на ненулевую константу и перестановки полей).*

Сферические функции степени n образуют линейное пространство размерности $2n + 1$.

Множество функций, представимых мультипольной конструкцией, описанной в теореме, априори представляется существенно нелинейным. Из теоремы вытекает, что образом соответствующего полилинейного отображения является линейное пространство. Утверждение единственности в теореме можно переформулировать в чисто топологических терминах.

Теорема 2. Конфигурационное пространство n (быть может совпадающих) неразличимых точек на вещественной проективной плоскости (т. е. n -я симметрическая степень $\text{Sym}^n(\mathbb{R}P^2)$) диффеоморфно вещественному проективному пространству размерности $2n$:

$$\text{Sym}^n(\mathbb{R}P^n) \approx \mathbb{R}P^{2n}.$$

Симметрические степени неориентируемых поверхностей были (независимо от Максвелла) вычислены Ж. Дюпоном и Г. Люстигом [4].

Замечание. Теорема 2 родственна проективной теореме Виета

$$\text{Sym}^n(\mathbb{C}P^1) \approx \mathbb{C}P^n$$

и является, в некотором смысле, ее кватернионной версией.

Рассматривая сферу Римана $\mathbb{C}P^1$ как двулистное накрытие вещественного проективного пространства, получаем, в качестве следствия, алгебраическое отображение $r: \mathbb{C}P^n \rightarrow \mathbb{R}P^{2n}$ кратности 2^n , обобщающее на большие размерности классическую теорему

$$\mathbb{C}P^2/\text{conj} \approx S^4.$$

1. ОСНОВНЫЕ ПРОСТРАНСТВА И ГРУППЫ

Рассмотрим n -мерное арифметическое кватернионное пространство $\mathbb{H}^n = \bigoplus \mathbb{H}_p^1$ с его обычной i -комплексной структурой ($i(ae+bi+cj+dk) = ai - be + ck - dj$). Умножение слева на j действует на \mathbb{H}_p^1 , сохраняя комплексные прямые. Оно отправляет каждую прямую в эрмитово-ортогональную к ней прямую и действует на $\mathbb{C}P_p^1 = (\mathbb{H}_p^1 \setminus 0)/\mathbb{C}^*$ как антиголоморфная инволюция σ_p , не имеющая неподвижных точек.

Рассмотрим группу Кокстера $B(n)$, действующую на произведении $(\mathbb{C}P^1)^n$ перестановками сомножителей и отображениями σ_p на некоторых сомножителях.

Теорема 3. Пространство орбит действия $B(n)$ на $(\mathbb{C}P^1)^n$ является $2n$ -мерным вещественным проективным пространством:

$$(\mathbb{C}P^1)^n/B(n) \approx \mathbb{R}P^{2n}.$$

Пространство орбит группы перестановок $S(n)$ является, согласно теореме Виета, комплексным проективным пространством:

$$(\mathbb{C}P^1)^n/S(n) = \text{Sym}^n(\mathbb{C}P^1) = \mathbb{C}P^n.$$

Таким образом, мы получили естественное отображение $r: \mathbb{C}P^n \rightarrow \mathbb{R}P^{2n}$ (отображающее орбиту ξ подгруппы $S(n)$ в орбиту $r(\xi)$ группы $B(n)$, содержащую ξ).

Группа $B(n)$ содержит также интересную подгруппу $\mathbb{Z}_2 \times S(n)$ (перестановок и перестановок, сопровождаемых антиголоморфными инволюциями σ_p на каждом сомножителе). Произведение инволюций σ_p действует на $(\mathbb{C}P^1)^n/S(n)$ как инволюция $\sigma \in \mathbb{Z}_2$.

Включения групп $S(n) \rightarrow \mathbb{Z}_2 \times S(n) \rightarrow B(n)$ порождают отображения пространств орбит

$$(\mathbb{C}P^1)^n/S(n) \xrightarrow{\alpha} (\mathbb{C}P^1)^n/(S(n) \times \mathbb{Z}_2) \xrightarrow{\beta} (\mathbb{C}P^1)^n/B(n)$$

кратности, соответственно, 2 и 2^{n-1} .

Инволюция $\sigma: (\mathbb{C}P^1)^n/S(n) \rightarrow (\mathbb{C}P^1)^n/S(n)$ переставляет прообразы $\alpha^{-1}(\cdot)$.

Теорема 4. При четных n инволюция σ действует на $(\mathbb{C}P^1)^n/S(n) \approx \mathbb{C}P^n$ как комплексное сопряжение conj .

Таким образом, для четных n получаем вещественные алгебраические отображения

$$\mathbb{C}P^n \xrightarrow{\alpha} \mathbb{C}P^n/\text{conj} \xrightarrow{\beta} \mathbb{R}P^{2n}$$

кратности, соответственно, 2 и 2^{n-1} .

Замечание. При $n = 2$ второе пространство является гладким (см., например, [1] и [2]; вероятно это было известно даже до публикации [2]),

$$\mathbb{C}P^2/\text{conj} \approx S^4.$$

В этом случае кратность β равна 2.

Инволюция, переставляющая два прообраза, действует на S^4 как антиподальная инволюция.

Я благодарен С. Дональдсону за это замечание, показывающее, что (странный) теорема Максвелла в некотором смысле является многомерным обобщением (не менее странной) теоремы $\mathbb{C}P^2/\text{conj} \approx S^4$.

Ниже мы покажем, что теорема Максвелла доставляет явную формулу для диффеоморфизма $\mathbb{C}P^2/\text{conj} \rightarrow S^4$.

Замечание. В большинстве случаев, утверждая, что два многообразия «совпадают», мы будем явно указывать только вещественный алгебраический гомеоморфизм между этими многообразиями. Педантическая проверка того, что эти гомеоморфизмы могут быть сглажены, в некоторых случаях оставляется читателю (см., однако, п. 4).

2. НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕМЫ ВЕЩЕСТВЕННОЙ АЛГЕБРАИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ

Рассмотрим вещественный однородный многочлен f степени n от трех переменных (x, y, z) . Теорема Максвелла имеет следующее странное алгебраическое следствие.

Теорема 5. *Любой вещественный однородный многочлен f степени n единственным образом можно представить в виде суммы двух таких многочленов, один из которых есть произведение n линейных вещественных сомножителей, а другой делится на $x^2 + y^2 + z^2$.*

В частности, любая вещественная алгебраическая кривая степени n в метрической проективной плоскости определяет n вещественных «главных осей», инвариантно связанных с кривой.

Доказательство. Вещественное уравнение $x^2 + y^2 + z^2 = 0$ задает в $\mathbb{C}P^2$ вещественную кривую S , не имеющую вещественных точек. Эта кривая, называемая мнимой окружностью, рациональна и топологически является сферой. Комплексное сопряжение отправляет S в себя и действует на ней как антиголоморфная инволюция, не имеющая неподвижных точек (это — обычная антипodalная инволюция S^2).

Уравнение $f = 0$ задает в $\mathbb{C}P^2$ вещественную алгебраическую кривую K степени n . Комплексное сопряжение $\text{conj}: \mathbb{C}P^2 \rightarrow \mathbb{C}P^2$ отображает K в себя и переставляет $2n$ точек пересечения K с S .

Каждая пара сопряженных точек пересечения задает прямую, их соединяющую (точки отличны друг от друга, поскольку conj не имеет неподвижных точек на S^2). Эта прямая вещественна (поскольку conj переставляет две принадлежащие ей точки) и может быть задана некоторым уравнением $ax + by + cz = 0$ с вещественными коэффициентами.

Рассмотрим произведение g полученных таким образом n вещественных линейных функций. Мы докажем, что f пропорционально g вдоль S .

Однородный многочлен f равен нулю в $2n$ общих точках кривых K и S . Кривая S рациональна. Выберем некоторый рациональный параметр t (например, $x = 2t$, $y = t^2 - 1$, $z = i(t^2 + 1)$). Выбирая подходящим образом координаты, мы можем исключить случай, когда $t = \infty$ является одной из точек пересечения S с K . Многочлены $f(x(t), y(t), z(t))$ и $g(x(t), y(t), z(t))$ степени $2n$ имеют $2n$ общих корней, причем $g \neq 0$. Следовательно, вдоль S выполняется равенство $f = cg$, $c = \text{const}$.

Таким образом, однородный многочлен $f - cg$ на S равен нулю, т. е. он имеет вид $(x^2 + y^2 + z^2)h(x, y, z)$, где h есть вещественный однородный многочлен степени $n - 2$. Теорема доказана.

Замечание. Единственность разложения $f = cg + (x^2 + y^2 + z^2)h$ можно доказать независимо от доказательства существования. Предположим, что имеется второе разложение $f = c'g' + (x^2 + y^2 + z^2)h'$. Тогда $c'g' - cg = (x^2 + y^2 + z^2)h''$, где g и g' являются произведениями n линейных сомножителей. Пусть $g = 0$ на прямой l . На этой прямой многочлен $c'g'$ имеет n вещественных корней и равен правой части предыдущей формулы, имеющей не более $n - 2$ вещественных корней. Таким образом, $c'g' \equiv 0$, $h'' = 0$ на l . Следовательно, мы можем разделить все три многочлена на уравнение l и доказать единственность индукцией по n . (При $n = 1$ все очевидно, так как $cg = c'g'$, поскольку $h'' = 0$.)

Рассмотрим проективное пространство $\mathbb{R}P^N$ вещественных алгебраических кривых степени n ($N = n(n + 3)/2$).

Вещественные алгебраические кривые, состоящие из n вещественных прямых, образуют в этом проективном пространстве замкнутое вещественное алгебраическое многообразие T размерности $2n$ (образ $(\mathbb{R}P^2)^n$ при полилинейном отображении). Кривые, содержащие S , образуют проективное подпространство $P = \mathbb{R}P^M$, $M = (n - 2)(n + 1)/2$. В этих терминах теорема 5 принимает следующий вид.

Теорема 6. *Многообразия T и P в $\mathbb{R}P^N$ зацеплены с коэффициентом зацепления 1 таким образом, что через любую точку из $\mathbb{R}P^N$, не принадлежащую объединению T с P , проходит единственная вещественная проективная прямая, связывающая T с P . Эта прямая пересекает T (так же, как и P) в одной точке.*

Теперь легко доказать теорему 2.

Доказательство теоремы 2. Рассмотрим пространство H размерности $M + 1$, содержащее M -мерное проективное пространство P . Любое такое пространство пересекает T . Действительно, вы-

берем точку O на H , не принадлежащую ни P , ни T . Прямая, соединяющая O с T и с P , принадлежит H и пересекает T .

Точка пересечения единственна. В противном случае на точке H была бы точка O , через которую проходили бы две прямые, соединяющие T с P .

Таким образом, мы построили гомеоморфизм между $T \approx \text{Sym}^n(\mathbb{R}P^2)$ и многообразием пространств H размерности $M + 1$, содержащих P . Последнее многообразие — это $\mathbb{R}P^{N-M-1}$, что (по крайней мере на топологическом уровне) доказывает теорему 2, поскольку $N - M - 1 = 2n$.

3. ОТ АЛГЕБРАИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ К СФЕРИЧЕСКИМ ФУНКЦИЯМ

Производные гармонической функции вдоль постоянных векторных полей, очевидно, являются гармоническими функциями. Таким образом, все кратные производные функции $1/r$ являются гармоническими вне 0 . Следующие леммы доказаны в лекции 11 (с. 127).

Лемма 1. *n -я производная функции $1/r$ вдоль n постоянных векторных полей имеет вид P/r^{2n+1} , где P — однородный многочлен степени n .*

Лемма 2. *Однородный многочлен P из леммы 1 является гармонической функцией.*

Эта лемма вытекает из классической теоремы об инверсии, которую я здесь напомню. Гармоническая функция P/r^{2n+1} является однородной, степени $-(n + 1)$. На единичной сфере она совпадает с P . Из этого следует, что продолжение этой функции с единичной сферы на все пространство в виде однородной функции степени n также является гармонической функцией. Это продолжение есть в точности P .

Для доказательства теоремы об инверсии рассмотрим сферический лапласиан $\tilde{\Delta}$ — оператор div grad на единичной сфере. Мы продолжим его на однородные функции степени k на $\mathbb{R}^m \setminus \{0\}$ таким образом, что любая однородная функция F степени k переводится им в однородную функцию $\tilde{\Delta}F$ этой же степени.

Согласно лекции 11 (с. 119) для любой однородной функции F степени k

$$\tilde{\Delta}F = r^2 \Delta F - \Lambda F, \quad \text{где } \Lambda = k^2 + k(m - 2).$$

Из этой формулы следует, что

- (i) Ограничение гармонической однородной функции степени k на единичную сферу в \mathbb{R}^m является собственной функцией сферического лапласиана, отвечающей собственному значению $-\Lambda$.
- (ii) Собственная функция сферического лапласиана, отвечающая собственному значению $-\Lambda$, при продолжении ее со сферы до однородной функции степени k на $\mathbb{R}^m \setminus \{0\}$ становится гармонической.
- (iii) Для любой степени однородности k в \mathbb{R}^m существует двойственная ей степень $k' = 2 - m - k$ такая, что однородная гармоническая функция степени k остается гармонической, если мы ограничим ее на сферу, а затем продолжим как однородную функцию двойственной степени. При $m = 3$ условие двойственности имеет вид $k + k' = -1$.

В частности, P/r^{2n+1} из леммы 1 имеет степень $k = -(1+n)$, $m = 3$, т. е. двойственная степень равна $k' = n$, откуда и следует лемма 2.

Лемма 3. Любую сферическую функцию степени n на S^2 можно представить в виде $f(X, Y, Z)(1/r)$, где f — однородный многочлен степени n , а $X = \partial/\partial x$, $Y = \partial/\partial y$, $Z = \partial/\partial z$, $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$.

Доказательство. Пространство гармонических однородных многочленов степени n линейно. В нем содержится подпространство гармонических многочленов, ограничения которых представимы в виде, указанном в лемме 3 (по леммам 1 и 2). Это пространство, очевидно, инвариантно относительно поворотов. Но представление $SO(3)$ в пространстве сферических функций степени n неприводимо (любая функция может быть получена из многочлена Лежандра степени n при помощи поворотов и взятия линейных комбинаций повернутых функций).

Таким образом, подпространство из леммы 3 совпадает со всем пространством сферических функций степени n .

Лемма 4. Любую сферическую функцию степени n можно представить в виде $f_T(X, Y, Z)(1/r)$, где $f_T = \prod_{i=1}^n (\alpha_i X + \beta_i Y + \gamma_i Z)$ есть произведение n вещественных линейных сомножителей.

Доказательство. Согласно теореме 5, существует разложение $f(x, y, z) = f_T(x, y, z) + g(x, y, z)(x^2 + y^2 + z^2)$. Применяя это разло-

жение к представлению леммы 3, получаем

$$f(X, Y, Z)(1/r) = f_T(X, Y, Z)(1/r) + 0,$$

поскольку $X^2 + Y^2 + Z^2 = \Delta$, а $\Delta(1/r) = 0$. Таким образом, любая сферическая функция обладает мультипольным представлением теоремы 1.

Лемма 5. *Мультипольное представление единственно (т. е. многочлен f_T однозначно определен сферической функцией).*

Доказательство. Предположим, что f_T и f'_T — такие полностью разложимые многочлены, что

$$f_T(X, Y, Z)(1/r) = f'_T(X, Y, Z)(1/r).$$

Согласно лемме 1 (используемой n раз),

$$\begin{aligned} f_T(X, Y, Z)(1/r) &= (cf_T(x, y, z) + r^2 g)r^{-(2n+1)}, & c \neq 0, \\ f'_T(X, Y, Z)(1/r) &= (c' f'_T(x, y, z) + r^2 g')r^{-(2n+1)}, & c' \neq 0. \end{aligned}$$

Следовательно, $f_T(x, y, z) - f'_T(x, y, z) = r^2 h(x, y, z)$. Однако, по теореме 5, это возможно только если $f_T = f'_T$. Теорема 1, таким образом, доказана.

4. ЯВНЫЕ ФОРМУЛЫ

Кватернионное левое умножение на j отправляет вектор $(z, w) = zj + we$ из $\mathbb{C}^2 \approx \mathbb{H}^1$ в $(\bar{w}, -\bar{z})$. Этот вектор эрмитово-ортогонален исходному.

Мы получаем, таким образом, явную формулу $t \mapsto -1/\bar{t}$ для антиголоморфной инволюции $\mathbb{C}P^1$, не имеющей неподвижных точек.

Мы можем использовать пары эрмитово-ортогональных прямых в \mathbb{C}^2 для параметризации точек из $\mathbb{R}P^2$. Таким образом мы выведем теорему 3 из теоремы 2. Далее мы выпишем явные формулы для диффеоморфизма

$$\text{Sym}^n(\mathbb{R}P^2) \approx \mathbb{R}P^{2n}$$

из теоремы 2, используя в качестве координат на $\text{Sym}^n(\mathbb{R}P^2)$ наборы из n пар эрмитово-ортогональных прямых в \mathbb{C}^2 .

Рассмотрим сначала случай $n = 1$.

Каждой паре (z, w) и $(\bar{w}, -\bar{z})$ эрмитово-ортогональных векторов из \mathbb{C}^2 сопоставим квадратичную форму на двойственном пространстве,

являющуюся произведением линейных форм, представляемым этими векторами:

$$f = (zx + wy)(\bar{w}x - \bar{z}y) = f_0x^2 + f_1xy + f_2y^2.$$

Здесь (x, y) — координаты на двойственной плоскости \mathbb{C}^2 . Таким образом, коэффициенты квадратичной формы f имеют вид:

$$f_0 = z\bar{w}, \quad f_1 = w\bar{w} - z\bar{z}, \quad f_2 = -\bar{z}w.$$

Заметим, что коэффициент f_1 вещественен, в то время как $f_2 = -\bar{f}_0$. Будем рассматривать f_0 и f_1 в качестве координат на пространстве \mathbb{R}^3 форм f .

Умножение исходного вектора (z, w) на комплексное число приводит к умножению получающегося вектора на квадрат абсолютной величины этого числа. Таким образом, получаем отображение

$$F: \mathbb{C}P^1 \rightarrow S^2 = (\mathbb{R}^3 \setminus 0)/\mathbb{R}^+,$$

переводящее комплексные прямые из \mathbb{C}^2 в вещественные лучи из \mathbb{R}^3 .

Выбранную точку (z, w) на комплексной прямой отображение (f_0, f_1) отправляет во вполне определенную точку луча. Например, выбирая $z = t$, $w = 1$, получаем $f_0 = t$, $f_1 = 1 - t\bar{t}$.

Если исходная точка на прямой нормирована условием $|z|^2 + |w|^2 = 1$, то ее образ лежит на эллипсоиде $|2f_0|^2 + |f_1|^2 = 1$ (который мы также можем называть сферой, рассматривая в качестве координат $2f_0$ и f_1).

Таким образом, сфера Римана $\mathbb{C}P^1 = S^3/S^1$ диффеоморфизом $(2f_0, f_1)$ отображается на единичную сферу в \mathbb{R}^3 с координатами $2f_0$ и f_1 . Рассматривая $t = z/w$ в качестве координаты на $\mathbb{C}P^1$, получаем отображение t -плоскости на единичную сферу в \mathbb{R}^3 , являющееся, в частности, стереографической проекцией. Формулы, которые мы выписываем ниже, являются в этом смысле многомерными обобщениями стереографической проекции.

Заменяя исходную прямую в $\mathbb{C}P^2$ эрмитово-ортогональной, получаем изменение знака отображения F . Действительно, замена z на \bar{w} , а w на $-\bar{z}$, изменяет знак как перед f_0 , так и перед f_1 . Таким образом, F преобразует инволюцию $j: \mathbb{C}P^1 \rightarrow \mathbb{C}P^1$ (отображающую каждую прямую в ее эрмитово дополнение) в антиподальную инволюцию сферы S^2 в пространстве \mathbb{R}^3 .

Применим теперь аналогичную конструкцию к n -й симметрической степени пространства $\mathbb{R}P^2$. Начнем с n -й симметрической степени $\mathbb{C}P^1$. По определению, точкой этого комплексного многообразия

$$\text{Sym}^n(\mathbb{C}P^1) \approx \mathbb{C}P^n$$

является (неупорядоченное) множество, состоящее из n прямых в \mathbb{C}^2 .

Выбирая n ненулевых векторов (z_k, w_k) и перемножая соответствующие линейные формы на двойственной плоскости, получим бинарную n -форму

$$H(x, y) = \prod_{k=1}^n (z_k x + w_k y) = h_0 x^n + \dots + h_n y^n.$$

Коэффициенты этой формы являются (однородными) координатами на $\mathbb{C}P^n = \text{Sym}^n(\mathbb{C}P^1)$ (задающими гладкую голоморфную структуру на этом пространстве).

Если $w_k \neq 0$, то можно положить $w_k = 1$. Получаем в качестве аффинных координат основные симметрические функции переменных $\{z_k\}$,

$$h_0 = \sigma_n(z), \dots, h_{n-1} = \sigma_1(z), \\ (h_n = 1).$$

Далее будем использовать эти σ_k в качестве локальных координат на $\text{Sym}^n(\mathbb{R}P^2)$.

Мы начинаем с n пар эрмитово-ортогональных прямых из \mathbb{C}^2 . Выберем представителя каждой пары таким образом, что ни одна из выбранных прямых не совпадает ни с одной из невыбранных (в данной точке, а следовательно, и в некоторой ее окрестности, где имеет силу наша система координат). Для выполнения указанного выше условия невырожденности при повторении пары достаточно всегда выбирать одну и ту же прямую.

Обозначим через $(z_k, 1)$ векторы, задающие выбранные прямые ($k = 1, \dots, n$). В качестве локальных координат на вещественном многообразии $\text{Sym}^n(\mathbb{R}P^2)$ будем использовать (вещественные и мнимые части) n комплексных чисел

$$\sigma_1(z_1, \dots, z_n), \dots, \sigma_n(z_1, \dots, z_n).$$

Ортогональные прямые задаются векторами $(1, -\bar{z}_k)$. Построим симметризованную $2n$ -форму

$$f = \prod_{k=1}^n (z_k x + y) \prod_{k=1}^n (x - \bar{z}_k y) = f_0 x^{2n} + \dots + f_{2n} y^{2n}.$$

Ниже мы увидим, что коэффициенты f_k являются многочленами от σ и $\bar{\sigma}$.

Теорема 7. Отображение $F: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{R}^{2n+1}$, отправляющее точку $(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$ в (f_0, \dots, f_{2n}) , задает (локально) диффеоморфизм многообразия $\text{Sym}^n(\mathbb{R}P^2)$ в пространство $\mathbb{R}P^{2n}$ лучей из \mathbb{R}^{2n+1} . В координатах отображение F задается следующими явными формулами:

$$\begin{aligned} f_0 &= \sigma_n, \\ f_1 &= \sigma_{n-1} - \sigma_n \bar{\sigma}_1, \\ f_2 &= \sigma_{n-2} - \sigma_{n-1} \bar{\sigma}_1 + \sigma_{n-2} \bar{\sigma}_2, \\ &\dots \\ f_n &= 1 - \sigma_1 \bar{\sigma}_1 + \sigma_2 \bar{\sigma}_2 - \dots + (-1)^n \sigma_n \bar{\sigma}_n. \end{aligned}$$

Доказательство. Нетрудно видеть, что

$$\begin{aligned} \prod_{k=1}^n (z_k x + y) &= \sigma_n x^n + \sigma_{n-1} x^{n-1} y + \dots + y^n, \\ \prod_{k=1}^n (x - \bar{z}_k y) &= x^n - \bar{\sigma}_1 x^{n-1} y + \bar{\sigma}_2 x^{n-2} y^2 + \dots + (-1)^n \bar{\sigma}_n y^n. \end{aligned}$$

Перемножая эти два многочлена, получаем (согласно Ф. Аикарди) приведенные выше формулы для коэффициентов произведения.

Мы получаем также, что $f_{2n-k} = (-1)^{n-k} \bar{f}_k$, в частности, средний коэффициент f_n вещественен.

Остается проверить, что в рассматриваемой области якобиан не равен нулю. Это можно доказать без вычислений. Интересующий нас якобиан имеет порядок $2n+1$. Одним из столбцов является вектор

$$\Phi = (f_0, \bar{f}_0, f_1, \bar{f}_1, \dots, f_{n-1}, \bar{f}_{n-1}, f_n).$$

Остальными $2n$ столбцами являются его производные

$$(\partial \Phi / \partial \sigma_1, \partial \Phi / \partial \bar{\sigma}_1, \dots, \partial \Phi / \partial \sigma_n, \partial \Phi / \partial \bar{\sigma}_n).$$

Представим этот неголоморфный якобиан в виде значения в точке $\tau = \bar{\sigma}$ голоморфного якобиана $\mathcal{T}(\sigma, \tau)$, заданного при помощи следующей конструкции.

Рассмотрим произведение

$$\prod_{k=1}^n (z_k x + y) \prod_{k=1}^n (x - w_k y) = F_0 x^{2n} + \dots + F_{2n} y^{2n}.$$

Коэффициенты F_k являются многочленами от $\sigma_1(z), \dots, \sigma_n(z)$ и $\tau_1 = \sigma_1(w), \dots, \tau_n = \sigma_n(w)$. Обозначим через $\Psi = (F_0, \dots, F_{2n})$ вектор-функцию от переменных σ и τ , и рассмотрим определитель матрицы

$$(\Psi, \partial\Psi/\partial\sigma_1, \partial\Psi/\partial\tau_1, \dots, \partial\Psi/\partial\sigma_n, \partial\Psi/\partial\tau_n).$$

Этот определитель $\mathcal{T}(\sigma, \tau)$ в точке $\sigma(z), \tau = \sigma(\bar{z})$ не равен нулю. Действительно, из нашего условия о несовпадении вытекает, что ни одно из z_k не совпадает ни с одним из $-1/\bar{z}_l$. Таким образом, $(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$ и (τ_1, \dots, τ_n) образуют локальную голоморфную координатную систему на $\mathbb{C}P^{2n} = \text{Sym}^{2n}(\mathbb{C}P^1)$ в некоторой окрестности рассматриваемой точки $\sigma, \tau = \bar{\sigma}$. То есть определитель $\mathcal{T}(\sigma, \tau)$ в этой точке не равен нулю. Но определитель, для которого мы хотим доказать его неравенство нулю, совпадает со значением $\mathcal{T}(\sigma, \bar{\sigma})$, поскольку $f_{2n-k} = (-1)^{n-k} f_k$. Итак, мы доказали, что отображение $\text{Sym}^n(\mathbb{R}P^2) \rightarrow \mathbb{R}P^{2n}$ является локальным диффеоморфизмом.

Из п. 2 мы уже знаем, что это отображение является гомеоморфизмом. Теперь мы полностью доказали теорему 2.

5. ТЕОРЕМА МАКСВЕЛЛА И $\mathbb{C}P^2/\text{conj} \approx S^4$

Явные формулы из п. 4 позволяют также построить диффеоморфизм сферы S^{2n} в описанное ниже пространство орбит.

Начнем с комплексного многообразия $(\mathbb{C}P^1)^n$ упорядоченных наборов из n прямых в пространстве \mathbb{C}^2 . На этом многообразии рассмотрим следующее гладкое (неголоморфное) действие группы Кокстера $D(n)$. Элемент из $D(n)$ действует перестановкой сомножителей, сопровождаемой заменой четного числа прямых на их эрмитово-ортогональные дополнения.

Теорема 8. $(\mathbb{C}P^1)^n/D(n) \approx S^{2n}$, и соответствующий диффеоморфизм локально задается формулами из теоремы 7.

Доказательство. Перестановки не меняют бинарную $2n$ -форму f . Замена прямой на ее дополнение меняет знак соответствующего множителя $(z_k x + y)(x - \bar{z}_k y)$. Следовательно, четное число таких замен не меняет знака f (тогда как нечетное число замен — меняет).

Интересно, что доказанное таким образом соотношение $(\mathbb{C}P^1)^n / D(n) \approx S^{2n}$ можно рассматривать как неформальное продолжение теоремы Шевалле: пространство орбит действия вещественной $(2n - 1)$ -мерной группы на \mathbb{C}^{2n} (которую нужно рассматривать как обобщение группы Кокстера) есть гладкое вещественное пространство \mathbb{R}^{2n+1} .

Пример. При $n = 2$ получаем

$$(\mathbb{C}P^1)^2 / D(2) \approx S^4,$$

где группа $D(2)$, состоящая из 4-х элементов, действует на парах прямых из \mathbb{C}^2 перестановками и (возможно) заменами обеих прямых их эрмитовыми дополнениями.

Но $(\mathbb{C}P^1)^2 / S(2) \approx \text{Sym}^2(\mathbb{C}P^1) = \mathbb{C}P^2$. Следовательно, $(\mathbb{C}P^1)^2 / D(2) = \mathbb{C}P^2 / (j)$, где (j) есть замена обеих прямых их дополнениями.

Рассмотрим комплексное многообразие $\text{Sym}^n(\mathbb{C}P^1) = \mathbb{C}P^n$ неупорядоченных наборов из n прямых в пространстве \mathbb{C}^2 . Действующая на $\mathbb{C}P^n$ операция j замены каждой прямой на эрмитово-ортогональную ей прямую является (антиголоморфной) инволюцией.

Теорема 9. Для четных n инволюция $j: \mathbb{C}P^n \rightarrow \mathbb{C}P^n$ совпадает с комплексным сопряжением (в некоторых координатах).

Доказательство. Коэффициенты формы

$$H_{z,w}(x, y) = \prod_{k=1}^n (z_k x + w_k y) = \sum_{k=0}^n h_k x^{n-k} y^k$$

являются естественными (однородными) координатами на $\mathbb{C}P^n = \text{Sym}^n(\mathbb{C}P^1)$. Опишем действие j на коэффициентах h_k .

Перенесем действие j на двойственное пространство:

$$\bar{w}_k x - \bar{z}_k y = \overline{z_k(-\bar{y}) + w_k(\bar{x})}.$$

Таким образом, преобразованная форма задается формулой

$$H_{\bar{w}, -\bar{z}}(x, y) = \overline{H_{z,w}(-\bar{y}, \bar{x})}.$$

В терминах коэффициентов получаем следующее выражение для преобразованной формы:

$$\overline{\sum_{k=0}^n h_k (-\bar{y})^{n-k} (\bar{x})^k} = \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \bar{h}_k x^k y^{n-k}.$$

Таким образом, действие j на коэффициентах формы H задается формулой $(jh)_k = (-1)^k \bar{h}_{n-k}$. Поскольку n четно, то получаем также $(jh)_{n-k} = (-1)^k \bar{h}_k$. Искомыми координатами являются $h_k + h_{n-k}$ и $i(h_k - h_{n-k})$ при четных k , и $i(h_k + h_{n-k})$ и $h_k - h_{n-k}$ при нечетных k (разумеется, мы никогда не рассматриваем $h_{n/2} - h_{n/2}$).

При $n = 2$ наши результаты сводятся к явной формуле классического диффеоморфизма $\mathbb{C}P^2/\text{conj} \approx S^4$. «Теорема Максвелла»

$$(\mathbb{C}P^1)^n / D(n) \approx S^{2n}$$

продолжает этот диффеоморфизм на большие размерности.

6. ИСТОРИЯ ТЕОРЕМЫ МАКСВЕЛЛА

Собственная версия Максвелла этой теоремы может быть найдена в его главной книге *Electricity and Magnetism*, том I, глава IX, разделы 129–133 (с. 222–233 в [5]).

Сильвестр критиковал его рассуждение, говоря в [7]: «Я немного удивлен тем, что такой заслуженный автор не обратил внимание на то, что всегда существует одна и только одна *вещественная* система полюсов, соответствующая данной гармонике...

Со всем возможным уважением к огромным способностям профессора Максвелла, я должен признаться в том, что вывод чисто аналитических свойств сферических гармоник из „теоремы Грина“ и „принципа потенциальной энергии“..., как это сделано им, представляется мне неправильным методом, того же типа и настолько же убедительным, как ... если бы правило извлечения квадратного корня выводили из закона Архимеда о плавающих телах.»

Сильвестр предложил свой собственный подход, по-видимому эквивалентный приведенной выше теореме 5:

«Метод полюсов для представления сферических гармоник, изобретенный или развитый профессором Максвеллом, на самом деле сво-

дится к выбору подходящей канонической формы тернарной кванти-
ки, сумма квадратов переменной которой (здесь — дифференциальных
операторов) равна нулю.»

Тем не менее, Сильвестр не позабылся о том, чтобы детально раз-
обрать этот вопрос («будучи очень стесненным во времени и спеша на
пароход, упывающий в Балтимор через 24 часа»). Детали доказатель-
ства появились в [6] и, позднее, в [3].

Сильвестр упомянул о связи своей теории интегралов от произве-
дений сферических гармоник с теоремой Айвори о притяжении элли-
псоида и предложил несколько обобщений этих идей.

Представляется, что ни алгебраические, ни философские идеи этой
Заметки Сильвестра не были ни поняты, ни развиты математическим
сообществом. Страницы, содержащие заметку, не были разрезаны в ко-
пии его *Collected Papers* в библиотеке Парижской Высшей Нормальной
Школы.

Заметка содержит следующий (антибурбакистский) параграф:

«Ни образом не необычно для математического исследо-
вания... что часть, в некотором смысле, больше целого — причина
этого поразительного интеллектуального феномена состоит в том,
что, применительно к математике, все величины и связи должны рас-
сматриваться (как учит опыт) в состоянии непрерывного изменения,
подобного течению потока.»

Эта общая философия приводит его к заключению о том, что «...об-
щее утверждение должно доказываться легче, чем любой его частный
случай».

Из того, как Сильвестр пришел к последнему заключению, мы мо-
жем вывести, что истинность этого очень важного принципа Сильве-
стра (заимствованного Бурбаки почти сто лет спустя) не влечет необ-
ходимости злосчастного окаменевания «потока» математики.

ЛИТЕРАТУРА

- Арнольд В. И. Разветвленное накрытие $\mathbb{C}P^2 \rightarrow S^4$, гипербо-
личность и проективная топология. *Сибирск. матем. журн.*, 1988,
29 (5), 36–47.
- Арнольд В. И. О расположении овалов вещественных плос-
ких алгебраических кривых, инволюциях четырехмерных гладких

многообразий и арифметике целочисленных квадратичных форм.
Функции. анализ и его прилож., 1971, **5** (3), 1–9.


3. Courant R., Hilbert D. Methods of Mathematical Physics. Vol. 1.— New York: Interscience Publ., 1953. Ch. 7, § 5.
 Русский перевод: Курант Р., Гильберт Д. Методы математической физики. Изд. 3-е, испр. Т. 1. — М.-Л.: Гостехиздат, 1951. Гл. 7, § 5.
4. Dupont J. L., Lusztig G. On manifolds satisfying $w_1^2 = 0$. *Topology*, 1971, **10**, 81–92.
5. Maxwell J. C. Traité d'electricité et de magnétisme. T. 1. — Paris: Gauthier-Villars, 1885.
 На англ. яз. см.: Maxwell J. C. A Treatise on Electricity and Magnetism. Unabridged 3d ed. V. 1. — S.l., Dover, 1954.
6. Ostrowski A. Die Maxwellsche Erzeugung der Kugelfunktionen. *Jahresber. Deutsch. Math.-Verein.*, 1925, **33**, 245–251.
7. Sylvester J. J. Note on spherical harmonics. *Philosophical Magazine*, 1876, **2**, 291–307; см. также в кн.: The Collected Mathematical Papers of J. J. Sylvester. Vol. 3. — Cambridge Univ. Press, 1909. P. 37–51.

Приложение 2

ЗАДАЧИ

1. МАТЕРИАЛЫ СЕМИНАРОВ

Задача 1. Дано векторное поле v с особой точкой типа фокус (см. рисунок). Найти все решения уравнения $L_v u = 0$.



Задача 2. Дано векторное поле v :

$$\dot{x} = y,$$

$$\dot{y} = x.$$

На прямой $x = 1$ задана начальная функция задачи Коши.

- Какое необходимо условие на начальную функцию $u|_{x=1}$, чтобы существовало решение задачи Коши?
- Единственно ли это решение?

Задача 3. Дано уравнение:

$$u_t + uu_x = 0. \quad (*)$$

- Найти его характеристики.
- Показать, что уравнение Ньютона


$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = 0$$

сводится к $(*)$ в предположении, что $\varphi(t)$ — положение частицы на прямой, а $u(t, x)$ — скорость частицы, находящейся в момент t в точке x прямой.

Задача 4. а) Исследовать существование и единственность решения уравнения


$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 = 1$$

с начальным условием $f|_{y=x^2} = 0$ в областях $y \geq x^2$ и $y \leq x^2$.



б) Найти кривую (см. рисунок), ограничивающую область единственности решения. Доказать, что эта кривая — множество центров кривизны параболы $y = x^2$.

в) Сделать то же самое, но с начальным условием $f \Big|_{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1} = 0$.



г) Рассмотрим C^3 -малое возмущение эллипса. Возмущенная кривая γ изображена на рисунке, l_1, l_2, l_3, l_4 — длины дуг огибающей системы нормалей к γ . Доказать равенство: $l_1 + l_3 = l_2 + l_4$.

Задача 5. Существует ли и единственно ли решение задачи Коши

$$x(x^2 + y^2) \frac{\partial u}{\partial x} + y^3 \frac{\partial u}{\partial y} = 0, \quad u|_{y=0} = 1,$$

в окрестности точки $(x_0, 0)$ оси x ?

ДОМАШНИЕ ЗАДАЧИ

Задача 6. Пусть $\alpha = du - p_1 dx_1 - p_2 dx_2$. Доказать, что не существует трехмерной интегральной поверхности.

Задача 7. Найти характеристики в $(2n+1)$ -мерном пространстве 1-струй линейного однородного, неоднородного, квазилинейного уравнений.

Задача 8. Исследовать существование и единственность решения задачи $yu_x = xu_y$, $u|_{x=1} = \cos y$ в окрестности точки $(1, y_0)$.

Задача 9. Найти максимальное t , при котором решение уравнения

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} = \sin x, \quad u|_{t=0} = 0$$

продолжается на $[0, t]$.

**ВОЛНОВОЕ УРАВНЕНИЕ, ВОЛНЫ,
УРАВНЕНИЕ КОРТЕВЕГА – ДЕ ФРИЗА**

Задача 10. Найти характеристики волнового уравнения

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Задача 11. Какой вид будет иметь волновое уравнение, если в качестве координат взять характеристики?

Задача 12. Найти общий вид решения волнового уравнения.

Задача 13. Для волнового уравнения задано начальное условие $u|_{t=0} = u_0(x)$. Найти решение с данным начальным условием. Единственно ли оно?

Задача 14. Уравнение Кортеуга – де Фриза (КдФ) $u_t = 6uu_x - u_{xxx}$ при помощи замены $u = \varphi(x - ct)$ (ищем решение в виде бегущей волны) превратить в обыкновенное уравнение 2-го порядка.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Задача 15. Замена координат: $x^i = a^{ij}y_j$. Выразить $\frac{\partial u}{\partial x^i}$ через $\frac{\partial u}{\partial y^i}$ и $\frac{\partial^2 u}{\partial x^i \partial x^j}$ через $\frac{\partial^2 u}{\partial y^i \partial y^j}$, и обратно.

Задача 16. Нарисовать фазовый портрет уравнения

$$\ddot{\varphi} = 3\varphi^2 + C\varphi + K$$

(уравнение КдФ после замены $u = \varphi(x - ct)$).

Задача 17. Найти на фазовой плоскости (см. задачу 16) решение в виде волны, для которой при $t \rightarrow \pm\infty$, $\varphi \rightarrow 0$.

ВОЛНОВОЕ УРАВНЕНИЕ

Задача 18. Доказать формулу Даламбера

$$u(t, x) = \frac{1}{2} (\varphi(x - at) + \varphi(x + at)) + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(y) dy,$$


дающую решение уравнения струны $u_{tt} = a^2 u_{xx}$ с начальными условиями $u(x, 0) = \varphi(x)$, $u_t(x, 0) = \psi(x)$.

В следующих задачах (№№19–24) речь идет о полуограниченной ($x \geq 0$) струне со свободным ($u_x(0, t) \equiv 0$) или закрепленным ($u(0, t) \equiv 0$) левым концом.


Задача 19. Пусть левый конец струны закреплен, и заданы начальные условия $\varphi(x)$ и $\psi(x)$ для $x \geq 0$. Как продолжить функции φ и ψ на множество $x < 0$, чтобы ограничение решения полученной задачи Коши на область $\{(x, t) : x \geq 0\}$ совпало с решением исходной задачи Коши?

Задача 20. То же самое для струны со свободным левым концом.

Задачи 21–24. Нарисуйте мультфильмы (т. е. изображения решений задачи Коши для различных значений $t \geq 0$) для следующих начальных условий:



22. То же самое, но конец $x = 0$ свободен.



24. То же самое, но конец $x = 0$ свободен.

Задача 25. Нарисуйте мультфильмы для начальных условий, как в задачах 21–24, но для ограниченной ($0 \leq x \leq l$) струны, для следующих случаев:

- а) оба конца свободны, б) оба конца закреплены,
в) один конец закреплен, а другой свободен.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Задача 26. Найти общее решение задачи Коши для ограниченной струны с граничными условиями $u|_{x=0} = f(t)$, $u|_{x=l} = 0$, если:

- а) $u|_{t=0} = u_t|_{t=0}$, б) $u|_{t=0} = \varphi(x)$, $u_t|_{t=0} = \psi(x)$.

Задача 27. Пусть в условиях предыдущей задачи $f(t)$ — периодическая с периодом T .

а) Будет ли решение $u(x, t)$ периодической функцией по t при каких-либо φ и ψ ?

б) Проверить, что периодическое решение отсутствует при $T = (p/q)\tau$, где p и q — целые числа, $\tau = 2l/a$.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Вариант 1

1. Решить задачу Коши $xu_x + u_y = 0, \quad u|_{y=0} = \sin x$.
2. При каких значениях t решение задачи Коши $u_t + uu_x = -x^3, \quad u|_{t=0} = 0$ продолжается на весь полуинтервал $[0, t)$?
3. Нарисовать мультфильмы:
 - a) $u_{tt} = u_{xx}, \quad \varphi \equiv 0, \quad \psi: \begin{array}{c} 0 \\ \bullet \\ \hline 1/2 \\ \bullet \\ 1 \end{array}$, конец $x = 0$ закреплен, конец $x = 1$ свободен;
 - b) $u_{tt} = u_{xx}, \quad u|_{t=0}: \begin{array}{c} \bullet \\ \curvearrowleft \\ \curvearrowright \\ +\infty \end{array}$, $u_t|_{t=0} \equiv 0, \quad u|_{x=0} \equiv 0$.
4. Найти решение задачи Коши $u_{tt} = u_{xx}$ с начальным условием $u|_{t=0} = \sin^3 x, \quad u_t|_{t=0} = \sin x$.
5. Дан ряд $1 + \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{3} \cos 3x + \dots + \frac{1}{n} \cos nx + \dots$. Является ли этот ряд рядом Фурье функции класса C^1 ?
6. Пусть $\{\varphi_k\}$ — ортонормальная система. Ряд $\sum(f, \varphi_k)\varphi_k$ сходится к f в L_2 . Выразить $\|f\|_{L_2}$ через коэффициенты Фурье (равенство Парсеваля).

Вариант 2

1. Исчерпываются ли решения уравнения $x \frac{\partial u}{\partial x} = y \frac{\partial u}{\partial y}$ на \mathbb{R}^2 функциями от xy ?
2. Найти решение уравнения $yuu_x + xuu_y = xy$, график которого проходит через кривую $x = y^2 + u^2 = 1$.
3. Нарисовать мультфильмы
 - a) $u_{tt} = u_{xx}, \quad \begin{array}{c} u|_{t=0} \\ \curvearrowleft \\ \curvearrowright \end{array} \quad \begin{array}{c} u_t|_{t=0} \\ \curvearrowleft \\ \curvearrowright \end{array};$
 - б) $u_{tt} = u_{xx}, \quad \varphi: \begin{array}{c} 0 \\ \bullet \\ \hline 1/2 \\ \bullet \\ 1 \end{array}, \quad \psi \equiv 0$, конец $x = 0$ закреплен, конец $x = 1$ свободен.
4. Решить задачу Коши $u_{tt} = u_{xx}$ с начальными условиями $u|_{t=0} = \cos x, \quad u_t|_{t=0} = \cos^3 x$.

5. Дан ряд $1 + \frac{1}{2 \ln 2} \cos 2x + \dots + \frac{1}{n \ln n} \cos nx + \dots$. Является ли этот ряд рядом Фурье функции класса C^1 ?

6. Пусть $\varphi \in C^\omega(S^1)$, точнее, функция φ голоморфна в $|\operatorname{Im} z| < \beta$; $\varphi(z + 2\pi) = \varphi(z)$. Доказать, что $|\alpha_k| < ce^{-\beta k}$.

КОНСЕРВАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ. ФИГУРЫ ЛИССАЖУ

Задача 28. Дано уравнение $\ddot{x} = -\omega^2 x$.

а) Найти все решения.

б) Пусть решение имеет вид: $A \sin \omega t + B \cos \omega t = C \sin(\omega t + \varphi)$. Доказать, что $A^2 + B^2 = C^2$.

Далее рассматривается уравнение

$$\ddot{x} = -\nabla U(x). \quad (1)$$

Задача 29. Задан потенциал $U(x_1, x_2) = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$. Найти все решения уравнения (1) в виде, указанном в п. б) задачи 28.

Задача 30. Дан потенциал $U(x_1, x_2) = x_1^2 + 4x_1x_2 + 4x_2^2$. Найти все решения уравнения (1). Как ведут себя решения на плоскости (x_1, x_2) ?

Задача 31. Доказать, что полная энергия консервативной системы (1) есть первый интеграл этой системы.

Далее рассматривается потенциал $U(x) = \frac{x_1^2}{2} + \frac{\omega^2 x_2^2}{2}$. Общее решение уравнения (1) при подходящем выборе начала отсчета времени t записывается в виде:

$$\begin{aligned} x_1 &= A_1 \sin t, \\ x_2 &= A_2 \sin(\omega t + \varphi). \end{aligned}$$

Задача 32. Пусть $\omega = 1$, $\varphi = \frac{\pi}{2}, \pi, 0$. Как будут выглядеть фигуры Лиссажу в прямоугольнике $|x_1| \leq A_1$, $|x_2| \leq A_2$? Что будет происходить, если φ меняется от 0 до π ? Найти коэффициенты гомотетии эллипсов $U(x_1, x_2) = E$ и фигуры Лиссажу при $\varphi = \frac{\pi}{2}$.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Задача 33. Дан потенциал $U(x, y) = 5x^2 + 5y^2 - 7xy$. Решить уравнение (1).

Задача 34. Дан потенциал $U(x_1, x_2) = \frac{x_1^2}{2} + \frac{1}{2}\omega^2 x_2^2$. Рассмотрим эллипс $U(x_1, x_2) \leq E$. Пусть $E_1 = \frac{\dot{x}_1^2}{2} + \frac{x_1^2}{2}$, $E_2 = \frac{\dot{x}_2^2}{2} + \frac{\omega^2 x_2^2}{2}$, $E = E_1 + E_2$. Тогда x_1, x_2 лежат в полосах $|x_1| \leq \sqrt{2E_1}$, $|x_2| \leq \sqrt{2E_2}$. Доказать, что прямоугольник $|x_1| \leq \sqrt{2E_1} = A_1$, $|x_2| \leq \sqrt{2E_2} = A_2$ вписан в эллипс $U(x_1, x_2) \leq E$.

Задача 35. Доказать, что если:

- а) $\omega = \frac{m}{n}$, то фигура Лиссажу — замкнутая кривая,
- б) $\omega \notin \mathbb{Q}$, то — незамкнутая.

Задача 36. Доказать, что если $\omega = n$, то существует фаза φ такая, что фигурой Лиссажу будет график многочлена степени n (многочлена Чебышева) ($p(x) = \cos(n \arccos x)$).

Задача 37. Дан эллипс $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$ и дуга синусоиды $y = 3 \cos(x/4)$, где $0 \leq x \leq 8\pi$. Доказать, что длины этих кривых равны.

ГАРМОНИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

Задача 38. Доказать, что угол, под которым виден отрезок из точки его плоскости — гармоническая функция на накрывающей плоскости без двух концевых точек отрезка.

Задача 39. Построить функцию f , гармоническую в круге и принимающую на дугах S_1, S_2 , $S_1 \cup S_2 = S^1$, заданные значения C_1, C_2 .

Задача 40. Решить аналогичную задачу для разбиения окружности на n дуг S_1, \dots, S_n ; значения на дугах C_1, \dots, C_n .

Задача 41. Записать уравнения Ньютона движения свободной частицы в полярной системе координат.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Задача 42. Доказать, что лагранжианы $L_1 = \sqrt{g_{ij}\dot{x}^i\dot{x}^j}$, $L_2 = g_{ij}\dot{x}^i\dot{x}^j$ доставляют наименьшее действие на одной и той же кривой (кратчайшей, соединяющей две точки).

Задача 43. Вычислить Δ в полярных и сферических координатах.

Задача 44. Доказать, что величина телесного угла, под которым виден из подвижной точки пространства фиксированный замкнутый контур в \mathbb{R}^3 , — гармоническая на накрывающем дополнение к этому контуру многообразии функция этой подвижной точки.

2. ЗАДАЧИ ПИСЬМЕННОГО ЭКЗАМЕНА

1995 год¹

1 (1). Является ли гладкой поверхность в евклидовом пространстве

$$z = r^2 + \frac{2}{9} \quad (*)$$

(где $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$)? Выпукла ли она? Найдите ее кривизну.

2 (2). Найти значение в начале координат потенциала двойного слоя плотности 1, распределенного вдоль поверхности (*).

3 (1, 2, 3, 3, 6). Вычислить средние значения по поверхности (*) следующих функций:

а) z ; б) $1/r$; в) z/r^3 ; г) r^2 ; д) $1/r^3$.

4 (5). Решить внутреннюю задачу Дирихле с краевым условием $u = 1/r^3$ на поверхности (*) (для уравнения Лапласа $\Delta u = 0$.)

5 (5). Рассмотрим потенциал простого слоя плотности z , распределенного по поверхности (*). Найти среднее значение этого потенциала по поверхности сферы $r^2 = 1$.

6 (2, 4). Найти верхнюю и нижнюю грани интеграла Дирихле

$$\iiint (\operatorname{grad} u)^2 dx dy dz$$

по области, ограниченной поверхностью (*), на множестве гладких функций в замыкании этой области, совпадающих с r^2 на ее границе.

7 (6). Найти при малых $|t|$ значение в точке ($x = y = 0, z = 1/2$) решения f уравнения

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \operatorname{div}(f \operatorname{grad} u) = f^2$$

с начальным условием ($f \equiv 1$ при $t = 0$), где u — решение задачи 4.

¹Рядом с номером каждой задачи в скобках указано количество баллов за правильное решение задачи (частей задачи). Предполагаемые критерии отметок при трехчасовом экзамене: удовлетворительно — 12, хорошо — 16, отлично — 26 (при максимуме 40).

Указание: для этого не обязательно знать ответ задачи 4, задачу 7 можно решать независимо.

1996 год

1. Дано векторное поле $v(x, y) = y \frac{\partial}{\partial x} + x \frac{\partial}{\partial y}$ и функция $u|_{x=1} = f(y)$.

При каком условии на f в окрестности точки $(1, 0)$ существует решение задачи Коши для уравнений $L_v u = 0$? Единственно ли оно?

2. Рассмотрим уравнение

$$\ddot{x} = -\nabla U(x), \quad (**)$$

где $x = (x_1, x_2)$, $U(x) = x_1^2 + x_2^2 + ax_1x_2$. При каких (вещественных) значениях a все решения уравнения $(**)$ периодичны?

3. На двух прямых в \mathbb{R}^3 распределен электрический заряд: на прямой $z = 1, y = x$ с плотностью 1 и на прямой $z = -1, y = -x$ с плотностью -1 . Найти эквипотенциальные поверхности поля, созданного этими зарядами.

4. На сфере $S^2: x^2 + y^2 + z^2 = 1$ задана функция v , гармоническая всюду, кроме точки $N = (0, 0, 1)$. Пусть \mathbb{R}^2 — плоскость $z = 0$ и $p: S^2 \setminus N \rightarrow \mathbb{R}^2$ — стереографическая проекция. Пусть $u(x, y) = v(p^{-1}(x, y))$. Доказать, что $\int_0^{2\pi} u_r(1, \varphi) d\varphi = 0$.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие ко второму изданию	IX
1. Общая теория для одного уравнения первого порядка	1
2. Общая теория для одного уравнения первого порядка (продолжение)	13
3. Принцип Гюйгенса в теории распространения волн	25
4. Струна (метод Даламбера)	33
1. Общее решение	33
2. Краевые задачи и задача Коши	34
3. Задача Коши для неограниченной струны. Формула Даламбера	36
4. Полуограниченная струна	37
5. Ограниченнная струна (резонанс)	38
6. Метод Фурье	39
5. Метод Фурье (для струны)	43
1. Решение задачи в пространстве тригонометрических многочленов	43
2. Отступление	44
3. Формулы для решения задачи пункта 1	44
4. Общий случай	45
5. Ряды Фурье	45
6. Сходимость рядов Фурье	46
7. Явление Гиббса	47
6. Теория колебаний. Вариационный принцип	49
7. Теория колебаний. Вариационный принцип (продолжение)	61
8. Свойства гармонических функций	77

9. Фундаментальное решение оператора Лапласа. Потенциалы	89
10. Потенциал двойного слоя	107
11. Сферические функции. Теорема Максвелла. Теорема об устранимой особенности	119
12. Краевые задачи для уравнения Лапласа. Теория линейных уравнений и систем	135
Приложение 1. Топологическое содержание теоремы Максвелла о мультипольном представлении сферических функций	151
1. Основные пространства и группы	152
2. Некоторые теоремы вещественной алгебраической геометрии	154
3. От алгебраической геометрии к сферическим функциям	156
4. Явные формулы	158
5. Теорема Максвелла и $\mathbb{C}P^2/\text{conj} \approx S^4$	162
6. История теоремы Максвелла	164
Приложение 2. Задачи	167
1. Материалы семинаров	167
2. Задачи письменного экзамена	174